

## 2017 护士执业资格考试真题解析

1.患者女 69 岁，癌症晚期，晨起空腹采血检查。护士第一次静脉穿刺失败，患者问：是看我快要死了就拿我练手了是吗？此时护士恰当的做法是：

- A. 向患者道歉并争取谅解
- B. 暂时离开患者，请其他护士前来处理
- C. 向患者解释穿刺失败是患者自身原因造成的
- D. 请患者给第二次机会，并保证这次穿刺一定成功
- E. 不做解释，先执行其他患者的治疗

【答案】 A

【解析】 由于护士本身的原因造成事件的发生，应向患者道歉并取得谅解。

2.护士处理医嘱时，应首先执行的医嘱是

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 临时备用医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 停止医嘱

【答案】 B

【解析】 临时医嘱指一次完成的医嘱，诊断性的一次检查、处置、临时用药，有效时间在 24 小时内。

3.护士与患者家属的沟通中，错误的是

- A. 尊重患者家属
- B. 给予患者家属心理支持
- C. 指导患者家属对患者进行生活照顾
- D. 指导患者家属参与患者的忽略过程
- E. 指导患者家属参与患者的治疗过程

【答案】 E

【解析】 治疗过程应是患者与医务工作者共同参与的过程。

4.浅 II 度烧伤的损伤范围是

- A. 角质层
- B. 生发层
- C. 真皮浅层
- D. 皮肤全层
- E. 皮下、肌肉或骨骼

【答案】 C

【解析】 浅 II 度烧伤的损伤范围达表皮全层、真皮浅层；深 II 度烧伤的损伤范围是真皮深层。I 度烧伤的损伤范围是表皮浅层；III 度烧伤的损伤范围包括了皮肤全层，达到皮下、肌肉或骨骼。皮肤从外至内包括：表皮层、真皮层、皮下层。角质层是表皮层的最外面，生发层及基底层是表皮层的最深层。

5.下列药物中易引起再生障碍性贫血的是

- A. 氯霉素

- B.氯丙嗪
- C.链霉素
- D.氨基糖苷类
- E.头孢唑啉

【答案】A

【解析】药物及化学物质为再障最常见的致病因素。其中以氯霉素最多见。

6.成人最常见的先天性心脏病是

- A.动脉导管未闭
- B.室间隔缺损
- C.房间隔缺损
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

【答案】C

【解析】成人最常见的先天性心脏病中，二瓣型.主动脉瓣.房缺最为常见，其次是主动脉狭窄、肺动脉瓣狭窄。小儿最常见的室缺，不做手术能活到成年，这种室缺多有自动闭锁。成年人不大有复杂先天性心脏病，如果有一般不能活到成年。

7.某患者住院期间因输入不合格血液导致乙型肝炎，其索赔对象应

- A.当地疾病控制中心
- B.当地卫生计划行政部门
- C.血站和医院
- D.当地公安部门
- E.执行输血操作的护士

【答案】C

【解析】因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者可以向生产者或者血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的生产者或者血液提供机构追偿。

8.患者男，72岁，因“急性左心衰.心房颤动”急诊收入院，输液过程中突然出现肺栓塞经抢救无效死亡。提出医疗事故鉴定申请。当地卫生行政部门应在当事人提出几日内移送上一级主管部门

- A.21天
- B.14天
- C.3天
- D.7天
- E.10天

【答案】D

【解析】有下列情形之一的，县级人民政府卫生行政部门应当自接到医疗机构的报告或者当事人提出医疗事故争议处理申请之日起7日内移送上一级人民政府卫生行政部门处理：（1）患者死亡（2）可能为二级以上的医疗事故（3）国务院卫生行政部门和盛自治区.直辖市人民政府卫生行政部门规定的其他情形。

9.某初产妇，26岁，正常分娩后，子宫复旧符合正常规律的是

- A. 产后 2 周在腹部扪及宫底
- B. 产后 6 周子宫如孕 50 天大小
- C. 产后 6 周子宫内膜全部修复
- D. 产后 6 周时宫颈恢复正常形态
- E. 产后第 2 周为血性恶露

【答案】C

【解析】产后 10 天子宫降至骨盆内，在腹部检查不到子宫底，因此 A 不对。产后六周子宫恢复到非妊娠孕前大小，因此 B 不对。产后 2-3 日宫口可容纳 2 指；产后 1 周宫颈口关闭，宫颈管复原；产后 4 周，子宫颈完全恢复至非孕时状态。产后最初 3 日为血性恶露，产后 4-14 天为浆性恶露，产后 14 天后为白色恶露。

10. 关于宫颈癌的叙述 正确的是

- A. 多为鳞癌和腺癌，以腺癌为主
- B. 转移途径以直接蔓延和淋巴转移为主，血性转移及少见
- C. 病变多发生在子宫颈外口处
- D. 宫颈原位癌不属于宫颈上皮内瘤样变
- E. 可表现为菜花型、浸润型、溃疡型三种类型

【答案】B

【解析】子宫颈癌主要分为鳞状细胞癌（80%-85%）；腺癌（15%-20%）；腺鳞癌（3%-5%）。转移途径主要以直接蔓延和淋巴转移为主，癌症晚期时以血性转移为主。宫颈癌好发在宫颈鳞状上皮与柱状上皮交界处，呈外生型生长。宫颈上皮内瘤样变包括宫颈原位癌与宫颈不典型增生。宫颈病理分型有 4 类，分别为菜花型、浸润型、溃疡型、颈管型。

11. 患者男，18 岁，支气管哮喘 2 年，同时使用几种气雾剂治疗。正确的使用顺序是

- A. 先用支气管扩张剂，再用激素类气雾剂
- B. 先用激素类气雾剂，再用支气管扩张剂
- C. 先用激素类气雾剂，再用茶碱类气雾剂
- D. 先用支气管扩张剂，再用茶碱类气雾剂
- E. 先用茶碱类气雾剂，再用支气管扩张剂

【答案】A

【解析】哮喘患者典型临床表现为小气道的狭窄导致发生呼气性的呼吸困难，因此应用支气管扩张剂，缓解其呼吸困难，当重度哮喘发作时应用糖皮质激素类药物，不仅可以抵抗气道炎症反应，又可以抗过敏。

12. 患者男，56 岁，肝硬化 3 年，因肝性脑病入院。为防止患者病情加重，应给与


- A. 低脂肪饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 低嘌呤饮食
- D. 低胆固醇饮食
- E. 低盐饮食

【答案】B

【解析】肝性脑病的患者主要是由于氨的增多产生，为患者提供饮食护理时，应限制蛋白质的摄入量。

13. 肥厚型心肌病是以下哪个部位的肥厚为特征 c

- A ①+③
- B ①+②
- C ②+④
- D ①
- E ③+④



【答案】C

【解析】肥厚型心肌病以心室壁呈不对称性肥厚，常侵及室间隔，此病多以青壮年多见，有家族史。

14. 患者男，38岁，因急腹症手术治疗，术中见腹腔内少量淡黄色腹水，有粪臭味……

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 变形杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 溶血性链球菌

【答案】B

【解析】急性化脓性腹膜炎的腹水，以大肠埃希菌为主的脓液多呈黄绿色，常与其他的致病菌混合感染而变得稠厚，并有粪臭味。

15. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是

- A. 疱疹病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 肝炎病毒
- D. 流感病毒
- E. 轮状病毒

【答案】B

【解析】病毒性心肌炎主要以柯萨奇病毒B组为主，占有30%~50%，此外流感、单纯疱疹、肝炎、HIV均是引起病毒性心肌炎发病的病毒。

16. 1岁女婴，出生史正常，喂养正常，现进行常规生长发育检查。

该女婴的左手腕部 X 线摄片，可显示的骨化中心数量最多为

- A. 4 个
- B. 2 个
- C. 0 个
- D. 6 个

E.8 个

【答案】B

【解析】骨化中心数量为年龄加一。

17.诊断急性呼吸窘迫综合征的必要条件是 B

A.PWCP < 18mmHg

B.PaO<sub>2</sub> / FiO<sub>2</sub> < 200

C.PaO<sub>2</sub> / FiO<sub>2</sub> < 300

D.PaCO<sub>2</sub> / FiO<sub>2</sub> < 200

E.PaCO<sub>2</sub> / FiO<sub>2</sub> < 300

【答案】B

【解析】氧合指数 PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 是诊断 ALI 或 ARDS 的必要条件，正常值为 400-500，ALI 时 ≤ 300，ARDS 时 ≤ 200。

18.患者女，52 岁。宫颈癌 II 期，拟行手术治疗。术前行子宫动脉栓塞化疗术，注入顺铂，第 1 问：顺铂的药理作用为

A.干扰转录过程和阻止 RNA 合成

B.核酸生物合成

C.破坏 DNA 结构

D.抑制蛋白质合成与功能

E.抑制拓扑异构酶活性

【答案】A

【解析】抑制癌细胞的 DNA 复制过程，并损伤其细胞膜上的结构，具有较强光谱抗癌作用。

19.血栓闭塞性脉管炎缺血障碍期的表现是

A.游走性动脉血管炎

B.反复性动脉血管闭塞

C.复发性游走性动脉血管炎

D.患肢动脉搏动消失

E.复发性游走性静脉炎

【答案】D

【解析】血栓闭塞性脉管炎缺血障碍期患者出现间歇痛，患肢动脉搏动消失，但未出现肢端溃疡或坏疽。血栓闭塞性脉管炎局部血期患者出现间歇跛行，反复发作性游走性血栓性静脉炎。

20.不属于患者家属角色特征的是

A.患者护理计划实施的参与者

B.患者生活的照顾者

C.患者原有社会功能的替代者

D.患者的心理支持者

E.患者病痛的共同承受者

【答案】E

【解析】病痛只要自身体会，他人无法共同承担。

21. 下列药物中均为幽门螺杆菌的治疗方案药物的是

- A. 奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- B. 红霉素+奥美拉唑+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- C. 硫酸镁+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- E. 青霉素+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾

【答案】A

【解析】根除幽门螺杆菌——三联疗法（质子泵抑制剂/铋剂+2种抗生素）或四联疗法（质子泵抑制剂+铋剂+2种抗生素）

22. 患儿男，16岁。因患“痤疮”3年入院，经实验室和影像学检查后主要的护理评估是

- A. 心理状态
- B. 营养状态



- C. 皮肤黏膜状态
- D. 意识状态
- E. 心率、心律

【答案】C

【解析】库欣综合征的临床表现为满月脸、向心性肥胖、皮肤紫纹（由于蛋白质分解加速，合成抑制）痤疮等。

23. 患者男，60岁。搬运重物时突发严重胸痛，呕吐数次，腹胀不适。既往有右患者行腹股沟疝修补术后，护士指导其抬高阴囊的目的是

- A. 减小腹壁张力
- B. 避免阴囊血肿
- C. 减少切口出血
- D. 避免疝块脱出
- E. 避免切口裂开

【答案】B

【解析】避免阴囊积血、积液和促进淋巴回流，因此抬高阴囊。

24. 某甲状腺功能亢进症患者，行基础代谢率测定时间宜在

- A. 下午6点、餐后和静卧
- B. 清晨、空腹和静卧
- C. 下午4点，静卧

- D. 午间 12 点, 餐后和静卧  
E. 下午 2 点, 静卧

【答案】B

【解析】略。

25. 患者男, 60 岁。疑诊急性心肌梗死。最有诊断价值的心电图特征是

- A. T 波倒置  
B. ST 段弓背抬高  
C. P 波高尖  
D. 出现小 Q 波  
E. QRS 波群增宽

【答案】B

【解析】心电图——ST 段弓背向上抬高、宽而深的 Q 波（病理性 Q 波）、T 波倒置。

26. 大咯血是指咯血量超过

- A. 200ml  
B. 300ml  
C. 400ml  
D. 100ml  
E. 500ml

【答案】E

【解析】华图雁翎护考考前 120 手册。

咯血的量

少量咯血：每天 < 100ml

中等量咯血：每天 100~500ml

大量咯血：每天 > 500ml, 或 1 次 > 300ml

27. 患者女, 32 岁, 淋雨受凉致发热 3 天, 体温持续 39.2℃ 以上, 最高达 40℃, 入院, 此患者的体温属于

- A. 稽留热  
B. 波浪热  
C. 不规则热  
D. 弛张热  
E. 间歇热

【答案】A

【解析】根据患者的临床表现初步判断为肺炎, 由于温差范围在 1℃ 以内, 符合稽留热的内容。

28. 患者男, 30 岁, 晨 7 时测得血压 142/82mmHg, 测得血压值属于

- A. 轻度高血压  
B. 重度高血压  
C. 正常血压  
D. 中度高血压

E.正常高值

【答案】A

【解析】高血压分级：

- 1级高血压（轻度）收缩压 140-159mmHg；舒张压 90-99mmHg；
- 2级高血压（中度）收缩压 150-169mmHg；舒张压 100-109mmHg；
- 3级高血压（重度）收缩压 180mmHg；舒张压 110mmHg。

29. 某孕妇，30岁，孕36周。主诉近两天胎动时，感腹痛明显，查体：胎位LOA，头先露，浮，胎心率140次/分，尺侧耻骨上宫底高度为32cm，孕妇情绪紧张，担心影响胎儿。护士首先要做的是

- A.安慰孕妇，向其讲解相关知识
- B.尽快协助医生完善各项检查
- C.教会孕妇自我监测胎儿宫内情况的方法
- D.密切关注B超动态临高羊水量
- E.让孕妇回家取左侧卧位

【答案】A

【解析】胎儿正常，稳定孕妇情绪。

30.中医理论中，“其具防御作用而运行于脉外之气”被称为

- A.元气
- B.营气
- C.肺气
- D.卫气
- E.真气

【答案】D

【解析】元气又称为“原气”或“真气”是生命的原动力。营气主要营养全身和化生血液。卫气不受脉管的约束，运行皮肤.肌肉之前，重于盲膜，散于胸膜。

31.属于疫苗接种异常反应的是

- A.心因性反应
- B.偶合发病
- C.原有疾病加重
- D.一般反应
- E.变态反应

【答案】E

【解析】包括过敏性休克.晕针.过敏性皮疹.全身感染。

32.经腹会阴联合直肠癌根治术适合于

- A.癌肿距肛门 20cm 之内
- B.癌肿距肛门 15cm 之内
- C.癌肿距肛门 13cm 之内
- D.癌肿距肛门 10cm 之内
- E.癌肿距肛门 5cm 之内

【答案】E

【解析】此手术可以保留肛门，经腹直肠癌切除术适合于 E. 癌肿距肛门 5cm 以上，不保留肛门。

33. 患者男，50 岁，在建筑工地干活时被一铁钉扎伤，医嘱以破伤风注射，护士在给患者进行破伤风抗毒素过敏试验，以下说法错误的是

- A. 当皮丘直径大于 1.5 时，红晕超过 4cm 可以判断结果阳性
- B. 实验结果为阳性时，可做破伤风脱敏试验
- C. 破伤风皮试液的浓度是 1500IU/ml
- D. 实验结果为阴性时，余液 0.9ml 与皮试剩余剂量做肌内注射
- E. 当皮丘周围有伪足、痒感时可以判断为阳性

【答案】C

【解析】破伤风皮试液的浓度是 150IU/ml。

34. 美托洛尔治疗高血压的机制

- A. 降低心肌收缩力
- B. 抑制血管紧张素 2 生成
- C. 扩张外周血管
- D. 减慢心率，降低心排量
- E. 抑制水钠重吸收

【答案】D

【解析】β 受体阻滞剂主要的药理作用，主要抑制心肌收缩力、减慢心率发挥降压作用。

35. 高血压危险度分层是指

- A. 5 年内发生心脑血管病事件概率的大小
- B. 10 年内发生肾脏疾病事件概率的大小
- C. 10 年内发生视网膜病变事件概率的大小
- D. 10 年内发生心脑血管病事件概率的大小
- E. 5 年内发生肾脏疾病事件概率的大小

【答案】D

【解析】略

36. 1 岁女婴，出生史正常，喂养正常，现进行常规生长发育检查，该女婴在左手腕部 X 线摄片，可显示的骨化中心数量最多为

- A. 4 个
- B. 2 个
- C. 0 个
- D. 6 个
- E. 8 个

【答案】B

【解析】1~9 岁腕部骨化中心数目约为小儿岁数+1，10 岁出齐。

37. 患者男，30 岁，车祸伤及头部，出现右外耳道流出血性液体，该患者适宜的体位是

- A. 中凹卧位
- B. 右侧卧位

- C.平卧位
- D.头低足高位
- E.左侧卧位

【答案】B

【解析】半坐位，头偏向患侧，维持至不漏液后3~5日。

38. 带教老师在临床带教过程中为了给实习护士创造机会，有合适的静脉穿刺对象时就对患者说“她虽然是个学生，但穿刺技术非常好，许多病人都是她穿刺的，而且每次都能成功，新能给她一次穿刺的机会吗？”在此护患沟通的过程中，带教老师使用的是

- A. 劝说性语言
- B. 安慰性语言
- C. 指令性语言
- D. 鼓励性语言
- E. 积极的暗示语言

【答案】E

【解析】略。

39. 食管癌按病理形态分型，不包括

- A. 结节型
- B. 溃疡型
- C. 蕈伞型
- D. 缩窄型
- E. 髓质型

【答案】A

【解析】食管癌按病理形态分型有溃疡型、蕈伞型、缩窄型、髓质型，4种。

40. 患者男，37岁。患者下肢静脉曲张，医嘱使用弹力袜以延缓病情。

- A. 感到患肢酸胀时
- B. 早晨出门上班前
- C. 午间休息时
- D. 清晨起床前
- E. 晚上上床睡觉前

【答案】D

【解析】早晨起床下床活动之前穿，排空曲张静脉内的血液后再穿。

41. 患者女，20岁。今突发胸闷，咳嗽、咳白色泡沫痰，呼气性呼吸困难，听诊两肺布满哮鸣音，此时患者胸部X线检查的表现是

- A. 卷发样阴影
- B. 肋膈角变钝
- C. 不规则环状透亮阴影
- D. 云絮状阴影
- E. 两肺野透亮度增加

【答案】E

【解析】哮喘患者胸部X线检查为两肺野透亮度增加。

42. 患者女、36岁。以“突发腹痛3小时”急诊入院。患者自诉疼痛难忍，在没有明确诊断前，应采取的护理措施是

- A. 流质饮食
- B. 解痉止痛
- C. 胃肠减压
- D. 保留灌肠
- E. 腹部热敷

【答案】C

【解析】由于患者的病情不确定，急腹症未明确前，禁吗啡、禁热疗、禁灌肠、禁用腹泻药。

43. 患者女，20岁，今突发胸闷、咳嗽，咳白色泡沫痰，呼气性呼吸困难，听诊双肺布满哮鸣音，对诊断最有意义的痰涂片检查结果是

- A. 单核细胞增多
- B. 嗜酸性粒细胞增多
- C. 淋巴细胞增多
- D. 淋巴细胞增多
- E. 嗜碱性粒细胞增多

【答案】B

【解析】根据患者的临床表现，该患者为哮喘，做痰涂片检查，痰液中主要嗜酸性粒细胞增多。

44. 患者男，72岁，突发呼吸困难，喘息呼吸，查体胸闷、气促、烦躁不安，肺部可闻及干、湿啰音，心律齐，双下肢未见水肿。最可能的诊断是

- A. 全心衰
- B. 高血压脑病
- C. 左心衰
- D. 右心衰
- E. 呼吸衰竭

【答案】C

【解析】左心衰的患者最早出现的临床表现为呼吸困难，而右心衰的患者由于体循环静脉淤血会出现下肢水肿。

45. 患者男，28岁，车祸后导致腹部损伤，肝破裂，手术治疗，术后（ARDS），最有诊断价值的临床指标是

- A. 心率 118次/分
- B.  $PaO_2 65\text{mmHg}$
- C. 呼吸 35次/分
- D.  $PaO_2 / FiO_2 = 180$
- E.  $PaCO_2 30\text{mmHg}$

【答案】D

【解析】氧合指数  $PaO_2 / FiO_2$  是诊断 ALI 或 ARDS 的必要条件，正常值为 400-500，ALI 时  $\leq 300$ ，ARDS 时  $\leq 200$ 。

46. 患者男，54岁，慢性咳嗽咳痰6年，气促3年，逐渐加重，X线胸片示肋间隙增宽，肺纹理增粗、紊乱，患者因剧烈咳嗽后出现胸痛、呼吸困难，查体：右胸叩诊鼓音，呼吸音消失，该患者可能并发了

- A. 干性胸膜炎
- B. 自发性气胸
- C. 急性肺栓塞
- D. 急性心肌梗死
- E. 肺不张

【答案】B

【解析】根据题干来看，患者男性，年龄大，咳嗽咳痰时间较长，慢支的表现，逐渐病情加重，说明有感染，再根据实验室检查，患者再有COPD的基础上，并发自发性气胸。

47. 患者男，27岁，打篮球时突然出现上腹部剧烈绞痛，放射至下腹及会阴部位，阳性，入院诊断为尿路结石。

1. 经化验，患者的结石以草酸钙为主要成分，护士对该患者进行健康指导，正确的是
- A. 少食动物蛋白，精制糖等
  - B. 大量饮水，每日饮水量1000ml
  - C. 多食蔬菜、芦笋等，以增加纤维素摄入
  - D. 为保证液体入量，用牛奶替代水分摄入
  - E. 减少活动，尤其是跳跃性活动

【答案】A

【解析】尿路结石的患者避免大量摄入动物蛋白、精致糖和动物脂肪。每日饮水量为2500-4000ml。鼓励患者多做跳跃性活动促进结石的排出。

48. 关于影响药物作用的因素，正确的叙述是

- A. 固体剂型的药物吸收比水溶性剂型快
- B. 给药次数依据药物的半衰期而定
- C. 老年人对药物的耐受性增高
- D. 菠菜可促进钙的吸收
- E. 直肠给药吸收速度高于静脉给药

【答案】B

【解析】固体剂型的药物吸收比水溶性剂型慢；老年人对药物的耐受性降低；由于菠菜中含有草酸钾，使钙离子沉淀，抑制钙的吸收；只有静脉和动脉给药直接吸收，其他给药途径需要一定过程才可以吸收。

49. 患者男，45岁。右侧腹股沟斜疝2年余。今日搬重物后出现右侧腹部肿大、压痛，全腹肌紧张、压痛、反跳痛，肠鸣音消失，该患者可能出现了

- A. 肠穿孔
- B. 肠痉挛
- C. 肠扭转
- D. 肠炎
- E. 阑尾炎

【答案】C

【解析】肠穿孔患者的临床表现主要表现为腹膜刺激征，不会有腹部的肿大。

50. 对化疗敏感的肺癌是

- A. 鳞癌
- B. 腺鳞癌
- C. 大细胞癌
- D. 腺癌
- E. 小细胞癌

【答案】E

【解析】对化疗敏感的肺癌是小细胞癌，其次是鳞癌和腺癌。

51. 具有尿液浓缩和稀释功能是

- A. 肾小管细段
- B. 远端小管
- C. 肾小球
- D. 肾小囊
- E. 近端小管

【答案】B

【解析】肾小管由近端小管、细管、远端小管组成。近端小管主要有重吸收功能，远端小管主要有浓缩和稀释的功能。

52. 某三甲医院急诊科护士长仔细阅读了护理部下发的文件《XXXX 医院 2017 年护理质量管理方案》，并执行了 2017 年护理质量管理的具体方案，该急诊科护士长的这种做法体现了哪种组织原则

- A. 集体分权相结合
- B. 职责与权限统一
- C. 稳定适应
- D. 等级与统一指挥
- E. 任务与目标一致

【答案】E

【解析】此题主要考查医院护理管理的组织原则，任务与目标一致中体现护理部的目标必须根据医院总体目标制定，并保持一致。

53. 患者男，45 岁，梗阻性肥厚型心肌病，病情稳定，今日来院复查时测血压为 150/90，护士应指导患者避免使用

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝酸甘油
- C. 阿替洛尔
- D. 美托洛尔
- E. 硝苯地平

【答案】B

【解析】避免使用增强心肌收缩力的药物（如洋地黄）及减轻心脏负荷的药物（如硝酸甘油）。

54. 患者对护理工作的满意度属于

- A. 护理服务质量评价指标
- B. 终末质量评价指标
- C. 主观感受度评价指标
- D. 要素质量评价指标
- E. 环节质量评价指标

【答案】B

【解析】终末质量评价指标是指患者所得到的的护理效果的质量。如皮肤压疮发生率、差错发生率、一级护理合格率及住院满意度、出院满意度等。

55. 患者男，30岁，持续高热，医嘱：血培养，该化验的目的在于

- A. 测定肝功能
- B. 血清酶
- C. 测定非蛋白氮含量
- D. 查找血液中的致病菌
- E. 测定电解质

【答案】D

【解析】全血标本主要检查血液中的物质含量，如血糖、血氨、尿素氮。血清标本主要检查血清酶、脂类、电解质、肝功能。

56. 某患者因脑出血已在家卧床2个月，大小便失禁，不能自行翻身，近日骶尾部皮肤出现红肿，压制不褪色。为预防患者发生其他并发症，应着重知道家属学会的护理技术是

- A. 更换敷料
- B. 测量血压
- C. 被动运动
- D. 鼻饲营养
- E. 皮下注射

【答案】C

【解析】根据患者的临床表现，判断此时处于淤血红润期，主要护理要点是解除受压点，由于患者丧失自理能力，必须借助他人的帮忙来完成，这种运动属于被动运动。