

2017 年医疗卫生考试护理专业模拟题二答案与解析

1. 【答案】D

【解析】护理学的四个基本概念：人、健康、环境、护理。

2. 【答案】E

【解析】帮助病人坐轮椅时为保证患者安全，应使患者身体尽量靠后坐。

3. 【答案】C

【解析】防止颅内压降低引起的头痛，因为穿刺后，脑脊液可自穿刺点露出至脊膜腔外，造成颅内压降低，牵张颅内静脉窦和脑膜等组织，引起头痛。

4. 【答案】D

【解析】压疮溃疡期的特征表现为浅层组织感染、脓液流出、溃疡形成。

5. 【答案】A

【解析】长期插管鼻饲者普通胃管每周更换 1 次。鼻饲用的杯、注射器等应每天更换消毒。

6. 【答案】B

【解析】2%戊二醛浸泡用于精密仪器的消毒，如各种内镜。

7. 【答案】B

【解析】有腹水时应给予低盐饮食，限制进水量。进水量限制在 1000ml / d 左右，盐限制在 1~2g/d。

8. 【答案】B

【解析】淋浴适用于有自理能力而且病情较轻的患者。

9. 【答案】B

【解析】充血性心力衰竭和水钠潴留的病人，禁用生理盐水灌肠，以减少钠的吸收。

10. 【答案】D

【解析】急性肺水肿的典型临床表现为：呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰

11. 【答案】C

【解析】点滴系数 15，输液时间=（输液总量×点滴系数）/（每分钟滴数×60）

12. 【答案】B

【解析】尿标本采集宜选取中段尿；标本尽快送检，尿标本放置时间不能超过 1 小时；留取尿标本前 5 天停止使用抗生素；多饮水易导致尿液稀释细菌，引起化验不准。

13. 【答案】A

【解析】测血压四定：定时间、定部位、定体位、定血压计。

14. 【答案】B

【解析】浅表、靠近骨骼的大动脉均可作为测量脉搏的部位，临床上最常选择的诊脉位置是桡动脉。

15. 【答案】C

【解析】软组织损伤早期 12 小时内冷敷（人卫版、第五版）。

16. 【答案】A

【解析】人工呼吸与胸外心脏按压比例为 2: 30

17. 【答案】A

【解析】慢性支气管炎起病缓，以咳嗽、咳痰、喘息为主要症状。在冬春季加剧。痰量以夜间或清晨体位变动时，较多。

18. 【答案】B

【解析】单纯 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ (8kpa) 为 I 型呼吸衰竭； $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 并伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ (6.67kpa)，则为 II 型呼吸衰竭。(1mmHg=0.133kPa)

19. 【答案】D

【解析】支气管扩张症的主要原因是支气管-肺组织感染。反复感染使支气管粘膜充血、水肿，破坏管壁的各层结构，削弱管壁的支撑作用。

20. 【答案】C

【解析】高血压的诊断标准为收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。

21. 【答案】A

【解析】典型的发作性胸痛。

22. 【答案】B

【解析】我国肝硬化的最主要原因是病毒性肝炎，尤其是乙肝。

23. 【答案】B

【解析】胃溃疡疼痛节律为进食-疼痛-缓解；十二指肠溃疡疼痛节律为疼痛-进食-缓解。

24. 【答案】C

【解析】胰岛素注射过量可引起低血糖反应。

25. 【答案】C

【解析】95%以上的类风湿性关节炎的患者都有晨僵。

26. 【答案】C

【解析】系统性红斑狼疮的典型皮损为鼻梁和双颧颊部呈蝶形分部的红斑。

27. 【答案】D

【解析】甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。

28. 【答案】A

【解析】细胞内液主要阳离子为 K^+ 和 Mg^{2+} ，细胞外液的阳离子主要为 Na^+ 。

29. 【答案】B

【解析】青霉素过敏性休克的抢救关键位：立即皮下注射盐酸肾上腺素 0.5 ~ 1ml。

30. 【答案】A

【解析】全麻患者清醒前最危险的并发症为呕吐物窒息。

31. 【答案】B

【解析】急腹症未明确诊断前禁止用吗啡等止痛药，以免掩盖病情。

32. 【答案】C

【解析】寒冷季节的婴幼儿腹泻 80% 由病毒感染引起，尤其以轮状病毒感染多见，是婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原体，因此小儿腹泻通常又称为“秋季腹

泻”。

33. 【答案】B

【解析】妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血是前置胎盘的主要症状。

34. 【答案】D

【解析】在异位妊娠中，输卵管妊娠最为常见，以壶腹部妊娠多见，其次是峡部。

35. 【答案】D

【解析】纠正休克、及时终止妊娠是处理胎盘早剥的处理原则。

36. 【答案】C

【解析】

I 度

轻型：宫颈外口距离处女膜 $<4\text{cm}$ ，但未达处女膜缘；

重型：宫颈外口已达处女膜缘，检查时在阴道口可见到宫颈。

II 度

轻型：宫颈已脱出阴道外口，但宫体仍在阴道内；

重型：宫颈及部分宫体已脱出阴道口外。

III 度：宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

37. 【答案】B

【解析】由于畸形的存在，致右心压力增高并超过左心而血液从右向左分流；或大动脉起源异常时，导致大量回心静脉血进入体循环，引起全身持续性青紫。

38. 【答案】A

【解析】动脉导管未闭时主动脉血液分流至压力较低的肺动脉内，及左向右分流，当肺动脉压力等于或超过主动脉时左向右分流消失，甚至逆转为右向左分流，病人出现发绀。房间隔缺损时左心房压力高于右心房左向右分流，右心负荷增加，肺动脉压力上升导致肺动脉高压，右心房压力增高发生右向左逆流，室间隔缺损原理同上。法洛三联症肺动脉狭窄右心压力上升超过左心血液经室间隔缺损发生右向左分流。

39. 【答案】A

【解析】法洛三联症是一种常见的先天性心脏畸形。其基本病理为室间隔缺损、肺动脉狭窄、主动脉骑跨和右心室肥厚。

40. 【答案】C

【解析】张力性气胸的处理要迅速排气减压，在患侧锁骨中线与第二肋间连线处，用粗针头穿刺胸膜腔排气减压，并外接单向活瓣装置。紧急状态下可在针柄部外接柔软小口塑料瓶、气球等，使胸腔内气体易于排出，外界气体不能进入胸腔。

41. 【答案】B

【解析】铁的摄入不足是导致患儿缺铁性贫血最主要的原因。

42. 【答案】A

【解析】女性外生殖器组成：阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭

43. 【答案】B

【解析】起病2周内患儿应卧床休息，待水肿消退、血压降至正常、肉眼血尿消失，方可下床轻微活动或户外散步。

44. 【答案】A

【解析】新生儿败血症最易并发化脓性脑膜炎，当病原菌进入血循环，迅速繁殖并产生毒素，引起一系列临床表现时称败血症。

45. 【答案】A

【解析】前囟隆起一般提示颅内压升高，容易诱发脑疝，最应该注意。

46. 【答案】D

【解析】是由于接生时，脐部消毒处理不当所致。因大多在生后六、七天发病，故民间又称“四六风”或“七日风”。

47. 【答案】D

【解析】热性惊厥是儿童时期最常见的惊厥性疾病，多发生于上呼吸道感染感染的初期，当体温骤升至 $38.5\text{--}40^{\circ}\text{C}$ 时，突然发生惊厥。及时控制体温是预防惊厥的关键。

48. 【答案】D

【解析】蓝光疗时要用眼罩保护眼睛，用尿布保护会阴部。但尿布遮盖面积不可过大，以便使皮肤与更多的光接触。

49. 【答案】B

【解析】单面光疗照射 2 小时翻身一次；照射距离 $30\sim 50\text{cm}$ ；血清胆红素小于 $171\mu\text{mol/L}$ 可停止照射；一般 $12\sim 24$ 小时血清胆红素可恢复正常；灯管使用 1000 小时应更换

50. 【答案】C

【解析】佝偻病主要是因为缺乏维生素 D。

51. 【答案】B

【解析】肛管排气时，保留肛管不超过 20 分钟。长时间留置肛管，会降低肛门括约肌的反应，甚至导致肛门括约肌永久性松弛。

52. 【答案】B

【解析】肝硬化患者的并发症有上消化道出血，排出柏油样便。

53. 【答案】D

【解析】静脉输液的目的：1. 补充水分及电解质，预防和纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱。2. 增加循环血量，改善微循环，维持血压及微循环灌注量。3. 供给营养物质，促进组织修复，增加体重，维持正氮平衡。4. 输入药物，治疗疾病。

54. 【答案】B

【解析】氧浓度 (%) = $21 + 4 \times \text{氧流量 (L/min)}$

55. 【答案】B

【解析】心肺复苏流程为 CAB：第一步为 C，代表胸外按压；第二步为 A，代表着开放气道；第三步为 C，代表着人工呼吸。

56. 【答案】D

【解析】口服中毒者要反复洗胃，可用清水、2%碳酸氢钠或 1:5000 高锰酸钾进行洗胃，直至洗清至无大蒜味为止。

57. 【答案】B

【解析】脉率低于 60 次/分，称为缓脉。常见于颅内压增高、房室传导阻滞、甲减病人。

58. 【答案】D

【解析】通气过度，患者可出现昏迷、抽搐等碱中毒症状。

59. 【答案】D

【解析】医生确定患者死亡，并开出死亡诊断书才能确认为死亡。

60. 【答案】C

【解析】医嘱错误，护士有提醒的义务，造成医疗事故应该由医生和护士共同承担。

61. 【答案】D

【解析】四人搬运法适用颈、腰椎骨折和病情较重的病人。

62. 【答案】C

【解析】T管引流的目的：1. 引流胆汁和减压；2. 引流残余结石；3. 支撑胆道。

63. 【答案】B

【解析】应给予清淡易消化饮食。

64. 【答案】C

【解析】在房间适当安放花草、地毯容易造成患者过敏，引起呼吸困难。

65. 【答案】D

【解析】该患者发生了输血反应中的发热反应，护理措施如下：症状轻的病人可减慢输血速度或暂停输血，严重的病人要立即停止，维持静脉通路，及时通知医生，以便处理。病人有寒战，应注意保暖，或加盖被，出现高热，

给予物理降温。严密监测病情变化，遵医嘱给予解热镇痛药，抗过敏药或肾上腺皮质激素等。保留余血及输血器，以便查明原因。

66. 【答案】D

【解析】急腹症在未明确病情前忌用热疗，虽然热疗可以减轻腹痛，但是会掩盖病情而贻误诊断和治疗。

67. 【答案】D

【解析】股骨颈骨折多发生于老年人，以女性为多。常出现骨折不愈合（约15%）和股骨头缺血性坏死（20-30%）

68. 【答案】B

【解析】头顶放冰袋，足底放热水袋。足底禁用冷疗，用冷可反射性引起末梢血管收缩，影响散热；还可以引起一过性的冠状动脉收缩。

69. 【答案】D

【解析】防止窒息。

70. 【答案】D

【解析】防止温度过高引起烫伤。

71. 【答案】BDE

【解析】大便潜血试验前3天起应禁食深色食物，如肉类、肝类、动物血、含铁丰富的药物及食物、绿色蔬菜等，以免造成假阳性。

72. 【答案】ABD

【解析】咬破体温计时，首先应及时清除玻璃碎屑，以免损伤唇、舌、口腔、食管、胃肠道黏膜，再口服蛋清或者牛奶，以延缓汞的吸收。若病情允许，

可食用粗纤维食物，加速汞的排出。

73. 【答案】BCD

【解析】妊娠 32~34 周、分娩期及产后的最初 3 天内，是患有心脏病的孕妇最危险的时期。

74. 【答案】ACD

【解析】血容量已补足的指征：四肢末端由湿冷、青紫转为温暖、红润；脉搏由快、弱转为正常、有力；收缩压接近正常，脉压差大于 4kPA. (30mmHg) 肛温与皮温差从大于 3℃ 转为小于 1℃；尿量大于 30mL/h；中心静脉压恢复正常(5cmH₂O~13cmH₂O)。

75. 【答案】CD

【解析】有机磷中毒的特效解毒药是阿托品和解磷定。

76. 【答案】ABCD

【解析】颅内压增高病人应避免剧烈咳嗽、便秘、提重物等，防止颅内压骤然升高而诱发脑疝；润肠、保持大便通畅，避免用力排便及高位灌肠以防颅内压骤然增高；慎重做腰穿，以免引起脑疝。

77. 【答案】BC

【解析】静脉补钾的注意事项：不宜过快，过浓，过多，见尿补钾（尿量达 40ml/h 或者 500ml 每天）。不可静推。每日补钾 40~80mmol，合氯化钾 3~6g。

78. 【答案】ABCD

【解析】小儿惊厥持续状态指惊厥持续 30 分钟以上，或两次发作间歇期意识不能完全恢复者。为惊厥的危重型。惊厥状态可反复发作，发作期间患儿

意识不清。

79. 【答案】ABC

【解析】颅内压增高的“三主征”是头痛、呕吐、视神经乳头水肿，其中视神经乳头水肿是颅内压增高的客观指征。

80. 【答案】BC。

【解析】（1）去枕仰卧位：全身麻醉后尚未清醒或昏迷的患者，可防止呕吐物流入器官，引起窒息或并发症；可防止椎管内麻醉或脊髓腔穿刺后的患者颅内压减低而引起的头痛。（2）支气管哮喘的患者：端坐位或者坐位。

（3）颅脑手术后的清醒的患者：床头抬高 15--30 度，以利于脑静脉回流，减轻脑水肿。深昏迷的病人取侧卧位或者侧俯卧位，以利于口腔内分泌物排出。保持头与脊柱在同一直线上，头部过伸或者过屈会影响呼吸道通畅以及颈静脉回流，不利于降低颅压。

81. 【答案】ABCD

【解析】抢救患者不包括尸体料理，因患者尚未死亡。

82. 【答案】ACD

【解析】在紧急情况下护士可以对患者先实行救护，但不可独立下医嘱。

83. 【答案】ABC

【解析】临终关怀不以延长临终者的生存时间为目的，而以提高临终阶段的生存质量为宗旨。

84. 【答案】ABCD

【解析】吸痰所有物品每天更换 1-2 次。

85. 【答案】AB

【解析】胸部外伤急救主要为保持呼吸道通畅和吸氧。

86. 【答案】ABCD

【解析】注射部位应避免神经、血管处，不可在炎症，瘢痕、硬结、皮肤受损处进针。

87. 【答案】BCDE

【解析】刷手的正确顺序是前臂-腕部-手背-手掌-手指-指缝-指甲。

88. 【答案】ACD

【解析】保护患儿安全不包括培养患儿的独立活动能力和禁止一切活动。

89. 【答案】ABCD

【解析】高危儿指已发生或有可能发生危重情况而需要密切观察的新生儿。如母亲异常妊娠史的新生儿，异常分娩的新生儿，出生时有异常的新生儿。

90. 【答案】BCD

【解析】新生儿的血容量为体重的 10%，如超过易发生心力衰竭。新生儿出血 30ml、相当于成人失血 450ml。

91. 【答案】B

【解析】婴幼儿期引起的热性惊厥最常见病因是高热。

92. 【答案】A

【解析】营养性缺铁性贫血是由于体内铁缺乏致使血红蛋白合成减少而引起的小细胞低色素性贫血，多发生于 6 个月-2 岁儿童。

93. 【答案】A

【解析】停经是妊娠最早的症状。

94. 【答案】B

【解析】责任护士一般几个月才轮换，实行 8 小时在岗、24 小时负责制。

95. 【答案】A

【解析】空气消毒有效距离不超过 2m；物品消毒有效距离 25-60Cm。

96. 【答案】A

【解析】新生儿皮肤很嫩，乙醇对皮肤有刺激性。再加上血管扩张，过度吸收引起中毒。高热病人血管过度扩张和循环加速血液流动，也容易中毒。血液病人有出血倾向，因此酒精擦浴时会造成血管剧烈收缩，造成血管痉挛甚至再出血。

97. 【答案】B

【解析】如需同时注射多种药物，一般先注射刺激性较弱的药物，再注射刺激性较强的药物。

98. 【答案】B

【解析】红霉素、阿莫西林、头孢菌素类等药物对消化道刺激性较小，无需饭后服用。

99. 【答案】A

【解析】夹闭尿管主要锻炼膀胱的反射功能。

100. 【答案】B

【解析】伤寒患者灌肠时溶液不超过 500ml，压力要低（液面不得超过

华图教育旗下专业品牌



专注护考 精于辅导

肛门 30cm)。