

## 2017 执业药师考试药学综合知识与技能

### 一、最佳选择题

1. 药师在审核处方时，无要求医生确认或重新开具处方的情形是

- A. 诊断为麻疹，使用阿莫西林抗感染治疗
- B. 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开具在同一张处方上
- C. 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- D. 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- E. 低分子肝素的给药方法为静脉滴注

答案：B

2. 患者到药店购买鱼肝油，药师应给予

- A. 鱼油
- B. 维生素 A
- C. 维生素 D
- D. 维生素 AD
- E. 维生素 E

答案：D

3. 双歧三联活菌制剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

- A. 温度不超过 20℃
- B. 温度 10℃~30℃
- C. 温度不超过 20℃且遮光
- D. 温度不超过-5℃且避光
- E. 温度在 2℃~10℃之间

答案：E

4. 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是

- A. 甲睾酮
- B. 可卡因
- C. 哌替啶
- D. 人促红素
- E. 麻黄碱

答案：D

5. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注，要求滴注时间不得少于 1h。已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是

- A. 7 滴
- B. 15 滴
- C. 25 滴
- D. 50 滴
- E. 60 滴

答案：C

6. 急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱的患者不宜静脉滴注的药物是

- A. 胰岛素注射液
- B. 生长抑素注射液
- C. 葡萄糖注射液
- D. 乌司他丁注射液
- E. 脂肪乳注射液

答案：E

7. 下列关于癌痛患者的镇痛药使用原则，错误的是

- A. 按患者疼痛程度分阶梯给药
- B. 疼痛时用药，不疼痛时不用药
- C. 提倡无创的给药方式
- D. 用药须个体化
- E. 按时给药，而不是按需给药

答案：B

8. 患者，女，24岁，一周前曾有同事患有沙眼，系衣原体感染，后发现自己也出现眼红、眼氧等不适，来药店购药，药师可推荐的药物是

- A. 酞丁安滴眼液
- B. 色甘酸钠滴眼液
- C. 玻璃酸钠滴眼液
- D. 毛果芸香碱滴眼液
- E. 吡诺克辛滴眼液

答案：A

9. 患者，男，57岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为H1N1甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A. 阿昔洛韦
- B. 金刚烷胺
- C. 金刚乙胺
- D. 利巴韦林
- E. 奥司他韦

答案：E

10. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是

- A. 大于60岁
- B. 绝经后10年之内或60岁以前
- C. 绝经后5年之内
- D. 绝经后15年之内或大于60岁
- E. 绝经后20年之内

答案：B

11. 患者，男，59岁，哮喘病史8年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

- A. 阿司匹林
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 华法林
- D. 氯吡格雷
- E. 依诺肝素

答案：A

12. 痛风缓解期，宜选用的治疗药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 阿司匹林
- C. 秋水仙碱
- D. 泼尼松
- E. 双氯芬酸钠

答案：A

13. 下列关于服用阿昔洛韦治疗带状疱疹的说法，错误的是

- A. 应尽早使用阿昔洛韦
- B. 口服给药，每日给药5次
- C. 治疗疗程一般为7-10天
- D. 阿昔洛韦主要经肝脏代谢，肾功能不全患者不需减量使用
- E. 除口服外，可局部使用阿昔洛韦软膏

答案：D

14. 下列关于失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A. 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮卓类抗失眠药
- B. 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测
- C. 对于长期应用镇静催眠药物的慢性失眠患者，提倡药物连续治疗
- D. 焦虑症患者存在失眠时，以抗失眠药物为主
- E. 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病

答案：E

15. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应，用药期间不宜饮酒的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 阿奇霉素
- C. 甲硝唑
- D. 阿司匹林
- E. 伊曲康唑

答案：C

16. 患者，男，80岁，因发热、咳嗽、咳痰2天就诊，诊断为社区获得性肺炎，给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状，最可能引起该症状的药物是

- A. 甘草合剂
- B. 氨溴索
- C. 对乙酰氨基酚
- D. 左氧氟沙星
- E. 维生素 C

答案: D

17. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法, 错误的是

- A. 应尽可能单一用药, 足量、足疗程治疗
- B. 剂量递增, 尽可能采用最小有效剂量, 使不良反应减至最小
- C. 当单药治疗无效时, 可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- D. SSRI 类抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用
- E. 抗抑郁药起效较快, 使用 1 周后可判定疗效

答案: E

18. 可使高血压患者血压升高的药物是

- A. 速感宁胶囊
- B. 复方酚咖伪麻胶囊
- C. 银翘解毒片
- D. 抗感宁胶囊
- E. 复方田七胃痛胶囊

答案: B

19. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法, 错误的是

- A. 禁食富含碘的食物
- B. 避免使用含碘药物
- C. 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- D. 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑
- E. 给予充足的热量、蛋白质和维生素

答案: D

20. 药师在指导患者合理用药时, 应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是

- A. 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- B. 左甲状腺素与钙剂同服
- C. 华法林与人参同服
- D. 异烟肼与牛奶同服
- E. 利福平与脂肪餐同服

答案: A

21. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法, 错误的是

- A. 可静脉滴注维生素 B<sub>12</sub> 100~500ugqd
- B. 老年人和酗酒者为高危人群
- C. 恶性贫血者需要终生维持治疗

- D. 全胃切除的幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗  
E. 在不能确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时，叶酸应联合维生素 B12 治疗

答案：A

22. 短效口服避孕药的主要组成成分是

- A. 雌激素  
B. 孕激素  
C. 雌激素+雄激素  
D. 雌激素+孕激素  
E. 孕激素+雄激素

答案：D

23. 下列药物使用方式，正确的是

- A. 酵母片在餐后整片用水送服  
B. 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服  
C. 氧氟沙星滴眼液打开使用后，继续使用 3 个月  
D. 红霉素软膏涂敷于眼睑内，每晚睡前一次  
E. 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

答案：E

24. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的药物特点是

- A. 分子量大、弱碱性  
B. 弱酸性、蛋白结合率低、半衰期长  
C. 脂溶性高、分子量小  
D. 蛋白结合率高、具有手性、分布容积大  
E. 蛋白结合率高、分子量大

答案：C

25. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A. 创面及时外涂甲紫溶液预防感染  
B. 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染  
C. I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏  
D. 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪  
E. 失水较多的患者应多饮白开水或无盐饮料

答案：C

26. 患者，女，45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症，近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A. 头孢呋辛酯  
B. 莫西沙星  
C. 氨溴索  
D. 阿莫西林  
E. 对乙酰氨基酚

答案：B



27. 患者，男，65岁，身高170cm，体重60kg。经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌肝清除率45ml/min)，诊断为2型糖尿病、肾功能不全，该患者应首选的药物是

- A. 格列本脲
- B. 格列齐特
- C. 格列吡嗪
- D. 格列喹酮
- E. 格列美脲

答案：D

28. 说明书中没有标明儿童用药剂量时，可以根据儿科用药剂量换算方法进行计算。下列计算方法，错误的是

- A. Fried 公式，婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150
- B. 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/儿童体表面积(m<sup>2</sup>)
- C. 儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m<sup>2</sup>)/1.73(m<sup>2</sup>)
- D. 儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70
- E. Young 公式，小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/(年龄+12)

答案：B

29. 药师在工作中防范用药错误可以采取的行为，不包括

- A. 严格审核处方
- B. 仔细核对药品
- C. 自行修改错误处方
- D. 进行用药指导
- E. 规范操作流程

答案：C

30. 细菌性尿路感染，最常见的致病菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 肠球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 克雷伯杆菌
- E. 葡萄球菌

答案：A

31. 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法，错误的是

- A. 口服后30分钟内应保持立位或坐位
- B. 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、减少胃肠道刺激
- C. 应避免同时使用两种双膦酸盐
- D. 食管炎为典型不良反应
- E. 已批准用于提早绝经女性骨质疏松的防治

答案：B

32. 患者，男，70岁，典型的“面具脸”“慌张步态”表现，临床诊断为帕金森

森病，患者同时患有前列腺增生，不宜选用的药物是

- A . 普拉克索
- B . 卡比多巴
- C . 甲基多巴
- D . 苯海索
- E . 金刚烷胺

答案：D

33. 良性前列腺增生症老年患者，应用  $\alpha_1$  肾上腺素能受体阻断剂治疗时可能导致的不良反应是

- A . 尿潴留
- B . 干咳
- C . 体位性低血压
- D . 乳腺增生
- E . 前列腺特异性抗原（PSA）水平升高

答案：C

34. 患者，男 77 岁，因感冒、发热、咳嗽，自服酚麻美敏片、维 C 银翘片，三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 维生素 C
- C. 氯苯那敏
- D. 银翘
- E. 右美沙芬

答案：C

35. 根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》，体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是

- A. BMI  $\leq 18.5$
- B. BMI  $\geq 28.0$
- C. BMI  $\leq 21.5$
- D. BMI  $\geq 24.0$
- E. BMI  $\geq 25.0$

答案：B

36. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，宜选择的药物是

- A. 比沙可啶
- B. 硫酸镁
- C. 阿托品
- D. 东莨菪碱
- E. 乳果糖

答案：E

37. 患者，女 27 岁，妊娠 20 周，出现发热，体温最高达 38.5 摄氏度，体格检

查：肾区叩痛，经相关实验室检查，诊断为急性肾盂肾炎，宜选用的药物是

- A. 头孢噻肟钠
- B. 甲硝唑
- C. 阿米卡星
- D. 阿奇霉素
- E. 诺氟沙星

答案：A

38. 癫痫持续状态首选的治疗方案是

- A. 口服丙戊酸钠 200mg
- B. 静脉注射丙戊酸钠 200mg
- C. 静脉注射地西洋 10mg
- D. 口服地西洋 10mg
- E. 肌内注射地西洋 10mg

答案：C

39. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

- A. 硫酸镁
- B. 聚乙二醇 4000
- C. 乳果糖
- D. 番泻叶
- E. 比沙可啶

答案：D

40. 下列药物中，适宜在睡前服用的是

- A. 泼尼松
- B. 辛伐他汀
- C. 美洛昔康
- D. 多潘立酮
- E. 奥利司他

答案：B

二、配伍选择题（共 50 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用，每题只有 1 个备选项最符合题意）

[41-43]

- A. 头孢克洛
- B. 复方磺胺甲恶唑
- C. 阿莫西林
- D. 华法林
- E. 诺氟沙星

41. 可能影响儿童骨骼发育的药物是

42. 可分泌到乳汁中，引起新生儿黄疸的药物是

43. 老年人因血红蛋白含量低，用药后游离药物浓度可能明显增加的药物是



答案：EBD

[44-46]

- A. 静脉滴注给药
- B. 每日给药 3 次
- C. 每日给药 1 次
- D. 2~3 个半衰期给药 1 次
- E. 每个半衰期给药 1 次

临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

44. 半衰期 12h 的药物，通常选择

45. 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择

46. 半衰期大于 24h 的药物，通常选择

答案：EAC

[47-48]

- A. 莫沙必利
  - B. 多潘立酮
  - C. 聚乙二醇 4000
  - D. 双八面体蒙脱石
  - E. 阿苯达唑
47. 治疗肠道蛔虫病可选用
48. 治疗急性腹泻可选用

答案：EC

[49-50]

- A. 痛风患者
  - B. 心力衰竭患者
  - C. 双侧肾动脉狭窄患者
  - D. 哮喘患者
  - E. 胃溃疡患者
49. 高血压治疗药物选择时，ACEI 类药物禁用于
50. 高血压治疗药物选择时，噻嗪类利尿剂慎用于

答案：CA

[51-52]

- A. 干酵母
  - B. 乳果糖
  - C. 比沙可啶
  - D. 硫酸镁
  - E. 双歧杆菌
51. 有较强刺激性，服药时不可嚼碎的泻药是
52. 肝性脑病合并便秘患者首选的泻药是

答案：CB

[53-55)

- A. 吡嗪酰胺
- B. 链霉素
- C. 乙胺丁醇
- D. 左氧氟沙星
- E. 利福平

53. 抗结核联合治疗方案中，可引起耳蜗神经损伤不良反应的药物是

54. 抗结核联合治疗方案中，可出现橘红色尿的药物是

55. 抗结核联合治疗方案中，可引起球后视神经炎不良反应的药物是

答案：BEC

[56-58]

- A. 左旋多巴片
- B. 维 A 酸片
- C. 非洛地平片
- D. 去氨加压素片
- E. 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

56. 高脂饮食可促进其吸收的药物是

57. 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是

58. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸，会影响其吸收、降低疗效的药物是

答案：BCA

[59-60]

- A. 吡喹酮片
- B. 硝酸咪康唑栓
- C. 甲硝唑栓
- D. 伏立康唑片
- E. 莫匹罗星软膏

59. 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是

60. 治疗真菌性阴道炎首选的药物是

答案：CB

[61-62]

- A. 复方氯化钠注射液
- B. 50%葡萄糖注射液
- C. 低分子右旋糖酐注射液
- D. 5%葡萄糖注射液
- E. 0.9%氯化钠注射液

61. 配制青霉素输液的适宜溶媒是

62. 配制两性霉素 B 输液的适宜溶媒是

答案：ED

[63-65]

- A. D 级

B. C 级

C. X 级

D. B 级

E. A 级

根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别

63. 依那普利的妊娠毒性分级是

64. 头孢曲松的妊娠毒性分级是

65. 正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是

答案：ADE

[66-67]

A. 复方苯甲酸酊

B. 炉甘石洗剂

C. 维 A 酸乳膏

D. 阿昔洛韦软膏

E. 氢化可的松软膏

66. 治疗水疱型脚癣宜选用

67. 治疗中度痤疮宜选用

答案：AC

[68-69]

A. 30.0

B. 25.0

C. 33.3

D. 20.0

E. 10.0

68. 用 10% 的氯化钠注射液和注射用水配制 3% 的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10% 氯化钠注射液的毫升数是

69. 5% 葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是

答案：AB

[70-71]

A. 氢己定含漱液

B. 左旋咪唑片

C. 替硝唑含漱液

D. 西地碘含片

E. 地塞米松粘贴片

70. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是

71. 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是

答案：ED

[72-73]

A. 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

- B. 长效  $\beta_2$  受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- C. 吸入型糖皮质激素+镇咳药+ 抗过敏药
- D. 吸入型糖皮质激素+祛痰药+ 镇咳药
- E. 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

72. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴浓痰者宜选用的治疗方案是

73. 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV1<50%) 宜选用的治疗方案是

答案: EB

[74-76]

- A. 阿司匹林
- B. 阿托品
- C. 吲达帕胺
- D. 氯苯那敏
- E. 胰酶

74. 服用后可致视物模糊, 驾驶员应慎用的药物是

75. 服用后可引起多尿, 驾驶员应慎用的药物是

76. 服用后可致嗜睡, 驾驶员应慎用的药物是

答案: BCD

[77-79]

- A. 氟马西尼
- B. 阿托品+碘解磷定
- C. 乙酰半胱氨酸
- D. 纳洛酮
- E. 硫代硫酸钠

77. 阿片类药物中毒的解救药物是

78. 地西洋中毒的解救药物是

79. 有机磷中毒的解救药物是

答案: DAB

[80-82]

- A. CTP 评分标准
- B. 数字评分法
- C. APACHE 评分系统
- D. Beers 标准
- E. Cochrane 证据分级

80. 用于评估癌痛患者疼痛程度的是

81. 用于评价肝功能不全严重程度的是

82. 用于判断老年患者潜在不适当用药的是

答案: BAD

[83-85]

- A. 左耳
- B. 双眼

- C、右耳
- D、右眼
- E、左眼
- 83、处方中外文缩写 OS. 代表
- 84、处方中外文缩写 OU. 代表
- 85、处方中外文缩写 OD. 代表

答案：EBD

[86-88]

- A. 红细胞增多
- B. 血小板增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 血红蛋白减少
- E. 中性粒细胞增多
- 86、急性细菌性扁桃体炎患者常表现为
- 87、过敏性皮炎患者常表现为
- 88、缺铁性贫血患者常表现为

答案：ECD

[89-90]

- A. 氢氯噻嗪
- B. 依那普利
- C. 氨氯地平
- D. 哌唑嗪
- E. 美托洛尔
- 89、高血压伴低钾血症患者慎用的药物是
- 90、高血压伴高钾血症患者慎用的药物是

答案：AB

三、综合分析选择题(共 20 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

(一)患者，女，6 岁，因发热(体温 38、6℃)、头痛、鼻塞、流清涕、咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计数正常。临床诊断为普通感冒。

91. 治疗该患者发热、头痛，首选的药物是
- A. 尼美舒利
  - B. 对乙酰氨基酚
  - C. 美洛昔康
  - D. 双氯芬酸钠
  - E. 氨基葡萄糖

答案：B

92. 治疗该患者咳嗽，首选的药物是



- A. 可待因
- B. 乙酰半胱氨酸
- C. 右美沙芬
- D. 溴己新
- E. 氨溴索

答案：C

93. 根据该患者目前情况，不宜选用的药物是

- A. 头孢克洛干混悬剂
- B. 感冒清热冲剂
- C. 葡萄糖酸锌口服液
- D. 维生素C片
- E. 复方小儿退热栓

答案：A

(二) 患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史，一个月前，因出现哮喘症状就诊，医师处方布地奈德气雾剂 200ug bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100ug pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

94. 药师在用药指导时，应告知患者布地奈德气雾剂正确的使用步骤是

- A. 漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 10s
- B. 呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口
- C. 呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口
- D. 摇匀并揿压阀门→呼气→深吸气→屏气约 10s→漱口
- E. 摇匀→呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约 10s→漱口

答案：E

95. 该患者因近日在浇花时出现心悸和手指轻微震颤而就诊。体格检查：T36.8℃，P120次/min，R28次/min，BP175/190mmHg。出现上述症状的可能原因是

- A. 布地奈德剂量太大
- B. 氨氯地平的不良反应
- C. 硝酸甘油剂量不足
- D. 沙丁胺醇的不良反应
- E. 布地奈德的不良反应

答案：D

96. 该患者血压控制不佳，可考虑联合使用的抗高血压药是

- A. 缬沙坦
- B. 非洛地平
- C. 普萘洛尔

- D. 维拉帕米
- E. 复方利血平

答案: A

(三)患者,男,62岁,既往有高血压病史和磺胺药过敏史,近1年内出现阵发性胸痛,多发生于劳累及情绪激动时,每次发作持续时间约为4~5min,休息2~3min后可自行缓解、体格检查:T36.3℃,P85次/min,R16次/min,BP150/80mmHg,辅助检查提示:血常规、尿常规、心肌酶谱等均正常,总胆固醇6.8mmol/L、LDL-C4.0mmol/L,心电图检查提示:窦性心律,胸导联ST段下移,T波倒置。初步诊断为稳定型心绞痛、高血压、高脂血症,临床治疗方案如下:

姓名: XXX	性别: 男	年龄: 62岁
临床诊断:	富马酸比索洛尔片	2.5mg qd po
稳定型心绞痛	单硝酸异山梨酯缓释片	30mg tid po
高血压	瑞舒伐他汀钙片	40mg qd po
高脂血症	阿司匹林肠溶片	100mg qd po
	吲达帕胺缓释片	1.5mg qd po

97. 本处方中,给药次数错误的药物是

- A. 富马酸比索洛尔片
- B. 单硝酸异山梨酯缓释片
- C. 瑞舒伐他汀钙片
- D. 阿司匹林肠溶片
- E. 吲达帕胺缓释片

答案: B

98. 本处方中,给药剂量错误的药物是

- A. 富马酸比索洛尔片
- B. 单硝酸异山梨酯缓释片
- C. 瑞舒伐他汀钙片
- D. 阿司匹林肠溶片
- E. 吲达帕胺缓释片

答案: C

99. 该患者应禁用的药物是

- A. 吲达帕胺缓释片
- B. 富马酸比索洛尔片
- C. 单硝酸异山梨酯缓释片
- D. 瑞舒伐他汀钙片
- E. 阿司匹林肠溶片

答案: A

100. 该患者服药20天后自觉全身肌肉酸痛,化验结果显示肌酸肌酶升高,引起此不良反应的药物是

- A. 富马酸比索洛尔片

- B. 单硝酸异山梨酯缓释片
- C. 瑞舒伐他汀钙片
- D. 阿司匹林肠溶片
- E. 吲达帕胺缓释片

答案: C

(四) 患者, 女, 54 岁诊断为类风湿关节炎 2 年, 目前服用甲氨蝶呤 (15mg qw) 和塞来昔布 (200mg qd)。患者因担心药品不良反应, 用药不规律, 时断时续, 近日出现关节肿胀和疼痛加重, 晨僵明显, 加用泼尼松 10mg qd。

101. 关于该患者用药注意事项的说法, 错误的是

- A. 泼尼松应于清晨服用
- B. 应定期检测血糖、血压
- C. 应定期检测肝功能
- D. 应定期监测骨密度
- E. 甲氨蝶呤应隔日一次用药

答案: E

102. 关于该患者健康教育的说法, 错误的是

- A. 早期治疗、遵医嘱规律用药
- B. 多晒太阳, 适量补充钙剂、维生素 D, 预防骨质疏松
- C. 一旦症状改善, 应即刻停药
- D. 定期就诊, 评估病情, 调整治疗方案
- E. 定期监测血常规、肝肾功能和粪隐血

答案: C

(五) 患者, 女, 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速, 服用美托洛尔片 25mgbid. 近日因反复胃痛就诊, 胃镜检查诊断为胃溃疡, 幽门螺杆菌阳性, 医师处方: 埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid, 甲硝唑片 0.4gbid, 克拉霉素片 50mgbid, 枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

103. 该处方中, 给药剂量错误的药物是

- A. 克拉霉素片
- B. 埃索美拉唑镁肠溶片
- C. 甲硝唑片
- D. 枸橼酸铋钾胶囊
- E. 美托洛尔片

答案: A

104. 该患者如长期服用埃索美拉唑镁肠溶片, 可能会导致

- A. 维生素 A 缺乏
- B. 维生素 B<sub>12</sub> 缺乏
- C. 维生素 B<sub>2</sub> 缺乏
- D. 维生素 B<sub>6</sub> 缺乏

E. 维生素 D 缺乏

答案: B

(六) 患者, 男, 52 岁, 身高 168cm。体重 85kg。痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊, 实验室检查。空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9-6.1mmol/L), 餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)。血尿酸 580umol/L (正常值: 男性 180-440 umol/L), 血 LDL-C 3.7mmol/L (正常值: 2.1-3.1mmol/L), 肌酐清除率 100ml/min, 颈动脉彩超展示, 动脉粥样硬化, 有混合性脂质斑块。临床诊断: 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

105. 对该患者的治疗方案, 不推荐的是

- A. 应用阿司匹林
- B. 低嘌呤饮食
- C. 适量运动
- D. 控制体重
- E. 应用他汀类药物

答案: A

106. 该患者首选的降糖药是

- A. 格列齐特
- B. 阿卡波糖
- C. 甘精胰岛素
- D. 那格列奈
- E. 二甲双胍

答案: E

107. 该患者采用首选降糖药物后, 经检测餐前血糖已达标, 餐后血糖仍控制不佳, 应考虑联合应用的降糖药是

- A. 二甲双胍
- B. 格列齐特
- C. 甘精胰岛素
- D. 阿卡波糖
- E. 那格列奈

答案: D

108. 该患者联合用药后, 常见的不良反应是

- A. 心律失常
- B. 腹胀
- C. 低血糖
- D. ALT 升高
- E. 水钠潴留

答案: B

(七) 患者, 女, 68 岁, 体重 54kg。因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院, 入院后

生化检查 ALT20IU/L, 血肌酐(Cr)1.8mg/dl. 痰培养为铜绿假单胞菌, 临床选用头孢他啶。查询头孢他啶药品说明书, 成人常用剂量为1日1.5~6g, 分2~3次给药, 肌酐清除率为31~50ml/min时, 剂量为每12小时1g;肌酐清除率为16~30ml/min时, 剂量为每24小时1g;肌酐清除率为6~15ml/min时, 剂量为每24小时0.5g;肌酐清除率<5ml/min时, 剂量为每48小时0.5g。

109. 成年男性的肌酐清除率计算公式为  $C_{cr}=(140 - \text{年龄}) \times \text{体重} / (72 \times Cr)$ , 成年女性的肌酐清除率为男性的0.85。该患者的肌酐清除率约是

- A. 30ml/min
- B. 25.5ml/min
- C. 34ml/min
- D. 40ml/min
- E. 72ml/min

答案: B

110. 该患者头孢他啶的剂量应为

- A. 每24h 1g
- B. 每8h 2g
- C. 每12h 1g
- D. 每24h 0.5g
- E. 每48h 0.5g

答案: A

#### 四、多项选择题。

111. 下列药物中, 易受光线影响的变质, 需要遮光保存的药物有

- A. 碳酸钙
- B. 肾上腺素
- C. VK1
- D. VB12
- E. 甲钴胺

答案: BCDE

112. 氰化物中毒解毒剂有

- A. 纳洛酮
- B. 亚硝酸钠
- C. 二巯丙醇
- D. 亚甲基
- E. 硫代硫酸钠

答案: BDE

113. 甲状腺功能亢进症的临床表现包括

- A. 多食、消瘦、多汗、激动等高代谢症候群
- B. 神经和血管兴奋性增强, 如心悸、手颤
- C. 不同程度的突眼和甲状腺肿大等特征性体征



- D. 声音嘶哑、毛发稀疏、眉毛外端 1/3 脱落  
E. 少数老年患者可表现为乏力、体重明显减轻，称为“淡漠型甲亢”

答案：ABCE

114. 药师应提供的药学服务内容包括

- A. 用药咨询  
B. 药品保障供应  
C. 药学干预  
D. 药学重整  
E. 药物治疗管理

答案：ABCDE

115. 用药后不能马上饮水的情形有

- A. 心绞痛发作患者舌下含服硝酸甘油片  
B. 高血压患者服用硝苯地平控释片  
C. 口腔炎患者使用复方氯己定含漱液  
D. 中暑患者服用藿香正气软胶囊  
E. 发热患者使用阿司匹林泡腾片

答案：AC

116. 《中华人民共和国药典临床用药须知 2010 年版》中规定必须做皮肤敏感试验的药物有

- A. 青霉素钠  
B. 阿奇霉素  
C. 甲钴胺  
D. 阿莫西林  
E. 破伤风抗毒素

答案：ADE

117. 改善认知功能的治疗阿尔茨海默病的药物有

- A. 多奈哌齐  
B. 文拉法辛  
C. 阿米替林  
D. 卡巴拉汀  
E. 丙米嗪

答案：AD

118. 药源性疾病的治疗原则包括

- A. 停用致病药物  
B. 加快致病药物排出  
C. 使用拮抗剂  
D. 调整治疗方案  
E. 对症治疗

答案：ABCDE

119. 可用于提高老年人用药依从性的措施有

- A. 选择简化的用药方案
- B. 使用分时药盒
- C. 告知家属帮忙督导
- D. 进行用药指导
- E. 优先使用注射剂

答案：ABCD

120. 指导合理用药时，应告知患者服药后多饮水的药物有

- A. 复方甘草片
- B. 硝酸异山梨酯片
- C. 复方磺胺甲恶唑片
- D. 磷酸铝凝胶
- E. 阿昔洛韦片

答案：CE