

2017 执业药师考试《中药学综合知识与技能》

一、最佳选择题

1. 根据中医理论，“病”“证”“症”的概念不同，下列表述中属于“病”的是

- A. 厌食
- B. 暖气
- C. 腕痞
- D. 腹胀
- E. 便溏

答案：A

2. 治阳虚证，使用补养药时常佐用少量补阴药的方法称为

- A. 阴阳互补
- B. 阳病治阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳中求阴
- E. 阴中求阳

答案：E

3. 人体生命活动的原动力是

- A. 营气
- B. 宗气
- C. 卫气
- D. 元气
- E. 真气

答案：D

4. 称为“阳脉之海”的经脉是

- A. 带脉
- B. 冲脉
- C. 任脉
- D. 督脉
- E. 阴维脉

答案：D

5. 体质偏阴者，受邪发病后，多表现为

- A. 寒证，虚证
- B. 热证，虚证
- C. 里证，虚证
- D. 里证，实证
- E. 里证，寒证

答案：A

6. 根据七情内伤致病理论，思虑太过可导致

- A. 气上
- B. 气结
- C. 气消
- D. 气下
- E. 气乱

答案：B

7. 中药诊断用以分辨病位与病势深浅的纲领是

- A. 表里
- B. 寒热
- C. 虚实
- D. 气血
- E. 阴阳

答案：A

8. 某男，25岁感受外邪后出现发热、微恶风、头胀痛，咳嗽少痰，咽痛口渴。舌红苔薄黄，脉浮数。应选用的中医治疗法是

- A. 宣肺祛邪解表
- B. 清热宣肺解表
- C. 宣气宣肺解表
- D. 清热解气化痰
- E. 养阴清肺解表

答案：B

9. 某男，65岁，因心悸自汗、神疲乏力，伴见胸痛。就诊，医生检查见谈苔薄白，脉弱而涩，诊断为胸痹，辨证为气虚血瘀，其主要症状特点是

- A. 胸痛胸闷，胸胁胀满
- B. 胸闷如室，痛有定处
- C. 胸痛隐隐，遇劳则发
- D. 胸痛彻背，感寒痛甚
- E. 胸痛彻背，腰酸肢肿

答案：C

10. 某女，48岁，平素喜食辛辣，烦躁易怒，进来胃脘灼痛，泛酸嘈杂，口干口苦，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应选用的中成分是（A）

- A. 加味左金丸
- B. 沉香舒气丸
- C. 附子理中丸
- D. 枳实导滞丸
- E. 香砂养胃丸

答案：A

11. 某男，53岁，患头痛多年，3天前因受情志刺激而加重。现头痛目眩，口干口苦，心烦

易怒，夜寐不宁，舌红苔薄黄，脉弦有力，治宜选用的方剂是

- A. 芎菊上清丸
- B. 川芎茶调散
- C. 通窍活血汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 杞菊地黄丸

答案：D

12. 某男，50岁，形体肥胖，经常眩晕，头重如裹，胸闷恶心，食少多寐。舌苔白腻，脉濡滑，治宜选用的中成药是

- A. 当归龙荟丸
- B. 正天丸
- C. 济生肾气丸
- D. 归脾丸
- E. 半夏天麻丸

答案：E

13. 某女，46岁，因小便频数短赤，灼热疼痛就诊，中医诊断为淋证辨治的西医疾病是（A）

- A. 泌尿系感染
- B. 性功能障碍
- C. 肾功能衰竭
- D. 肾病综合征
- E. 肾小球炎

答案：A

14. 某男，23岁，颜面，胸背痤疮，多时散发于全身，有时聚集于一处，此愈彼此十分痛苦，常伴有皮肤油腻，口渴，尿黄，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数，治宜选用的撑腰是

- A. 清肺抑火丸
- B. 银翘解毒片
- C. 连翘败毒片
- D. 湿毒消胶囊
- E. 防风通圣丸

答案：E

15. 患儿，5岁，近日不思饮食，暖腐酸馊，脘腹胀满，疼痛，大便酸臭，夜寐不安，手足心热，苔白厚腻，脉弦滑。治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 健脾丸
- C. 枳术丸
- D. 保和丸
- E. 二陈汤

答案：D

16. 某男，28岁，鼻塞流脓涕，量多，呈黄绿色，有臭味，嗅觉差，头痛，目眩，耳鸣，口

苦，心烦易怒，小便黄赤，舌红苔黄，脉弦数，治宜选用的中成药是

- A. 鼻炎片
- B. 藿胆片
- C. 辛夷鼻炎丸
- D. 珠黄散
- E. 鼻窦炎口服液

答案：B

17. 具有和胃健脾，导滞消积功能的藏药是

- A. 五味渣驯丸
- B. 六味安消散
- C. 七味红花殊胜丸
- D. 八味沉香散
- E. 十味黑冰片丸

答案：B

18. 蒙医重的“三秽”指的是

- A. 涕，唾，津三种分泌物
- B. 血，脂，白精三种物质
- 内日龙
- C. 稠，稀，汗三种排泄物
- D. 汗，尿，大便三种排泄物
- E. 赫依，希日，巴达干三物质

答案：C

19. 导致血清碱性磷酸酶(ALP)升高的疾病是

- A. 心肌梗死
- B. 溶血性疾病
- C. 胸腔积液
- D. 骨骼疾病
- E. 前列腺肿瘤

答案：D

20. 诊断乙型肝炎的直接证据是

- A. HBsAg
- B. HBcAg
- C. 日 BV-DNA
- D. HBeAg
- E. 抗-HBS

答案：E

21. 系统论述医德规范，著有“大医精诚”专论的方书典籍是

- A. 《普济方》
- B. 《千金翼方》

- C 《备急千金要方》
- D 《太平圣惠方》
- E. 《太平惠民合剂局方》

答案：C

22. 药师调剂处方时必须做到“四查十，外对中有一项内容是对”，

- A. 对方
- B. 对药品
- C. 对药名
- D. 对配伍
- E 对用药合理性

答案：C

23. 某女，42 岁。近日失眠健忘，心悸怔忡，虚烦不安，盗汗。舌淡苔薄，脉细数。医师诊断为不寐，证属阴血亏虚，给了天王补心丹加减。方中酸枣仁调配应付的品种是

- A 生品
- B 麸炒品
- C 醋炒品
- D 清炒品
- E 盐炙品

答案：D

24. 中药番红花的正名是

- A. 红花凡
- B. 藏红花
- C. 西红花
- D. 草红花
- E 红蓝花

答案：C

25. 中药七叶一枝花的正名是

- A. 蚤休儿
- B. 紫参
- C. 玉果
- D. 重楼
- E 草河车

答案：D

26. 某女，28 岁。已妊娠 2 月，因关节痛就诊，医师处方时应禁用的中药是

- A 川芎
- B 丹参
- C 莪术
- D 当归
- E 苍术

答案：C

27. 某男，25岁。每日大便3~4次，便质稀溏，稍食生冷油腻之品则腹泻症状加重，该患者应忌用的中药是

- A. 利湿药
- B. 健脾药
- C. 固涩药
- D. 补气药
- E. 苦寒药

答案：E

28. 安排斗谱时，因外观性状相似混淆，但功效不同，而不宜装于同一药斗中的饮片是

- A. 枳壳、枳实
- B. 山药、关花粉
- C. 当归、川芎
- D. 党参、生黄芪
- E. 砂仁、豆蔻

答案：C

29. 妊娠忌用的中成药是

- A. 十滴水
- B. 板蓝根颗粒
- C. 复方丹参片
- D. 血脂康胶囊
- E. 藿香正气软胶囊

答案：A

30. 一般中药炮制品贮存环境的相对湿度应控制在

- A. 30%—65%
- B. 30%—75%
- C. 35%—65%
- D. 35%—75%
- E. 40%—70%

答案：D

31. 因贮存不当，可使饮片的颜色、气味、形态、内部组织等出现变异，其中易虫蛀与霉变的饮片是

- A. 当归
- B. 贝母
- C. 山药
- D. 牛膝
- E. 黄芪

答案：A

32. 执业药师应对处方进行用药适宜性审核，如发现有不合理联用的药组，应建议纠正的是

- A. 人参养荣丸与归脾丸
- B. 复方丹参滴丸与速效救心丸
- C. 四神丸与附子理中丸
- D. 脑立清胶囊与六味地黄丸
- E. 二陈丸与平胃散

答案：B

33. 指导临床合理用药是执业药师的职责之一，执业药师在指导患者用药时，首先应考虑的问题是

- A. 药物能否发挥疗效
- B. 患者能否按医嘱用药
- C. 患者能否正确使用
- D. 使用的药物是否经济
- E. 药物是否会产生不良反应

答案：E

34. 某男，65岁。因肾虚作喘，服用金匱肾气丸后症状稍有缓解，但出现口燥咽干等症状，为进一步改善症状，执业药师建议加服的中成药是

- A. 蛇胆川贝液
- B. 生脉饮
- C. 清气化痰丸
- D. 参苏丸
- E. 桂龙咳喘宁胶囊

答案：B

35. 某男，28岁出租车司机。感冒2日，发热头痛，拟服药治疗。执业药师建议，该患者不宜选用含马来酸氯苯那敏的中成药是

- A. 感冒软胶囊
- B. 抗感灵片
- C. 强力感冒片
- D. 速感康胶囊
- E. 新复方大青叶片

答案：D

36. 中西药联用得当，相互为用，补短，使疗效增强，病程缩短，药物的毒副作用减少。如与西药解痉药联用，既能提高疗效，又能消除西药腹胀、便秘等不良反应的方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 越婢加术汤
- C. 芍药甘草汤
- D. 补阳还五汤
- E. 苓桂术甘汤

答案：C

37. 某些中药可引起肝损害，其中可导致肝肿大，黄疸的中药是

- A. 半夏
- B. 苦杏仁
- C. 罂粟壳
- D. 苍耳子
- E. 香加皮

答案：D

38. 因含有朱砂，如过量服用，可致急性肾功能衰竭的中药是

- A. 牛黄上清丸
- B. 天王补心丸
- C. 牛黄降压丸
- D. 冠心苏合丸
- E. 牛黄解毒丸

答案：B

39. 因过量服用，可导致心律失常的药物是

- A. 雌黄
- B. 川乌
- C. 蜂毒
- D. 肉桂
- E. 斑蝥

答案：B

40. 近年来，涉及中药注射剂不良反应的报道较多，执业药师应高度关注。中药注射剂临床使用中最常见的不良反应是

- A. 生殖毒性
- B. 致癌作用
- C. 过敏反应
- D. 消化道反应
- E. 血液系统损害

答案：C

[41-42]

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

41. 某女，41岁。闭经半年余，妊娠反应阴性，体检无其他疾病，来医院就诊。辨证为冲任亏虚、天癸早衰。根据藏象理论，与天癸密切相关的脏是

答案：E

42. 某女，35岁经常情志抑郁，善太食少纳呆，月经不调，诊断为郁息，根据藏象理论，主

司疏泄、调畅气机的脏是

答案：B

[43-44]

- A. 实中夹虚
- B. 虚中夹实
- C. 真虚假实
- D. 真实假虚
- E. 因虚致实

43. 某男，40岁，腹满痛拒按，潮热谵语，但下利清水，辨证为热结旁流，病机为“大实有羸状”，属于

答案：D

44. 某男，40岁，腹胀腹痛，时胀时止，食少便溏。自行服用气滞胃痛颗粒，症状不减，辨证为脾失健运，病机为“至虚有盛候”，属于

答案：C

[45-47]

- A. 意识不清，突然转佳
- B. 心烦不宁，呼号骂闹
- C. 表情淡漠，哭笑无常
- D. 意识模糊，目光呆滞
- E. 昏不知人，四肢抽动

45. 某女，20岁，平素情志抑郁，因失恋而致神志异常，诊断为癫病，临床表现可见

答案：C

46. 某女，37岁，平素性情急躁，因暴怒而致神志异常，诊断为狂病，临床表现可见

答案：B

47. 某女，31岁，患癫痫病多年，发作时突然出现神志异常，临床表现可见

答案：E

- A. 午后发热；五心烦热
- B. 午后热甚，身热不扬
- C. 日晡热甚，腹痛便结
- D. 长期低热，劳倦则甚
- E. 发热烦渴，汗多脉洪

48. 某男，30岁。居处潮湿，长夏发病。诊断为湿温潮热，其发热特征是

答案：B

49. 某男，30岁。经常便秘，因饮酒且过里量食用辛辣烤炙之品而发病。诊断为阳明潮热，其发热特征是

答案：C

50. 某男, 73 岁。平素头胀头痛, 午后颧红; 口渴咽干。因操劳过度突然发病, 肢麻震颤, 舌体歪斜, 来院急诊。中医辨证为

答案: D

51. 患儿 5 岁。咽部红肿疼痛 3 日, 体温 39.9℃, 突然肢体抽搐, 两眼上翻, 来院急诊。中医辨证为

答案: C

52. 某女, 30 岁, 难产, 分娩后头晕目眩, 视物模糊, 肌肉瞤动, 手足拘急, 面色无华, 口唇色淡, 中医辨证为

答案: B

[53-55]

- A. 桑菊饮
- B. 百合固金汤
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤
- E. 银翘散

53. 某女, 25 岁, 干咳少痰, 不易咳出, 鼻燥咽干, 舌红少津, 脉细数, 辨证为燥邪伤肺, 治宜选用的方剂是

答案: C

54. 某女, 40 岁, 干咳少痰, 痰中带血, 午后咳甚, 五心烦热, 潮热盗汗, 舌红少苔, 脉细数, 辨证为肺肾阴虚, 治宜选用的方剂是

答案: B

55. 某男, 31 岁, 咳嗽气粗, 咯痰黏稠, 咽痛, 口微渴。舌边尖红苔薄黄, 脉浮数。辨证为风热犯肺, 治宜选用的方剂是

答案: A

56-58

- A. 胃痛暴作, 喜温恶寒
- B. 胃痛胀满, 噎腐恶食
- C. 胃痛隐隐, 饥不欲食
- D. 胃脘胀痛, 连及胁肋
- E. 胃脘灼痛, 痛势急迫

56. 某男, 40 岁。平素性情急躁易怒, 胃痛半月余。辨证为肝胃不和, 其临床特点是

答案: D

57. 某男, 19 岁。暴饮暴食而致胃痛。辨证为饮食停滞, 其临床特点是

答案: B

58. 某男, 57 岁。饮酒过量, 又与其妻吵架而致胃痛。辨证为肝胃郁热, 其临床特点是

答案：E

[59-61]

- A. 清宁丸
- B. 加味保和丸
- C. 槟榔固清丸
- D. 麻仁滋脾丸
- E. 九制大黄丸

59. 某男，56岁，大便干结，小便短赤，腹胀腹痛，口干口臭，舌红苔黄腻，辨证为热结肠胃，治宜选用的中成药

答案：A

60. 某男，79岁，大便秘结，欲便不得，腹中胀痛，纳食减少，舌苔白，脉弦。辨证为气滞郁结，治宜选用的中成药是

答案：C

61. 某女，67岁。大便秘结，面色无华，头晕目眩，口干，舌淡苔少，脉细涩，辨证为津亏肠燥，治宜选用的中成药是

答案：D

[62-63]

- A. 固阴煎
- B. 丹栀逍遥散
- C. 圣愈汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 右归丸

62. 某女，18岁。月经提前，量多，经色紫红，质稠有块，经前乳房、少腹胀痛，烦躁易怒，口苦咽干。舌红苔黄，脉弦数、辨证为肝经郁热，治宜选用的方剂是

答案：B

63. 某女，35岁。月经提前，量少，色淡质稀，腰酸脚软，头晕耳鸣，小便频数，舌淡暗苔薄白，脉沉细。辨证为肾气虚证，治宜选用的方剂是

答案：A

[64-65]

- A. 炭制品
- B. 麸炒品
- C. 醋炙品
- D. 盐炙品
- E. 清炒品

某女，25岁。月经量多，淋漓不断，色淡质稀，气短懒言，四肢不温、舌淡胖苔薄白，脉暖弱。中医诊断为崩漏，证属脾不统血，治以固冲汤(白术、煅龙骨、煅牡蛎、山茱萸、白芍、海螵蛸、茜草根、蒲黄、五倍子)

64. 该处方中的白术，调配时应付

答案：B

65. 该处方中的蒲黄，调配时应付

答案：A

[66-68]

A. 阿胶

B. 石膏

C. 钩藤

D. 栀子

E. 雷丸

66. 使用中药时，需研末冲服的饮片是

答案：E

67. 使用中药时，需样化的饮片是

答案：A

68. 使用中药时，需后下的饮片是

答案：C

[69-70]

A. 另煎

B. 先煎

C. 包煎

D. 后下

E. 捣碎同煎

某女，65岁。大便时溏时泻，水谷不化，稍进油腻之物则大便次数增多，面色萎黄，肢倦乏力。中医辨证为脾胃气虚，治以参苓白术散（人参、茯苓、白术、桔梗、山药、炙甘草、白扁豆、莲子肉、砂仁、薏苡仁）。执业药师发药时，需向患者说明煎药方法

69. 方中砂仁的特殊煎法是

答案：D

70. 方中人参的特殊煎法是

答案：A

[71-73]

A. 生附子

B. 蟾酥

C. 生甘遂

D. 红粉

E. 天仙子毒性中药的药性峻烈，掌握其用法用量显得尤为重要。

71. 用量 0.015-0.03g，多入丸散用的中药是

答案：B

72. 内服，用量0.5-1.5g，炮制后多入丸的毒性中药是

答案：C

73. 只能外用的毒性中药是

[74-75]

A. 1-3g

B. 2-5g

C. 3-6g

D. 3-9g

E. 5-9g

答案：D

74. 《中国药典》规定，北豆根的内服用量应是

答案：D

75. 《中国药典》规定，山豆根的内服用量应是

答案：C

[76-77]

A 乳香

B 牛膝

C 肉桂

D 麻黄

E 青皮

76. 饮片贮存过程中，易泛油的是

答案：B

77. 饮片贮存过程中，易变色的是

答案：D

78-79

A. 泽泻

B. 西红花

C. 细辛

D. 灯心草

E. 花椒

78. 按照对抗贮存法，宜与蕲蛇同贮的是

答案：E

79. 按照对抗贮存法，宜与人参同贮的是

答案：C

80-82

- A. 蜂蜜水
- B. 盐水
- C. 姜汤
- D. 米汤
- E. 黄酒

答案：C

80. 某女二十五岁，恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛鼻流清涕，舌苔薄白，脉浮紧诊断为风寒感冒医师给予感冒清热颗粒治疗，为增强疗效，执业药师建议可使用的药引是

答案：C

81. 某男，51岁，肢体关节紧痛，屈伸不利痛，痛有定处，遇寒痛甚，痛处常有冷感，舌苔薄白，脉弦紧，诊断为痛痹，医生给予寒湿痹颗粒治疗，为增强疗效，执业药师建议可使用的药引是

答案：E

82. 某女，36岁，胃痛隐隐，喜温喜按，纳差，神疲乏空腹痛甚，泛吐清水，大便溏薄，舌淡苔白，脉迟缓，诊断为脾胃虚寒，医师给予小建中颗粒治疗，为增强疗效，执业药师建议可使用的药引是

答案：D

[83-84]

- A. 天麻丸与川贝枇杷露
- B. 四神丸与更衣丸
- C. 胆宁片与苏合香片
- D. 复方丹参滴丸与速效救心丸
- E. 乌鸡白凤丸与平胃散

83 隐含有“十八反”的中成药药组是

答案：A

84 隐含有“十九畏”的中成药药组是

答案：C

[85-87]

- A. 人参归脾丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参健脾丸
- D. 龟龄集
- E. 龟鹿二仙膏

老年人因脏腑生理功能衰退，常感体力不济，神疲健忘，想服用滋补药增强体质，但选药时需辨别征候，合理使用。

85 肾阴虚者宜选用

答案：B

86. 心脾两虚者宜选用

答案：A

87. 肾阳虚者宜选用

答案：D

[88-89]

- A. 出现各种出血症状，严重脱水，白血症
- B. 呼吸麻痹，昏迷惊厥，瞳孔散大，对光反射消失
- C. 急性肾功能衰竭，粒细胞减少，再生障碍性贫血
- D. 呼吸浅表不规则，面色苍白发绀。瞳孔极度缩小呈针尖样
- E. 四肢麻木，痉孪，谵妄，脑水肿，意识障碍，精神错乱

88. 罂粟壳中毒，严重者主要表现为

答案：D

89. 雷公藤中毒，严重者主要表现为

答案：C

90. 苦杏仁病毒，严重者主要变为

答案：B

三、综合分析题

(一)

某男。75岁。小便点滴而下，尿如细线。烦躁口苦。舌紫暗苔黄腻，脉涩。

91. 该患者苔黄腻，其临床意义是

- A. 湿浊
- B. 虚热
- C. 淤血
- D. 湿热
- E. 水停

答案：D

92. 四诊合参，病机属于

- A. 湿热淤阻
- B. 湿热下注
- C. 结石瘀血
- D. 热盛律伤
- E. 阴虚火旺

答案：A

(二)

某女，29岁。咳嗽2月余，干咳无痰，咽喉干痒，时有声音嘶哑。舌红少苔，脉细数

93. 根据八纲辨证，该证属于

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 表证
- D. 阳证
- E. 寒证

答案：D

[94-95]

某女，29岁，咳嗽2月余，干咳无痰，咽喉干痒，时有声音嘶哑，舌红少苔，脉细数

94. 根据脏腑辨证，该证属于

- A. 肺气虚
- B. 风寒袭肺
- C. 肺阴虚
- D. 风热犯肺
- E. 肝火犯肺

答案：C

95. 根据辨证结果，应采取的治法是

- A. 滋阴润肺
- B. 补气益肺
- C. 辛凉清润
- D. 宣肺散寒
- E. 清肝滋肺

答案：A

(三)

某男，70岁，冠心病史7年，常感胸痛隐隐，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌暗淡苔白，脉弱

96. 中医辨证为

- A. 寒凝心脉
- B. 痰瘀痹阻
- C. 气虚血淤
- D. 气阴两虚
- E. 温补心肾

答案：C

97. 根据辨证结果。采取的治法是

- A. 温阳散寒
- B. 益气活血
- C. 豁痰化淤
- D. 益气养阴
- E. 温补心肾

答案：B

98. 根据应采取的治法，不宜选用的中成药是

- A. 麝香保心丸
- B. 通心络胶囊
- C. 芪参胶囊
- D. 舒心口服液
- E. 参芍片

答案：A

99. 近日该患者准备外出旅游，担心旅游劳累，途中发病，自行携带上述不宜服用的中成药，并加倍服用该药。结果现舌麻感。这是因为该中成药含有毒中药，此药是

- A. 斑蝥
- B. 草乌
- C. 蟾酥
- D. 生半夏
- E. 雄黄

答案：C

(四)

某男，72岁。口渴多饮，住院治疗，诊断为2型糖尿病，长期服用西药降糖药，因症状控制不良，诊治，现患者烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，舌红苔薄黄少津，脉滑数。

100. 中医辨证为

- A. 脾胃气虚
- B. 肾阴亏虚
- C. 阴虚燥热
- D. 阴阳两虚
- E. 气阴两虚

答案：C

101. 根据辨证结果，应采取的治法是

- A. 养阴润燥
- B. 健脾益气
- C. 滋阴降火
- D. 温阳滋肾
- E. 益气养阴

答案：A

102. 治宜选用的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 玉女煎
- C. 杞菊地黄丸

- D. 八宝汤
- E. 金匱肾气丸

答案：B

103. 患者因求效心切，又考虑到中成药比中药汤剂服用方便，在继续服用降糖药的同时，自行服用中成药消糖灵胶囊，结果出现头晕、心悸、汗出等症状，急到医院就诊，诊断为低血糖反应，出现低血糖最可能的原因是

- A. 所服消糖灵胶囊含有二甲双胍
- B. 所服消糖灵胶囊含有格列吡嗪
- C. 所服消糖灵含有阿卡波糖
- D. 所服消糖灵胶囊含有格列齐特
- E. 所服消糖灵胶囊含有格列本脲

答案：E

(五)

某女，7岁。患有高血压、冠心病，近日喘咳气通，痰黏色黄，伴胸中烦闷，身热，有汗，舌红苔黄腻，脉滑数，中医辨证为痰热郁肺，治法为清热化痰，宣肺止咳。

104. 治宜选用的方剂是

- A. 华盖散
- B. 杏苏收
- C. 参苏饮
- D. 百合固金汤
- E. 桑白皮汤

答案：E

某女，72岁。患有高血压、冠心病。近痰黏色黄，伴胸中烦闷，日喘咳气涌，身热，有汗。舌红苔黄腻，脉滑数。中医辨证为痰热郁肺。治法为清热化痰、宣肺止咳。

105. 不宜选用的中成药是

- A. 橘红丸
- B. 止嗽定喘口服液
- C. 清肺抑火丸
- D. 蛇胆川贝液
- E. 清气化痰丸

答案：B

106. 上述不宜使用的中成药中含有血压升高的中药是

- A. 苦杏仁
- B. 半夏
- C. 麻黄
- D. 陈皮
- E. 桔梗

答案：C

某患儿。7岁。发育迟缓，冬季来临。家长希望服用膏方调理，带患儿到医院就诊。出诊时见患儿面黄肌瘦，食欲不振，大便溏薄，医师认为暂先不宜服用膏方，拟予汤药调整

107. 根据初诊情况，宜选用的中药是

- A. 陈皮，半夏
- B. 党参，桂枝
- C. 当归，牛膝
- D. 白术，稻芽
- E. 白芍，砂仁

答案：D

108. 经过一段时间同调理，患儿症状有所改善，医师根据其发育迟缓情况，综合分析辨证为肾虚，给予汤药调理，宜选用的中药是

- A. 菟丝子、补骨脂、肉苁蓉、熟地黄
- B. 太子参、淫羊藿、牡丹皮、冬底皮
- C. 人参、鹿茸、苑丝子、补骨脂
- D. 龟甲、鳖甲、生地黄、山茱萸
- E. 人参，党参、丹参、玄参

答案：D

(七)

某女，65岁。患有冠心病，伴慢性心功能不全，表现为心慌气短、动则加剧、下肢浮肿、倦怠乏力等症状，医师开具益气温阳、活血通络、利水消肿中药汤剂(黄芪、人参、黑顺片、丹参、葶苈子、水蛭、泽泻、桂枝、红花、香加皮)。患者服用3剂后出现恶心、呕吐、腹泻、心率减慢、早搏等于临床症状。

109. 该患者服用的汤药中与出现的不良反应症状相关的中药是

- A. 黄芪
- B. 水蛭
- C. 香加皮
- D. 桂枝
- E. 葶苈

答案：C

110. 上述不良反应有关的中药，《中国药典》规定其内服剂量是

- A. 9g~15g
- B. 5g~10g
- C. 3g~9g
- D. 3g~6g
- E. 5g~10g

答案：D

111. 属于运行五行相克关系，解释疾病传变的有

- A. 肝病及肾
- B. 心病及肾

- C. 肺病及肾
- D. 脾病及肾
- E. 肝病及脾

答案：BDE

112. 未病先防的原则和方法有

- A. 重视精神调养
- B. 加强身体锻炼
- C. 控制疾病传变
- D. 注意生活起居
- E. 避免病邪侵害

答案：ABDE

113. 在疾病发展过程中疾病有本质和征象一致，有本质和征象不一致，因此临床治疗有正治和反治不同，下列属于正治的有

- A. 寒者热之
- B. 寒因寒用
- C. 热者寒之
- D. 热因热用
- E. 虚者补之

答案：ACE

114. 某男，72岁，腹泻肠鸣，脐腹作痛，泻后则安，胃寒喜暖，舌淡苍白，脉沉细。治宜选用的中成药有

- A. 四神丸
- B. 固本益肠丸
- C. 香连丸
- D. 参苓白术散
- E. 涩肠止泻散

答案：AB

115. 肝功能不全患者因肝功能减退，药物代谢受到严重影响，在肝脏的作用时间延长。故此类型患者应该在医师的指导下慎重选药，用药师执业药师可给予的合理用药指导有

- A. 服药初始宜从小剂量开始
- B. 不能使用有毒中药
- C. 服药期间定期检查肝功能
- D. 选择肝毒性小的药物
- E. 注意观察用药后的反应

答案：ACE

116. 中药饮片调配后，必须经过药师复核无误后方可发出，调配复核的内容有

- A. 核对处方的药味及剂数是否相符
- B. 复核有无错味、漏味、多味
- C. 审查药品质量有无虫蛀、霉变

- D. 审查调配处方有无乱代乱用现象
- E. 对于需特殊煎煮的药味是否单包并注明用

答案：ABCDE

117. 氢氯噻嗪常见的不良反应为低钾血症，低钠血症、高尿酸血症等，故使用时应该注意氢氯噻嗪的不良反应，同时也要避免重复用药。含有氢氯噻嗪的中成药有

- A. 珍菊降压片
- B. 脂降宁片
- C. 新癢片
- D. 脉君安片
- E. 冠通片

答案：AD

118. 与磺胺类药物合用，会使其在体内溶解性降低而引起结晶尿，导致肾毒性增加的中药有

- A 地榆
- B 乌梅
- C 陈皮
- D 木瓜
- E 女贞子

答案：BCDE

119. 肾脏是药物代谢和排泄的重要器官，肾功能不全时药物代谢和排泄均会受到影响，导致药物蓄积而加重肾脏损害，故肾功能不全者用药时的注意事项有

- A. 忌用有肾毒性的药物
- B. 注意药物相互作用
- C. 坚持少而精的用药原则
- D. 定期检查，及时调整治疗方案
- E. 坚持以疾病是否治愈作为判断终点

答案：ABCD

120. 导致发生中药不良反应的药物因素和使用因素有

- A. 用错品种
- B. 炮制不当
- C. 剂量过大
- D. 配伍失度
- E. 辨证错误

答案：ABCDE