

# 2017 年护士执业资格 考试模拟题

## 《专业实务》

## 2017 年护士执业资格考试模拟题（专业实务）

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 张力性气胸的主要临床表现是

- A. 呼吸音减弱
- B. 气管向健侧移位
- C. 胸膜腔吹风声
- D. 肺萎陷
- E. 常触及皮下气肿

2. 护士在临床中收集资料的方法中**不包括**

- A. 观察
- B. 交谈
- C. 护理体验
- D. 假设
- E. 查阅

3. 马斯洛的层次需要理论中最先要满足的需要是

- A. 生理需要
- B. 安全的需要
- C. 自尊的需要
- D. 爱与归属的需要
- E. 自我实现的需要

4. 下列关于病室环境中不正确的是

- A. 温度为 18~22℃
- B. 湿度 50%~60%
- C. 每次通风 30 分钟

- D. 声音强度维持在 50~60dB
- E. 光线充足
5. 戊二醛浸泡消毒各种内镜的浓度是
- A. 0.5%
- B. 0.2%
- C. 1%
- D. 2%
- E. 5%
6. 冷疗可以选择的部位是
- A. 枕后
- B. 心前区
- C. 颈部
- D. 腹部
- E. 足底
7. 热水坐浴疗法的适应证不包括
- A. 痔手术后
- B. 肛门有伤口
- C. 外阴肿大
- D. 肛门周围炎症
- E. 女性月经期
8. 烧伤后发生休克的最主要原因是
- A. 精神刺激
- B. 创面剧烈疼痛
- C. 大量水分蒸发

- D. 大量血浆自创面外渗  
E. 大量组织坏死分解产物吸收
9. 不属于卡介苗接种的禁忌证的是
- A. 早产儿  
B. 发热  
C. 新生儿腹泻  
D. 结核菌素试验阴性  
E. 有湿疹
10. 发生空气栓塞时，应防止空气阻塞
- A. 肺静脉入口  
B. 主动脉入口  
C. 肺动脉入口  
D. 腹主动脉入口  
E. 上腔静脉入口
11. 使用过氧乙酸消毒时应注意
- A. 消毒物品需悬挂或抖散  
B. 放于阴凉处避免高温引起爆炸  
C. 浸泡金属类物品浓度为 0.2%  
D. 2%过氧乙酸溶液用于手的消毒  
E. 不能用于体温表的消毒
12. 消化性溃疡发生的基本原理是
- A. 幽门螺旋杆菌感染  
B. 胃酸分泌过多  
C. 胃黏膜保护作用减弱

- D. 胃黏膜和胃蛋白酶的消化作用
- E. 黏膜损害因素和保护因素之间失去平衡
13. 关于女性外生殖器的叙述，正确的是
- A. 外阴的范围包括大阴唇，小阴唇，阴蒂，阴道前庭和子宫附件
- B. 小阴唇损伤后易形成血肿
- C. 阴道前庭位于两侧大阴唇之间
- D. 前庭大腺又称巴多林腺
- E. 大阴唇富含神经末梢，很敏感
14. 先天性心脏病右向左分流型最明显的外观特征是
- A. 心脏杂音
- B. 发育迟缓
- C. 持续发绀（青紫）
- D. 心前区隆起
- E. 活动耐力下降
15. “湿温”的好发季节是
- A. 春、夏、秋
- B. 春、秋
- C. 夏、冬
- D. 夏、秋
- E. 冬、春
16. 急性肾衰竭少尿期最主要和危险的并发症是
- A. 高血钾症
- B. 水中毒
- C. 代谢性酸中毒

D. 尿毒症

E. 出血倾向

17. 下列属于濒死患者的临床表现的是

A. 窒息

B. 心搏停止

C. 深反射消失

D. 呼吸衰竭

E. 各系统功能紊乱

18. 患者入院后行尿常规检查，留取尿标本的最佳时间是

A. 晨起第一次尿

B. 收集 12 小时尿液

C. 饭前半小时

D. 随时收集尿液

E. 睡前收集尿液

19. 临床治疗心力衰竭时，应用洋地黄的主要目的是

A. 增强心肌收缩力

B. 减慢心室率

C. 调节心肌耗氧量

D. 抑制心脏传导系统

E. 提高异位起搏点的自律性

20. 护士在执行医嘱时不能

A. 根据需要自行调整医嘱

B. 严格遵守医嘱执行制度

C. 有疑问时重新核对医嘱

- D. 患者有不良反应时复核医嘱
- E. 抢救时执行医生的口头医嘱

21. 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

22. 根据血压水平的定义和分类，血压 130 / 88mmHg 属于

- A. 正常血压
- B. 正常高值
- C. 1 级高血压
- D. 2 级高血压
- E. 3 级高血压

23. 关于医疗机构临床用血的规定，正确的是

- A. 可自行采集
- B. 可将临床多余用血出售给血液制品生产单位
- C. 必须进行配型核查
- D. 必须先行缴费后使用
- E. 主要动员家庭、亲友为患者献血

24. 进行尸体护理时，头下垫一软枕的目的是

- A. 防止面部淤血变色
- B. 用于安慰家属
- C. 便于家属识别

D. 保持尸体整洁

E. 保持尸体位置良好

25. 发生细菌性肝脓肿时，细菌侵入肝脏最主要的途径是

A. 肝动脉

B. 门静脉

C. 肝静脉

D. 胆道系统

E. 十二指肠

26. 肺炎患者出现高热，其饮食原则不包括

A. 高热量

B. 高蛋白

C. 高脂肪

D. 高维生素

E. 多饮水

27. 中医五行学说最基本概念是

A. 生、长、化、收、藏

B. 青、赤、黄、白、黑

C. 金、木、水、火、土

D. 心、肝、脾、肺、肾

E. 阴、阳、精、气、血

28. 病儿住院期间，病案中排列在最前面的是

A. 医嘱单

B. 体温单

C. 入院记录



D. 门诊病历

E. 住院病案首页

29. 心包腔内液体的生理作用是

A. 维持心包腔内压力

B. 润滑作用

C. 营养心肌

D. 免疫作用

E. 维持心肌张力

30. 压疮瘀血红润期的主要特点是

A. 局部皮肤红、肿、热、痛

B. 皮下产生硬结

C. 表皮有水泡形成

D. 局部组织见新鲜创面

E. 浅表组织有脓液流出

31. 下列外文缩写正确的是

A. 每日一次 qod

B. 隔日一次 qd

C. 每晚一次 biw

D. 每晨一次 qm

E. 每周一次 qn

32. 臀大肌注射部位为

A. 髂前上棘与尾骨连线外上  $1/2$  处

B. 髂前上棘与尾骨连线内上  $1/2$  处

C. 髂前上棘与尾骨连线外上  $1/3$  处

D. 髂前上棘与尾骨连线内上 1 / 3 处

E. 髂前上棘与尾骨连线内下 1 / 3 处

33. 测量脉搏首选动脉是

A. 颞动脉

B. 桡动脉

C. 颈动脉

D. 肱动脉

E. 足背动脉

34. 抢救时间的记录不包括

A. 病人到达的时间

B. 医生到达的时间

C. 抢救措施落实的时间

D. 病情变化的时间

E. 家属到达的时间

35. 心脏复苏首选的药物是

A. 阿托品

B. 碳酸氢钠

C. 肾上腺素

D. 利多卡因

E. 地高辛

36. 腰椎间盘突出最易发生的部位是

A. 胸 11~腰 1

B. 腰 1~2

C. 腰 2~3

D. 腰 3~4

E. 腰 4~5

37. 护士首次执业注册应当通过护士执业资格考试之日起 ( ) 提出执业注册申请

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

38. 患者, 42 岁, 半夜急诊, 主诉: 头疼、呕吐、腹泻、腹痛 2 小时, 还自觉发热; 护士给其测量血压为 100/67mmhg, 体温为 37.8℃。下列哪个选项为客观资料

A. 腹泻

B. 头痛

C. 腹痛

D. 恶心

E. 体温为 37.8℃

39. 营养室制定含有瘦肉、蛋黄、猪肚、黑木耳的菜谱适合哪种血液病患者

A. 急性白血病

B. 缺铁性贫血

C. 再生障碍性贫血

D. 特发性血小板减少性紫癜

E. 过敏性紫癜

40. 某高血压病人, 血压突然升高, 剧烈头痛、抽搐、昏迷, 应考虑

A. 高血压危象

B. 急进型高血压

- C. 高血压心脏病
- D. 高血压病Ⅲ期
- E. 高血压脑病

41. 患者男，53岁。急性胃穿孔手术后第6天，出现寒战、高热，右上腹疼痛和压痛，伴有呃逆，首先考虑诊断为

- A. 肠间脓肿
- B. 门静脉炎
- C. 膈下脓肿
- D. 盆腔脓肿
- E. 切口感染

42. 某急性淋巴细胞白血病病人，接受COAP方案化疗期间，采取的对症护理措施哪项不正确

- A. 口腔炎者避免食用刺激性食物
- B. 皮疹者避免使用肥皂水擦洗
- C. 消化道反应呕吐者应暂禁食
- D. 对脱发者应说明化疗结束后可再生
- E. 多饮水并碱化尿液

43. 某肝硬化病人，呕血约500mL，继而出现嗜睡及扑翼样震颤。为及时清除肠道积血，给予灌肠。下列哪种灌肠液不宜采用

- A. 米醋+生理盐水
- B. 生理盐水
- C. 肥皂水
- D. 清水
- E. 1%新霉素溶液

44. 有一急性腹痛病人，腹部检查发现哪种体征提示胃肠穿孔

- A. 腹肌紧张
- B. 压痛及反跳痛
- C. 肝浊音界消失
- D. 移动性浊音
- E. 振水音

45. 某消化性溃疡病人，于饱餐后突然出现上腹剧烈疼痛，腹肌紧张及休克，首先考虑

- A. 溃疡急性穿孔
- B. 溃疡慢性穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆囊炎

46. 某白血病病人，贫血，出血，发热持续不退，热度呈高热稽留于 39.5℃ 左右，该病人的护理问题一体温过高与下列哪项因素有关

- A. 贫血致抵抗力低下
- B. 选用抗生素不当
- C. 白血病细胞浸润
- D. 继发细菌感染及白细胞核蛋白代谢亢进
- E. 巨核细胞减少

47. 某病人，23 岁，黑便和少量呕血近 3 个月，近日突然呕血量增加，能反映其血容量变化的观察项目是

- A. 神志
- B. 瞳孔
- C. 呼吸
- D. 面色
- E. 脉搏

48. 某病人因上消化道出血伴休克紧急入院抢救，下列哪项措施欠妥

- A. 头低足高卧位
- B. 暂禁食
- C. 建立静脉通路
- D. 配血
- E. 氧气吸入

49. 某糖尿病病人，口服优降糖治疗，护士须指导病人此药服用的时间在

- A. 餐后半小时
- B. 餐前半小时
- C. 餐后 20min
- D. 餐前 20min
- E. 餐前 1h

50. 患者女性，28 岁，已婚，入院诊断：系统性红斑狼疮。体检：T38.5℃，面部蝶形红斑，有少许鳞屑，胸腹部检查无异常，尿常规阴性，肾功能检查正常，血抗核抗体阳性，抗双链 DNA 抗体阳性，给予泼尼松 45mg / d 治疗。下列哪项护理措施欠妥

- A. 安置背阳的病室，卧床休息
- B. 限制钠盐摄入
- C. 忌食芹菜、香菜等含补骨脂素食物
- D. 用 30℃ 左右温水湿敷面部，每日 3 次
- E. 预防感染，紫外线消毒病室，每日 2 次

51. 某肝硬化病人合并下消化道大出血，现出现嗜睡，扑翼样震颤，应判断为

- A. 继发性肝癌
- B. 电解质紊乱
- C. 肝肾综合征

D. 肝性脑病

E. 感染

52. 某风湿性心脏病二尖瓣狭窄病人，因急性肺水肿急诊入院，给予酒精湿化吸氧等抢救措施，酒精湿化吸氧的目的是

A. 稀释痰液

B. 解除支气管痉挛

C. 除去气道内泡沫

D. 兴奋呼吸中枢

E. 减少静脉回流

53. 患者女性，60岁。突然出现剧烈头痛，伴有喷射性呕吐，很快出现意识模糊，且脑膜刺激征阳性，此患者可能的诊断是

A. 脑出血

B. 脑栓塞

C. 蛛网膜下腔出血

D. 脑血栓形成

E. 脑梗死

54. 某高血压病人，同时患有支气管哮喘，该病人不能使用哪种降压药物

A. 呋塞米

B. 阿昔洛尔

C. 硝苯地平

D. 卡托普利

E. 氢氯噻嗪

55. 患者女性，70岁，高血压15年，晨起发现右侧肢体瘫痪，当时意识清楚，被家人送到医院进行治疗。CT结果为低密度影，选择溶栓的时间是

- A. 发病后 2 小时内
- B. 发病后 3 小时内
- C. 发病后 4 小时内
- D. 发病后 5 小时内
- E. 发病 6 小时内

56. 患者女性，78 岁，高血压 20 年，家人探视后突然出现剧烈头痛，头晕，呕吐，进而意识障碍，血压 206/110mmHg，CT 显示高密度影，治疗需立刻降颅压和镇静，下列哪种药物禁用

- A. 吗啡
- B. 甘露醇
- C. 地西洋
- D. 硝苯地平缓释片
- E. 尼莫地平

57. 患者，女，24 岁，突然出现呼吸困难，有哮鸣音，诊断为哮喘发作，该患者的首选药是

- A. 氨茶碱
- B. 地塞米松
- C. 色甘酸钠
- D. 青霉素
- E. 沙丁胺醇

58. 孕妇，26 岁，第二产程延长，主要原因是宫缩乏力，下列哪项可以引起宫缩乏力

- A. 羊水过多
- B. 胎膜早破
- C. 巨大儿
- D. 产前静滴缩宫素
- E. 胎儿娩出过快



59. 患者男，20岁，车祸受伤，呼之不应，胸廓无起伏，颈动脉无搏动，心肺初期复苏成功后，更重要的是恢复

- A. 中枢神经功能
- B. 呼吸功能
- C. 循环功能
- D. 代谢功能
- E. 运动功能

60. 某孕妇，34岁。孕29周，GP，“胎动感觉不清”1周入院。经人工破膜及催产素点滴娩出一死婴，即开始出现大量阴道出血，经人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果，出血不止，无凝血块。其出血原因可能是

- A. 软产道损伤
- B. 胎盘残留
- C. 产后宫缩乏力
- D. 子宫腔内感染
- E. 凝血功能障碍

61. 患者男，45岁，从教师20年，双下肢内侧皮下静脉隆起，迂曲，呈团块状，足靴区色素沉着，诊断为原发性静脉曲张，其病因不包括

- A. 长时间站立工作
- B. 静脉壁薄弱
- C. 从事负重工作
- D. 工作环境寒冷
- E. 静脉瓣膜发育不良

62. 患儿，男，2岁。人工喂养，3天前咳嗽、发热、腹泻，体检：体温38.8℃，中度脱水，患儿在补液中突发抽搐，持续约1分钟，抽搐最可能的原因是

- A. 高热惊厥
- B. 急性心衰
- C. 低钙血症
- D. 低钠血症
- E. 中毒性脑病

63. 患者女，30岁。近日感外阴痒、阴道分泌物增多就诊，妇科检查：白带呈豆渣样，阴道黏膜红肿并附有白膜，考虑感染的病原体是

- A. 支原体
- B. 苍白螺旋体
- C. 假丝酵母菌
- D. 阴道毛滴虫
- E. 淋病奈瑟菌

64. 已婚女性，月经规律，月经周期第26天取子宫内膜检查所见：腺体缩小，内膜水肿消失，螺旋小动脉痉挛性收缩，有坏死，内膜下血肿。该内膜为月经的

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌早期
- D. 分泌期
- E. 月经前期

65. 患者，女，45岁。夜间上腹烧灼痛发作3月余，进食或服用阿托品后迅速缓解，诊断为十二指肠溃疡，进食后疼痛缓解的机制是。

- A. 交感神经兴奋
- B. 胃酸被中和
- C. 胃酸增多
- D. 平滑肌松弛

E. 迷走神经张力增加

66. 男性，44岁，双足烧伤，呈黑色、无水疱，无痛感，拔毛试验无疼痛，初期局部创面处理最佳选用

A. 湿润烧伤膏

B. 紫草油

C. 碘伏

D. 2%碘酊

E. 75%酒精

67. 患者，女性。58岁，被诊断为肺癌，病理组织分析为周围型癌，下列关于周围型肺癌的说法正确的是

A. 位于主支气管开口以远，在肺的周围

B. 位于细支气管，在肺的周围

C. 位于叶支气管开口以远，在肺的周围

D. 位于肺门以外的肿瘤，在肺的周围

E. 位于肺段支气管开口以远，在肺的周围

68. 患者女性，36岁。头痛一年，近2个月头痛加重，伴有喷射性呕吐。烦躁后出现意识障碍，右侧瞳孔缩小后又散大，光反应迟钝，左侧肢体运动障碍，呼吸加快。CT示左顶叶肿瘤。紧急抢救措施应是

A. 立即开颅探查

B. 20%甘露醇静脉注射

C. 脑脊液体外引流

D. 去颅骨瓣减压

E. 气管插管，保持呼吸道通畅

69. 患者，男，48岁，在工地进行作业的时候，被楼上掉下的钢板砸住小腿，通过2个小时

的施救才将患者送往医院，此时患者小腿局部出现疼痛，肢体肿胀，皮肤有压痕，变硬，皮下瘀血，皮肤张力增加，在受压皮肤周围有水泡形成，诊断为挤压综合症，挤压综合症最常引起

- A. 急性肾衰竭
- B. 呼吸困难
- C. 心力衰竭
- D. 昏迷
- E. 肝缺血坏死

70. 患者女性，23岁。1周前无意中发现左乳有一无痛性肿块。查体发现肿块位于左乳内上象限，光滑，活动度大，质韧，双侧腋窝未扪及肿大淋巴结，该患者应采取的治疗措施是

- A. 长期口服他莫西芬
- B. 局部热敷
- C. 乳腺腺叶切除
- D. 乳房切除
- E. 肿块切除，送术中病理检查

71. 王女士，经阴道分娩一男婴，该新生儿轻度窒息，其生后1分钟的Apgar评分可能为

- A. 0~1分
- B. 2~3分
- C. 4~7分
- D. 5~8分
- E. 8~10分

72. 患者女性，25岁，既往体检，体检时发现肝功能正常，抗-HBS阳性，反复查HBV其他血清标记物均为阴性。表示此患者为

- A. 乙型肝炎有传染性
- B. 乙型肝炎病情稳定

- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 乙型肝炎恢复期
- E. 对乙型肝炎病毒有免疫力

73. 患者，男性，27岁，经诊断为慢性再生障碍性贫血，该患者的治疗应首选

- A. 免疫抑制剂
- B. 骨髓移植
- C. 雄激素
- D. 支持治疗
- E. 控制感染

74. 患者，男性，24岁，在三天前淋了一场大雨，现在体温 $39.5^{\circ}\text{C}$ ，并伴有寒战、咳嗽。经诊断该患者为肺炎球菌性肺炎，该病人发热的热型为

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 不规则热
- D. 稽留热
- E. 波状热

75. 李先生，24岁。原有溃疡病史，今晨突然呕血，伴冷汗。查：脉搏112次/分，血压80/50mmHg。估计失血量已超过

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

76. 患者，女，32岁，患溃疡性结肠炎3年，急性加重2周入院。入院后护士评估患者的粪

便形态最可能发现的是

- A. 米泔水样便
- B. 柏油便
- C. 黏液脓血便
- D. 白陶土样便
- E. 黄色软便

77. 患者，男性，54岁，在喷洒农药时出现呕吐等症状，被附近村民送往医院，被诊断为有机磷轻度中毒，下列哪项不属于有机磷轻度中毒的症状

- A. 恶心、呕吐、多汗
- B. 视物模糊、瞳孔缩小
- C. 全血胆碱酯酶活力在30%~50%之间
- D. 全血胆碱酯酶活力在50%~70%之间
- E. 肺水肿

78. 患者，男，59岁，食管烧伤后由于瘢痕导致食管狭窄，不能正常进食，靠鼻饲供给营养，每次鼻饲量不能超过

- A. 100ml
- B. 150ml
- C. 200ml
- D. 250ml
- E. 300ml

79. 患者，男，34岁，无痛性血尿2周，疑为膀胱癌，需做膀胱镜检查。护士为患者安置的正确体位为

- A. 中凹卧位
- B. 截石位
- C. 屈膝仰卧位

D. 膝胸卧位

E. 平卧位

80. 王女士，56岁，最近自觉头晕，牙龈出血等现象增加，去医院确诊为慢性再生障碍性贫血，其治疗首选药物为

A. 丙酸睾丸酮

B. 康力龙

C. 叶秋碱

D. 阿托品

E. 达哪唑

81. 患者，女，55岁，绝经5年，近一个月阴道水样白带，近半月出现阴道间断少量流血，查宫颈光滑，宫体稍大且软，附件未扪及。诊断为宫内膜癌。确诊的主要依据是

A. 宫腔镜检查

B. 分段诊断性刮宫

C. B型超声波检查

D. 阴道镜检查

E. 尿检

82. 一个国家或地区，60岁以上人口数达到总人口数的百分之几或者多少岁以上人口达到总人口的7%成为老龄化社会

A. 5%，65岁

B. 7%，65岁

C. 10%，65岁

D. 10%，70岁

E. 10%，80岁

83. 一男性患者，右肩部皮下有一单发无痛性肿物，约3cm\*3cm\*2cm，质韧，界限清，分叶

状，无压痛，生长缓慢，考虑为（）

- A. 皮脂腺癌
- B. 皮样囊肿
- C. 纤维瘤
- D. 脂肪瘤
- E. 血管瘤

84. 患儿，4岁。全身明显浮肿1个月，尿蛋白(+++)，红细胞3~5个/HP，血浆白蛋白22g/L，血胆固醇8.1mmol/L，BUN5.4mmol/L。最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 单纯性肾病
- C. 先天性肾病
- D. 肾炎性肾病
- E. 继发性肾病

85. 患者，男，37岁，饱餐饮酒后出现上腹部持续性剧痛并向左肩、腰背部放射，伴恶心、呕吐10小时，拟诊为急性胰腺炎，为明确诊断最重要的检查是

- A. 外周血象
- B. 腹腔穿刺
- C. 胰腺B超
- D. 血淀粉酶
- E. X线胸腹联合透视

86. 患者男性，37岁，因近2周食欲减退、上腹不适、疲乏无力，就诊，体检：肝肋下2cm，有轻度触痛。为明确诊断首先应检查的项目是

- A. 尿胆红素
- B. 血清胆红素
- C. 血清蛋白



D. 血清丙氨酸氨基转移酶

E. 谷氨酰基转移酶

87. 患者，70岁，经常性失眠，导致其焦虑不已，来医院寻求帮助，目前临床上最常用的镇静、催眠、抗焦虑的药

A. 巴比妥类药

B. 水合氯醛

C. 苯二氮卓类如安定

D. 鲁米那

E. 异丙嗪

88. 新生儿出生后发生了寒冷损伤综合症，一般硬肿常常首发的部位是

A. 面颊

B. 上肢

C. 大腿外侧

D. 小腿

E. 腹部

89. 孕妇，28岁，怀孕20周，询问护士宫底高度，护士该告知其妊娠20周末子宫底高度在

A. 脐下一横指

B. 脐上一横指

C. 脐下二横指

D. 脐上二横指

E. 脐上三横指

90. 患者男性，65岁，颜面水肿，空腹血糖12.3mmol/L，尿糖(++)，尿蛋白(+)，曾不规则治疗，目前降糖治疗应首选

A. 单纯控制饮食

- B. 控制饮食+双胍类药
- C. 控制饮食+磺脲类
- D. 控制饮食+胰岛素
- E. 控制饮食+噻唑烷二酮类

91. 患者，女，45岁，发生心源性呼吸困难，该患者最先出现的临床表现是

- A. 端坐呼吸
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 心源性哮喘
- E. 发绀

92. 患者，女，46岁，风湿性心脏病多年，听说该疾病会造成深静脉血栓，为此非常担心，并向护士询问可能会发生的原因，护士应告知其深静脉血栓形成最主要的危险是

- A. 下肢肿胀，影响病人舒适感
- B. 影响肢体远端供血不足
- C. 引起肺动脉栓塞
- D. 影响心脏供血，导致心衰
- E. 局部组织缺氧坏死

93. 男，42岁，发热2周，伴进行性贫血，全身乏力，急诊入院。体温38.2℃，脉搏98次/min，B超检查提示脾大，初诊为亚急性心内膜炎，需做血培养进一步明确诊断。该病人应取

- A. 2~3 mL
- B. 4~5 mL
- C. 6~8 mL
- D. 10~15 mL
- E. 18~20 mL

94. 患者张某，46岁，因被人刺伤左侧大腿急诊入院，入院时BP70/50mmHg, P125次/min，接诊护士应为患者采取

- A. 平卧位并抬高头胸部约 $10\sim 20^\circ$ ，抬高下肢 $20\sim 30^\circ$
- B. 半卧位
- C. 平卧位并抬高头胸部约 $20\sim 30^\circ$ ，抬高下肢 $10\sim 15^\circ$
- D. 头低脚高位，床尾垫高 $15\sim 30\text{cm}$
- E. 头高脚底位

95. 患者李某，因肺源性心脏病入院，现患者呼吸平稳，活动后感心累，护士观察其病情变化，巡视时间频率为

- A. 3小时
- B. 严密观察病情
- C. 2小时
- D. 1小时
- E. 15~30分钟

96. 患者，男，38岁，1天前右下腹有转移性腹痛，麦氏点有固定的压痛。诊断为阑尾炎，采取保守治疗。现腹痛缓解后突然加重，范围加大，应考虑是

- A. 单纯性阑尾炎
- B. 化脓性阑尾炎
- C. 坏疽性阑尾炎
- D. 阑尾周围脓肿
- E. 阑尾穿孔

97. 王女士，60岁。上腹胀痛不适5年余，近月来胀痛明显，食欲减退、体重下降。纤维胃镜检查结果为慢性萎缩性胃炎伴重度异型增生。治疗宜应用

- A. 西咪替丁

- B. 米索前列醇
- C. 奥美拉唑
- D. 手术治疗
- E. 硫糖铝

98. 患者男性，41岁，既往体健，近日因寒冷突然出现左侧面部剧痛，医院诊断为三叉神经痛，首选的治疗药物是

- A. 阿司匹林
- B. 6-氨基己酸
- C. 卡马西平
- D. 地西洋
- E. 新斯的明

99. 女婴，足月顺产，出生体重3200g，生后48小时，血清总胆红素 $297.5\mu\text{mol/L}$ ，在检查黄疸的原因时，首选的治疗方法

- A. 光照疗法
- B. 换血
- C. 口服苯巴比妥
- D. 白蛋白输注
- E. 输血浆

100. 一孕妇，29岁，既往体健，近1年来发现HBsAg阳性，但无并发症，肝功能正常。经十月怀胎，足月顺利分娩一4500克男婴，为阻断母婴传播，对此新生儿最适宜的预防方法是

- A. 乙肝疫苗
- B. 丙种球蛋白
- C. 乙肝疫苗+丙种球蛋白
- D. 高效价乙肝疫苗球蛋白

E. 乙肝疫苗+高效价乙肝疫苗球蛋白

二、以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(101~104 题)

患者，女，46 岁，风湿性心脏病多年，现在突然出现心慌气短，心电图显示：P 波消失，出现绝对不齐的 f 波，R-R 间期绝对不等。

101. 该患者出现的心率失常是

- A. 心动过速
- B. 心室颤动
- C. 心房颤动
- D. 阵发性心率不齐
- E. 心室传导阻滞

102. 该患者的脉搏特点是

- A. 洪脉
- B. 缓脉
- C. 脉搏短绌
- D. 奇脉
- E. 交替脉

103. 护士在给该患者进行脉搏测试时正确的做法是

- A. 一个护士进行测试
- B. 两个护士同时进行测试，一个听心率，一个测脉搏
- C. 两个护士测试，一个先测心率，一个后测脉搏
- D. 没有特殊要求
- E. 以上均不对

104. 该患者应呈现出什么样的面容

- A. 急性面容
- B. 二尖瓣面容
- C. 慢性病面容
- D. 满月脸
- E. 以上都不对

(105~107 题)

50 岁女性，孕 5 产 5，绝经 3 年，阴道不规则出血 1 个月。妇科检查：外阴阴道正常，宫颈肥大、糜烂、触之易出血，子宫后屈、稍小，双侧附件未见异常。

105. 该患者最可能的出血原因是

- A. 子宫颈炎
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫颈尖锐湿疣
- E. 子宫内膜炎

106. 进一步确诊时需做

- A. B 型超声检查
- B. 宫颈涂片细胞学检查
- C. 宫颈活组织检查
- D. 子宫颈碘试验
- E. 阴道镜检查

107. 若以上检查未发现可疑病灶，下一步最恰当的处理是

- A. 分段刮宫
- B. 子宫镜+子宫内膜活检
- C. 宫颈激光

- D. 宫颈锥切术
- E. 3~6 个月后复查

(108~110 题)

患者男性，65 岁，主因右侧肢体活动不便 4 小时入院，患者神志清楚，有高血压及糖尿病史，曾有过短暂性脑缺血发作史，右侧肢体肌力为 2 级。

108. 确诊最有价值的辅助检查是

- A. 头颅 CT 或 MRI
- B. 肌电图
- C. 腰穿
- D. 脑血管造影
- E. 颈部血管超声

109. 如行 CT 检查无高密度显影，此患者可诊断为

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 颅内肿瘤
- E. 硬膜下血肿

110. 该疾病最常见的病因是

- A. 劳累
- B. 伤风感冒
- C. 动脉粥样硬化
- D. 肥胖
- E. 动脉瘤

(111~113 题)

吴老先生因脑溢血已在家卧床 2 个月，大小便失禁，不能自行翻身，近日尾骶部皮肤呈紫红色，压之不褪色。

111. 吴先生尾骶部皮肤表现属哪一期褥疮

- A. 淤血红润期
- B. 淤血浸润期
- C. 炎性浸润期
- D. 浅层溃疡期
- E. 深层溃疡期

112. 给予的护理措施哪项不妥

- A. 每 2h 翻身 1 次
- B. 保持衣裤及床铺干燥
- C. 尿湿后用温水擦净皮肤
- D. 每天按摩尾骶部 2 次
- E. 床上铺气垫褥

113. 为预防病人发生其他并发症，你应着重指导家属学会的护理技术是

- A. 鼻饲灌食
- B. 皮下注射
- C. 测量血压
- D. 被动活动
- E. 更换敷料

(114~117 题)

患者女性，18 岁。主因昨晚 9 时突发双眼上吊，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约 30 秒，患者仍神志不清，间隔 20 分钟后，再次出现此症状，持续约 10 秒，有小便失禁，约 30 小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。

114. 患者最恰当的诊断是



- A. 失神发作
- B. 肌阵挛发作
- C. 癫痫持续发作
- D. 强直发作
- E. 阵挛性发作

115. 癫痫发作时的治疗措施正确的是

- A. 当患者正处于意识丧失和全身抽搐时，原则上是预防外伤及其他并发症
- B. 立即把患者抱到床上，平卧，保持呼吸道通畅，及时吸氧
- C. 必要时可用约束带约束四肢防自伤
- D. 立即口服抗癫痫药
- E. 及时为患者进行心电监护

116. 控制癫痫持续状态首选药物是

- A. 地西洋
- B. 丙戊酸钠
- C. 氯丙嗪
- D. 卡马西平
- E. 苯妥英钠

117. 本病最具特征性的检查是

- A. CT
- B. 脑电图
- C. 核磁
- D. 生化检查
- E. 抽脑脊液

118~120 题

患者，男性，56岁，乙型肝炎15年，最近出现食欲不振、出现肝掌和少量腹水。

118. 该患者最有可能的诊断是

- A. 慢性胃体炎
- B. 肝癌
- C. 慢性胃炎
- D. 肝硬化
- E. 胃溃疡

119. 该患者每日进水量宜限制在

- A. 1000ml
- B. 1500ml
- C. 300ml
- D. 500ml
- E. 800ml

120. 该患者肝硬化导致门脉高压的表现有

- A. 腹水
- B. 上腹饱胀
- C. 蜘蛛痣
- D. 大隐静脉曲张
- E. 颈静脉怒张