

2017 年护士执业资格 考试模拟题

《实践能力》

2017 年护士执业资格考试模拟题（实践能力）

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 大肠癌最常见的转移途径为

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴转移
- C. 动脉转移
- D. 静脉转移
- E. 种植转移

2. 胃肠减压期间的护理，下列哪项是错误的

- A. 病人应禁食及停口服药物
- B. 随时观察吸引是否有效
- C. 注意口腔护理
- D. 及时更换收集瓶
- E. 若发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续吸引

3. 昏迷病人呕吐时将头偏向一侧是为了防止

- A. 呕吐加剧
- B. 昏迷加重
- C. 血压下降
- D. 窒息
- E. 污染衣物

4. 临床上最常见的急性胃炎是

- A. 急性浅表性胃炎
- B. 幽门螺杆菌引起的急性胃炎
- C. 急性化脓性胃炎

D. 幽门螺杆菌以外的病原体引起的急性胃炎

E. 急性糜烂出血性胃炎

5. 以呼气性呼吸困难为主要表现的是

A. 急性喉炎

B. 肺炎

C. 慢性支气管炎

D. 支气管哮喘和肺气肿

E. 胸腔积液

6. 支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的并发症是

A. 严重贫血

B. 休克

C. 窒息

D. 继发感染

E. 发热

7. 鼓励急性心肌梗死病人，自第2周开始在床上做四肢轻微活动是为了

A. 预防褥疮

B. 增加消化功能

C. 避免肌肉萎缩

D. 防止血栓形成

E. 促进心功能恢复

8. 心绞痛胸痛特点不包括

A. 疼痛位于胸骨后

B. 一般持续数分钟

C. 常有明显诱因

D. 呈针刺样疼痛

E. 休息后可缓解

9. 缺血性脑血管疾病的主要治疗措施是

A. 血管扩张剂

B. 利尿剂

C. 脱水剂

D. 抗凝治疗

E. 镇静剂

10. 脑出血以内囊出血最常见，其特征性的临床表现为

A. 同侧偏瘫

B. 对侧偏瘫

C. 同侧偏盲

D. 三偏症

E. 交叉性偏瘫

11. 末次月经第一日是 2016 年 10 月 26 日，计算预产期应是

A. 2017 年 8 月 1 日

B. 2017 年 8 月 2 日

C. 2017 年 8 月 3 日

D. 2017 年 8 月 5 日

E. 2017 年 8 月 8 日

12. 停经 8 周，下列哪项检查最准确

A. 超声多普勒仪测到胎心波动

B. 子宫增大

C. 早孕反应加重

D. 乳房增大，乳头、乳晕着色

E. 量腹围

13. 新生儿生理性黄疸的主要原因是

A. 皮肤发亮，水肿毳毛多

B. 皮肤色红润，皮下脂肪丰满，毳毛少

C. 肝葡萄糖醛酸基转移酶活性低

D. 呼吸常不规则，甚至呼吸暂停

E. 男女足月新生儿生后 3~5 天出现乳腺肿大

14. 早产儿指

A. 胎龄 > 20 周至 37 足周的新生儿

B. 胎龄 ≥ 28 周至 < 37 足周的新生儿

C. 胎龄 > 28 周至第 37 周的新生儿

D. 胎龄 > 20 周至第 37 周的新生儿

E. 胎龄 > 30 周至 < 37 足周的新生儿

15. 应激引起急性胃炎的主要表现是

A. 上腹饱胀

B. 上腹隐痛

C. 恶心、呕吐

D. 上消化道出血

E. 食欲减退

16. 慢性胃炎的主要致病因素为

A. 消炎药物

B. 饮酒

C. 吸烟

D. 幽门螺杆菌

E. 胆汁反流

17. 慢性阻塞性肺气肿最常继发于

A. 支气管哮喘

B. 慢性纤维空洞型肺结核

C. 慢性支气管炎

D. 原发性支气管肺癌

E. 肺源性心脏病

18. 哪种心律失常属于紧急情况，需要及时处理

A. 窦性心律不齐

B. 室上性心动过速

C. 心房颤动

D. 室性心动过速

E. I 度房室传导阻滞

19. 急性脑血管病患者颅内压增高最急需的措施是

A. 头颅 MRI

B. 腰穿

C. 脑血管造影

D. 静脉注射甘露醇

E. 头颅 CT

20. 新生儿化脓性脑膜炎最常见的致病菌是

A. 葡萄球菌

B. 肺炎双球菌

C. 大肠埃希菌

D. 脑膜炎奈瑟菌

E. 铜绿假单胞菌

21. 小儿惊厥最常见的类型是

A. 颅内占位性病变所致惊厥

B. 脑膜炎所致惊厥

C. 高热惊厥

D. 颅脑损伤所致惊厥

E. 低血钙所致惊厥

22. 心房颤动患者的脉搏呈

A. 绀脉

B. 间歇脉

C. 洪脉

D. 丝脉

E. 缓脉

23. 心力衰竭病人的饮食，下列哪项不妥

A. 低盐

B. 高热量

C. 富含维生素

D. 适量纤维素

E. 少量，多餐

24. 急性心肌梗死患者入院第1周，下列哪项护理不当

A. 安抚病人紧张的情绪

B. 不能在床上做肢体活动

C. 可搬入普通病房

D. 协助洗漱，床上排便

E. 可进半流质饮食

25. 护理高血压的患者，下列哪项措施不正确

A. 协助用药尽快将血压降至较低水平

B. 改变体位时动作宜缓慢

C. 淋浴时水温不宜过高

D. 头晕、恶心时协助其平卧并抬高下肢

E. 保持大便通畅

26. 当怀疑患者有心跳呼吸骤停时，为迅速确诊，首先应

A. 测血压

B. 听心音

C. 触颈、股动脉搏动

D. 数呼吸

E. 做心电图

27. 黄先生，冠心病病人，日常活动即心悸，气急，应指导其

A. 绝对卧床休息

B. 活动不受限制

C. 活动照常，增加午休

D. 起床稍事活动，增加间歇休息

E. 限制活动多卧床休息

28. 首次应用下列哪种药物需注意防止病人出现体位性低血压

A. 硝苯地平

B. 氢氯噻嗪

C. 哌唑嗪

D. 阿昔洛尔

E. 卡托普利

29. 正常的胎心率是多少

A. 120 次/分

B. 140~160 次/分

C. 120~160 次/分

D. 120~160 次/分

E. 100~110 次/分

30. 慢性胃炎的主要临床表现是

A. 上腹部疼痛及饱胀不适

B. 恶心、泛酸

C. 呕血、黑便

D. 呕吐、腹泻

E. 乏力、消瘦

31. 某十二指肠溃疡患者，近日餐后感上腹饱胀，频繁呕吐，呕吐物为宿食，并出现脱水症状，患者可能出现的并发症为

A. 出血

B. 穿孔

C. 幽门梗阻

D. 癌变

E. 肠梗阻

32. 某高血压病人，突然剧烈头痛、喷射样呕吐、昏迷，诊断为脑出血。正确的护理措施是

A. 去枕平卧位

B. 补充血容量

C. 发病 24~48h 内避免搬动

D. 8h 后给鼻饲饮食

E. 头部热敷

33. 硬脑膜外血肿的典型表现是

A. 逆行性健忘

B. 中间清醒期

C. 突然呼吸停止

D. 脑脊液漏

E. 伤后癫痫

34. 库欣（Cushing）反应的表现是

A. 血压升高，脉搏慢，呼吸慢

B. 颅内压升高，脉搏慢，心率慢

C. 体温升高，脉搏慢，呼吸慢

D. 血压升高，反应慢，呼吸慢

E. 体温升高，反应慢，呼吸慢

35. 慢性胃炎伴恶性贫血治疗时宜应用的维生素是

A. 维生素 A

B. 维生素 B

C. 维生素 B₁₂

D. 维生素 E

E. 维生素 C

36. 糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为

A. 极度口渴

B. 厌食恶心

C. 呼吸加速

- D. 眼球下陷
- E. 呼气有烂苹果味

37. 挤压面部“危险三角区”未成熟的疖，最严重的后果是

- A. 鼻部感染
- B. 化脓性海绵状静脉窦炎
- C. 面部肿胀
- D. 形成痈
- E. 留疤痕

38. 纠正缺氧气和二氧化碳潴留最重要的措施是

- A. 氧气疗法
- B. 保持气道的通畅
- C. 增加通气量
- D. 纠正酸碱平衡失调
- E. 提高呼吸系统兴奋性

39. 在足月，规律宫缩 10 小时，宫口开大 5cm，先露棘上 2cm，大囟在 11 点，小囟在 5 点，其胎位是

- A. LOA
- B. LOP
- C. ROA
- D. ROP
- E. ROT

40. 伤口或病灶近侧皮肤出现“红线”并有压痛的是

- A. 静脉炎
- B. 动脉炎
- C. 丹毒

- D. 淋巴结炎
- E. 管状淋巴管炎

41. 患者，男性，36岁。昨日在硬膜外麻醉下行疝修补术，今日体温38℃，脉搏88次/分，最可能是

- A. 肺部感染
- B. 泌尿道感染
- C. 伤口感染
- D. 吸收热
- E. 切口感染

42. 患者平卧，患肢抬高70°~80°，持续60秒，若出现麻木疼痛、苍白或蜡黄色，提示

- A. Pratt 试验阳性
- B. Buerger 试验阳性
- C. Trendelenburg 试验阳性
- D. Perthes 试验阳性
- E. 腰交感神经阻滞试验阳性

43. 患儿男，11岁，被诊断为1型糖尿病，应用胰岛素治疗，近日出现清晨5~9时血糖和尿糖增高，应调整治疗为

- A. 加大早晨胰岛素用量
- B. 减少早晨胰岛素用量
- C. 加大晚间胰岛素用量
- D. 减少晚间胰岛素用量
- E. 加大运动量

44. 男，55岁，20年前曾患肺结核，近4个月来出现刺激性咳嗽，痰中带血丝，伴左胸痛，发热，X线片示右上肺4cm×2.5cm大小的阴影，边缘模糊，周围毛刺，痰液找癌细胞3次均为阴性。应考虑诊断为

- A. 肺结核
- B. 肺囊肿
- C. 非良性肿瘤
- D. 肺脓肿
- E. 肺癌

45. 某女，63岁，退休工程师，心前区压榨样疼痛3h，伴冷汗、恐惧来院急诊，该患者首先需做哪项检查

- A. 心电图检查
- B. B超
- C. X线胸
- D. 冠状动脉造影
- E. CT

46. 患者男，30岁。5天前因急性坏死型胰腺炎急诊入院。查体：上腹部压痛明显，无反跳痛和腹肌紧张，肠鸣音减弱；T38.8℃。目前，对该患者处理最为重要的是

- A. 给予阿托品抑制胃酸分泌
- B. 给予吗啡解痉镇痛
- C. 早期行TPN营养支持
- D. 根据细菌培养结果选用敏感抗生素
- E. 持续胃肠减压

47. 患者男，68岁，因颈部蜂窝织炎入院，医嘱予气管切开，操作前，护士应向其解释该措施的目的是预防

- A. 窒息
- B. 肺不张
- C. 全身感染
- D. 吞咽困难

E. 化脓性海绵状静脉窦炎

48. 患者男性，65岁，诊断为胃癌，行胃大部切除术后，护士嘱患者取半坐卧位的目的是

- A. 减轻局部出血
- B. 减轻肺部淤血
- C. 防止腹膜粘连
- D. 减轻伤口缝合处张力
- E. 使静脉回流血量减少

49. 患者女性，26岁，产后4周出现体温升高、右侧乳房疼痛、局部红肿、有波动感，最主要的处理措施是

- A. 托起患侧乳房
- B. 33%硫酸镁湿敷
- C. 局部物理疗法
- D. 及时切开引流
- E. 全身应用抗生素

50. 患者，女，45岁，5个月前有上消化道出血，肝硬化病史7年。体检：肝肋下1横指，质硬，脾肋下3横指，血常规检查白细胞、血小板值均低于正常值，内镜检查为食管静脉曲张。下列护理措施中不妥的是

- A. 进食温度较低的食物
- B. 嘱咐病人避免用力排便和剧烈咳嗽
- C. 嘱咐病人禁止进食粗糙、刺激性较强的食物
- D. 术前常规插胃管
- E. 口服片剂药物应该研碎再冲服

51. 患者女，55岁。右上腹痛感1天，体温39℃，皮肤巩膜黄染，B超示胆总管结石，为警惕发生重症胆管炎，应注意观察

- A. 体温
- B. 腹部体征
- C. 恶心、呕吐
- D. 血压、神志
- E. 白细胞计数

52. 高血压病患者睡眠时突感极度胸闷，气急，大汗淋漓，咳大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，血压 22.6/14.7kPa (200/110mmHg)，心率 110 次/min。下列哪项护理是错误的

- A. 安慰患者，稳定情绪
- B. 患者置于两腿下垂坐位
- C. 酒精湿化吸氧 4~6L/min
- D. 建立静脉通道
- E. 静脉滴注给药宜快速

53. 患者，男，53 岁，急性心肌梗死患者发病 8h 后，要求到厕所大便，你应该

- A. 嘱家人陪往
- B. 肛塞开塞露后，再允许前往
- C. 先给予缓泻剂，再允许前往
- D. 如无便秘史，应允许前往
- E. 坚持制止，指导床上使用便盆

54. 护士巡视时发现一冠心病病人突然出现抽搐、意识丧失。颈动脉触诊无搏动，此时首要的急救措施是

- A. 心内注射肾上腺素
- B. 吸氧
- C. 心前区叩击
- D. 胸外心脏按压
- E. 口对口人工呼吸

55. 患者男性，50岁，高血压18年，上班中出现头晕、头痛，血压180/100mmHg，同事将其送往医院治疗，不久症状好转，诊断短暂性脑缺血发作，这种发作最常见的病因是

- A. 情绪激动
- B. 高血压
- C. 吸烟
- D. 饮酒
- E. 动脉粥样硬化

56. 患者，女，34岁，消化性溃疡3年史，胃痛反复发作，平时未按要求服药，现护士给患者进行用药护理的错误指导是

- A. 碱性抗酸剂宜在餐后1小时服用
- B. 硫糖铝宜在餐前1小时服用
- C. 胃黏膜保护剂宜在餐后服用
- D. 枸橼酸铋钾不宜长期服用
- E. H_2 受体拮抗剂宜在餐中或餐后即刻服用

57. 患者，女，63岁，胃穿孔修补术后，为预防发生粘连性肠梗阻，应指导患者

- A. 早期取半卧位
- B. 早期离床活动
- C. 早期进食
- D. 保持排便通畅
- E. 多饮水

58. 患者，男，54岁，胆囊结石，明天即将做胆囊切除术，护士应首选下列哪个主题与患者交谈

- A. 吸烟的危害
- B. 规律饮食的重要性

- C. 鼓励患者战胜疾病
- D. 术前健康指导
- E. 止痛的方法

59. 某患者，男，35岁，因上消化道大出血伴休克紧急入院抢救，护士采取的措施中不妥的是

- A. 头低足高位
- B. 暂禁食
- C. 建立静脉通路
- D. 迅速交叉配血
- E. 氧气吸入

60. 患者，男性，65岁，原发性高血压病人，吸烟史20年，肥胖，目前血压21.3/12.7kPa(160/95mmHg)，下列健康教育内容哪项错误

- A. 保持情绪稳定
- B. 尽量运动
- C. 高热量、高糖饮食
- D. 戒烟
- E. 控制高血压

61. 小儿，3岁，中毒性细菌性痢疾全身症状重，肠道反应轻，诊断困难，确诊该病最直接的证据为

- A. 黏液脓血便
- B. 有相关接触史
- C. 血常规检查白细胞升高
- D. 大便标本培养出痢疾杆菌
- E. 大便镜检可见大量脓细胞

62. 患者男性，37岁，发热、咳嗽，伴间断腹泻、食欲减退及明显消瘦就诊，既往有静脉吸毒史。查血清抗-HIV(+)。诊断为艾滋病进行治疗，能反应此病预后和疗效的检查项目是

- A. CD4+ / CD8+比值
- B. 血清抗-HIV检测
- C. 骨髓检查
- D. 血培养
- E. 淋巴结活检

63. 王某，女，27岁，因化脓性扁桃体炎需注射青霉素，皮试阴性。肌内注射青霉素后5min，病人出现胸闷、气急、面色苍白、脉搏细弱、血压下降。首先应该给予的急救措施是

- A. 报告医生
- B. 氧气吸入
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 注射抗组胺药物
- E. 建立静脉通道

64. 患者，男性，42岁，因近3周食欲减退、上腹不适、疲乏无力，就诊，体检：肝肋下2cm，有轻度触痛。为明确诊断首先应检查的项目是

- A. 尿胆红素
- B. 血清胆红素
- C. 血清蛋白
- D. 血清丙氨酸氨基转移酶
- E. 谷氨酰基转移酶

65. 刘某，女，52岁，慢性支气管炎，肺气肿，痰液粘稠，不易咳出，用超声雾化吸入，下述错误的是

- A. 药物用 α -蛋白酶
- B. 稀释药物至50mL，放入雾化罐内

- C. 水槽内放热水 250mL
- D. 使用时先开电源开关，再开雾化开关
- E. 治疗时间 15~30min

66. 病人，张某，在输液过程中突然感到胸部异常不适，随后出现呼吸困难，严重发绀。其最大可能及首要处理是

- A. 肺水肿，停止输液
- B. 空气栓塞，立即左侧卧位
- C. 过敏，皮下注射地塞米松
- D. 心脏病发作，立即遵医嘱用强心剂
- E. 低血容量性休克，立即补充血容量

67. 孕妇，王某，妊娠 36 周，因阴道持续性流液 1h 来院求诊。肛查时羊水不断从阴道流出，诊断为胎膜早破，应给其安置

- A. 平卧位
- B. 头低足高位
- C. 头高足低位
- D. 截石位
- E. 膝胸卧位

68. 某患者因慢性肾衰竭接受了肾移植手术，术后恢复良好，心怀感激，多次向责任护士打听捐肾者家庭住址，想登门致谢，面对患者的请求，责任护士正确的做法是

- A. 建议电话致谢
- B. 婉拒患者的请求
- C. 建议给予经济补偿
- D. 宣传捐献者事迹
- E. 与患者一道登门致谢

69. 顾先生, 55 岁, 患高血压病 12 年, 一直间断服降压药, 血压时高时低, 多在 160/100mmHg, 3h 前出现心前区持续疼痛, 出冷汗来就诊, 诊断为急性心肌梗死入监护室观察, 半小时后病人出现呼吸困难, 两肺布满湿罗音, 心率 110 次/min, 律整, 首先考虑病人病情变化是

- A. 急性左心衰
- B. 肺部感染
- C. 再次心肌梗死
- D. 严重心肌缺血缺氧
- E. 肺栓塞

70. 兰先生, 40 岁。上腹胀痛、食欲减退 3 月余。纤维胃镜检查胃窦部黏膜呈红白相间、以红为主、黏液较多, 活检可见黏膜浅层炎症细胞浸润。诊断应考虑为

- A. 慢性浅表性胃炎
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 早期胃癌
- D. 急性糜烂出血性胃炎
- E. 急性单纯性胃炎

71. 患者, 男, 75 岁, 诊断为肝性脑病入院。患者目前处于昏迷状态, 下列护理措施错误的是

- A. 给予舒适体位
- B. 使用床档防止坠床
- C. 口腔护理预防口腔感染
- D. 长期留置导尿管, 以防尿液浸湿皮肤
- E. 定时翻身防止压疮

72. 刘先生, 58 岁, 初步诊断为“糖尿病”, 需作尿糖定量检查, 为保持尿液的化学成分不变, 尿标本中需加入

- A. 浓盐酸

- B. 甲苯
- C. 甲醛
- D. 草酸
- E. 乙醇

73. 小儿，5岁，确诊为缺铁性贫血，下列关于治疗缺铁性贫血，哪项是正确的

- A. 其目的是使血红蛋白恢复正常
- B. 维生素B₁₂可增强疗效
- C. 多饮茶水，以有利于铁吸收
- D. 小剂量开始，血红蛋白正常后再用铁剂3~6个月
- E. 禁用酸性药物

74. 王老先生，72岁，因持续心前区痛4h入院，诊断为急性心肌梗死，监测中发现患者出现心室颤动，此时责任护士应即刻采取的首要措施是

- A. 心内注射利多卡因
- B. 非同步电除颤(电复律)
- C. 高压吸氧
- D. 气管插管
- E. 同步电除颤

75. 肖先生，33岁，风心病二尖瓣狭窄4年，近1个月重体力劳动时出现呼吸困难入院。晚1点患者突然憋醒，端坐位，大汗淋漓，咳粉红色泡沫痰，心率120次/min，两肺满布湿罗音及哮鸣音，责任护士给予患者吸氧的正确方式是

- A. 持续低流量吸氧
- B. 高流量吸氧
- C. 间断给氧
- D. 高流量酒精湿化吸氧
- E. 低流量酒精湿化吸氧

76. 患者男性，52岁，因近2周食欲减退、呕吐、疲乏无力，尿黄。自昨日起烦躁不安，呼吸中有腥臭味、巩膜及皮肤黄染，皮肤可见瘀斑，肝未扪及，腹水征阳性。目前最主要的护理问题是

- A. 体液过多
- B. 活的无耐力
- C. 皮肤完整性受损
- D. 营养失调：低于机体需要能量
- E. 潜在并发症：肝性脑病

77. 患儿，男，9岁。确诊为原发性肺结核，护士对其家属实施健康教育，不恰当的是

- A. 定期复查
- B. 避免患儿与其它急性传染病患儿接触
- C. 给予高热量、高蛋白，高维生素饮食
- D. 全程正规服药，出现毒副作用亦不可服用或减量
- E. 对患儿的呼吸道分泌物，餐具，痰杯应消毒处理

78. 李某，35岁，经产妇，昨日经阴道顺产一正常男婴，目前诉说乳房胀痛，下腹阵发性轻微疼痛，查乳房肿胀，无红肿，子宫硬，宫底在腹正中，腋下2指，阴道出血同月经量，对该孕妇下腹疼痛问题，可以告知她（ ）

- A. 是产后宫缩痛
- B. 是不正常的子宫痛
- C. 一般一周后消失
- D. 需要用止痛药
- E. 与使用缩宫素无关

79. 在监护过程中护士发现，秦女士烦躁不安，面色苍白，皮肤湿冷，脉细速，尿量减少，应警惕发生

- A. 严重心律失常
- B. 急性左心衰
- C. 心源性休克
- D. 并发感染
- E. 紧张，恐惧

80. 张某，男，32岁，因患者伤风被安置在隔离室，表现为牙关紧闭，角弓反张，四肢抽搐，可采取的不正确的措施有

- A. 取下假牙，以防窒息
- B. 枕头横立床头，四肢用约束带以防撞伤
- C. 室内光线充足，安静，以利于护理
- D. 用床档，防坠床
- E. 操作时要做到“四轻”

81. 患者，男，55岁，肝硬化晚期处于昏迷状态，骶尾部皮肤呈紫红色，并有小水疱，护士采取的护理措施不正确的是

- A. 每2小时翻身1次
- B. 保持衣裤及床铺干燥
- C. 尿湿后用温水擦净皮肤
- D. 每天按摩骶尾部2次
- E. 避免拉拽病人造成摩擦

82. 新生儿，早产，发生窒息，在进行复苏时最根本的是

- A. 尽量吸净呼吸道粘液
- B. 触觉刺激
- C. 复苏器加压给氧
- D. 胸外按压心脏
- E. 喉镜下经口气管插管

83. 患者，女，45岁，被诊断为再生障碍性贫血，患者出现高热39℃，给予患者最适宜的降温措施是

- A. 肌内注射退热药
- B. 口服退热药
- C. 酒精擦浴
- D. 静脉输液
- E. 冰袋置头部及大血管处，或温水擦浴

84. 夜班巡视病房，发现一左心衰竭病人的心衰尚未完全控制，为预防阵发性呼吸困难的发生，最重要的措施是

- A. 保持病房安静、减少声、光刺激
- B. 夜间继续给予氧气吸入
- C. 将其半卧位睡眠
- D. 睡前给予小量镇静剂
- E. 避免精神刺激

85. 患者，男，8个月，体重5.8kg，身高55cm，诊断“营养不良”，其最容易伴发以下哪种维生素缺乏

- A. 维生素A
- B. 维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素E

86. 患者，男，55岁，诊断为前列腺增生，病人出现急性尿潴留，最常见的处理方法是

- A. 针灸
- B. 导尿并保留尿管

- C. 趾骨上膀胱造瘘
- D. 趾骨上膀胱穿刺
- E. 按摩

87. 患者，男，36岁，口腔溃疡一周，采集标本做真菌培养，正确的采集方法是

- A. 采集患者24小时痰液
- B. 用无菌长棉签在口腔溃疡面上取分泌物
- C. 用无菌长棉签擦拭咽部分泌物
- D. 用无菌长棉签擦拭腭弓分泌物
- E. 用无菌长棉签擦拭舌下分泌物

88. 患者，女，69岁，应走路不慎致踝部扭伤，2小时后来院就诊，正确的处理方法是

- A. 热敷
- B. 冷敷
- C. 按摩
- D. 红外线照射
- E. 石膏

89. 患者，女，18岁，半年前被诊断巨大卵巢囊肿，今在学校排练舞蹈旋转时，突感左下腹持续疼痛，且逐渐加剧。局部压痛，拒按。最可能发生卵巢囊肿的哪种并发症

- A. 破裂
- B. 内出血
- C. 感染
- D. 蒂扭转
- E. 以上均不正确

90. 患者，男，29岁，因车祸而致右下肢开放性骨折，大量出血，被送至急诊室，在医生未到之前，当班护士应立即

- A. 询问发生车祸的原因
- B. 向保卫部门报告
- C. 给患者注射镇静剂
- D. 劝患者耐心等待医生
- E. 给患者止血，测血压，建立静脉输液通路

91. 患儿女，6岁，患流行性腮腺炎第三天，一侧腮腺肿大，外周血检查基本正常，护士还应重点关注哪项检查

- A. 血糖和尿糖
- B. 尿常规检查
- C. 肝功能检查
- D. 胸部 X 射线检查
- E. 血及尿淀粉酶检查

92. 患者，女，27岁，因尿频，尿急，尿痛来院急诊，下列哪项尿液检查有助于诊断？

- A. 尿蛋白
- B. 尿比重
- C. 尿镜检细胞数
- D. 尿液酸碱度
- E. 尿常规

二、以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。（93~94 题）

1岁患儿，母乳喂养，未加辅食，约2个月前发现患儿活动少，不哭，不笑，面色蜡黄，表情呆滞，手及下肢颤抖，检查发现肝，脾增大，血红细胞 $1 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 65g/L，血清铁，叶酸正常，血清维生素 B_{12} 降低。

93. 该患儿最可能患的疾病是

- A. 营养性巨幼红细胞性贫血

- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 感染性贫血

94. 下列对该患儿的处理，正确的是（）

- A. 口服铁剂治疗
- B. 添加山楂、鸡内金
- C. 避免服用维生素 C
- D. 用维生素 B₁₂ 治疗
- E. 用维生素 B₁₂ 和叶酸治疗

（95～96 题）

患者，女性，44 岁。因近 3 个月怕热、多汗、情绪激动，且经常腹泻、心悸，而门诊检查。护理体检：甲状腺肿大，两手微抖，眼球稍突，实验室检查：T₃ 6.5mmol/L，T₄ 254mmol/L。诊断为甲状腺功能亢进收入院进一步诊治。

95. 你认为下列哪项不属于护理问题

- A. 情绪激动
- B. 心悸
- C. 腹泻
- D. 怕热多汗
- E. 甲状腺肿大

96. 对上述患者采取的护理措施中，下列哪项不妥

- A. 立即置于光线较暗的抢救室
- B. 物理降温、止吐，做好皮肤护理
- C. 迅速建立静脉通路
- D. 严密观察病情变化，并准确记录
- E. 大量喝开水与浓茶

(97~98 题)

男孩，10 岁，摔倒时左手撑地，即出现左肘部疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱。

97. 最可能的诊断是

- A. 桡骨头半脱位
- B. 桡骨头骨折
- C. 肱骨髁上骨折
- D. 肱骨干骨折
- E. 尺骨鹰嘴骨折

98. 伤后有垂腕表现，可能是

- A. 肌损伤
- B. 正中神经损伤
- C. 桡神经损伤
- D. 尺神经损伤
- E. 缺血性肌挛缩

(99~100 题)

陈女士，69 岁，3h 前胸骨后压榨样疼痛发作，伴呕吐，冷汗及濒死感而入院。护理体检：神清，合作，心率 112 次/min，律齐，交替脉，心电图检查显示有急性广泛性前壁心肌梗死

99. 目前陈女士存在的最主要的护理问题是

- A. 活动无耐力
- B. 心输出量减少
- C. 体液过多
- D. 潜在心律失常
- E. 潜在感染

100. 对陈女士第一周的护理措施正确的是

- A. 高热量，高蛋白饮食
- B. 协助病人翻身，进食
- C. 协助病人入厕
- D. 低流量持续吸氧
- E. 指导病人床上活动

(101~103 题)

女，27岁，停经45天，突感下腹坠痛及肛门坠胀感，少量阴道出血及头晕、呕吐半天。体格检查：面色苍白，BP 80/40mmHg，腹肌略紧张，下腹压痛。妇科检查：阴道少量血性物，宫颈抬举痛(+)，后穹隆饱满，子宫稍大，附件区触诊不满意。

101. 首选检查项目应是

- A. B型超声检查
- B. 后穹隆穿刺
- C. 血常规及出凝血时间
- D. 尿妊娠试验
- E. 诊断性刮宫

102. 本例最可能诊断是

- A. 急性盆腔炎
- B. 先兆流产
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 异位妊娠
- E. 难免流产

103. 本例最恰当的处理是

- A. 中医治疗
- B. 纠正休克
- C. 抗休克同时手术探查

D. 应用抗生素

E. 静脉输液

(104~105 题)

患儿，10 岁，一周前上呼吸道感染，现在患者出现血尿、水肿，血压为 150/89mmHg。

104. 该患儿可能的诊断是

A. 急性肾小球肾炎

B. 肾盂肾炎

C. 肾病综合征

D. 慢性肾炎

E. 肾癌

105. 该患儿的饮食护理，正确的有

A. 高糖饮食

B. 限制水钠摄入直到完全恢复

C. 每日水摄入为 500ML

D. 氮质血症时限制蛋白质的摄入量

E. 急性期每日氯化钠摄入 6g

106. 急性期时患儿应卧床

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 3 天

107. 患儿在医院哭闹，想出去玩耍，马上又面临着期末考试，其母亲非常苦恼，询问护士什么情况下该患儿可以正常上学

- A. 血尿消失
- B. 水肿消退
- C. 血压正常
- D. 血沉正常
- E. 艾迪计数正常

(108~110 题)

男，39 岁。从高处跳下时，双下肢顿时感到无力。

108. 急救运送的方法是

- A. 双人扶着让患者走
- B. 一人背着运送
- C. 一人抱着运送
- D. 一人抬头，一人抬脚运送
- E. 躺在木板床上运送

109. 在急诊室骨科首先做的影像学检查是

- A. MRI
- B. CT
- C. 核素骨扫描
- D. X 线
- E. B 型超声

110. 如果检查显示胸椎压缩性骨折，并有骨块进入椎管，应采取的治疗方法是

- A. 牵引
- B. 仰卧硬板床，背部垫高
- C. 双桌法过伸复位
- D. 早期背伸锻炼
- E. 及早手术解除脊髓压迫

(111~112 题)

患儿男，1 岁。发热，流涕，咳嗽 3 天就诊，体温 39.50℃，查体：耳后发际处可见红色斑疹，疹间皮肤正常，在第一臼齿相应的颊粘膜处可见灰白色点

111. 护士考虑该患儿为麻疹，最重要的体检是

- A. 体温正常
- B. 疹间皮肤正常
- C. 皮疹为红色斑疹
- D. 皮疹从耳后发际处开始出现
- E. 在第一臼齿相应的颊粘膜处可见灰白色点

112. 护士指导家长采取的隔离措施中正确的是

- A. 对患儿宜采取呼吸道隔离至出疹后 3 天
- B. 对患儿宜采取呼吸道隔离至出疹后 5 天
- C. 如有并发症，隔离至出疹后 15 天
- D. 患儿的玩具应清洁后再管起来
- E. 患儿的衣被应暴晒 1 小时

(113~114 题)

初产妇，胎头吸引器加会阴侧切助产分娩足月活婴，胎盘胎膜完整。产后 4 小时阴道出血约 500ml。查：BP 90/60mmHg，脉搏 100 次/分，宫底脐上 3 横指，软，阴道口少量活动性出血，可凝固。

113. 导致出血最可能的原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘残留
- D. 凝血功能障碍
- E. DIC

114. 首选处理措施是

- A. 按摩子宫，给予子宫收缩药物
- B. 导尿
- C. 注射止血剂
- D. 检查软产道
- E. 刮宫

(115~116 题)

40 岁女性患者，因近 1 个月怕热、多汗、情绪激动，且经常腹泻、心悸而门诊检查。体检：甲状腺肿大，两手微抖，眼球稍突。实验室检查： T_3 6.2nmol/L， T_4 254nmol/L。

115. 该患者最可能诊断为

- A. 神经官能症
- B. 地方性甲状腺肿
- C. 甲亢
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 慢性肝炎

116. 你认为下列哪项不属护理诊断

- A. 焦虑
- B. 营养失调
- C. 自我形象紊乱
- D. 缺乏知识
- E. 甲状腺肿大

(117~118 题)

患者男性，66 岁。因头痛、头晕、右半身麻木无力 2 个月，呕吐 2 日入院。体检：神清，血压正常，眼底视盘模糊不清，视乳头水肿。右面部感觉减退，右侧肢体不全瘫，右侧病理反射阳性。头部 CT 检查发现有颅内占位性病变。

117. 应首先考虑的诊断是

- A. 慢性硬脑膜下血肿

- B. 脑出血
- C. 颅内肿瘤
- D. 脑脓肿
- E. 急性硬脑膜下血肿

118. 此时最有效的处理措施是

- A. 持续腰穿引流
- B. 使用脱水药
- C. 开颅病灶切除
- D. 过度换气
- E. 去骨片减压术

(119~120 题)

26 岁初孕妇，现妊娠 40 周，近半月头痛、眼花，今晨出现剧烈头痛并呕吐院就诊。

119. 最有参考价值的病史是

- A. 既往无头痛史
- B. 既往血压正常
- C. 有高血压家族史
- D. 有患病毒性肝炎史
- E. 有多次泌尿系统感染史

120. 为与慢性肾炎鉴别，最有价值的血液检查结果是

- A. 尿素氮值增高
- B. 尿素值增高
- C. 尿酸值增高
- D. 肌酸值增高
- E. 肌酐值增高