

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 临终患者最后出现的心理反应期是

- A. 否认期
- B. 协议期
- C. 忧郁期
- D. 接受期
- E. 愤怒期

答案:D【此题考查知识点】临终患者的心理反应出现顺序为否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期,接受期最后出现。

2. 压疮发生的最主要原因为

- A. 局部组织长期受压
- B. 使用石膏绷带衬垫不当
- C. 疼痛患者
- D. 感觉障碍
- E. 局部皮肤经常受排泄物刺激

答案:A【此题考查知识点】当人坐、卧在某一物体上,人体的重力作用于该物体并产生对该物体的压力,而物体也同时对人体产生大小相等、方向相反的压力,这种压力是引起压疮的最主要原因。压力越大,持续时间越长,发生压疮的几率就越高。

3. 一般血培养标本采血量为

- A. 1~3ml
- B. 5ml
- C. 7~9ml
- D. 10~15ml
- E. 16~18ml

答案:B【此题考查知识点】一般血培养取血 5ml,只有亚急性心内膜炎血培养标本为提高培养阳性率将采血量增至 10~15ml。

4. 采集 12 小时尿标本时,其正确的采集时间是

- A. 早 9:00 至次晨 9:00
- B. 早 7:00 至次晨 7:00
- C. 早 11:00 至次日 9:00
- D. 晚 7:00 至次日早 7:00
- E. 晚 11:00 至次日晚 11:00

答案:D【此题考查知识点】留取 12 小时尿标本,时间为晚上 7 时至次晨 7 时;留取 24 小时尿标本,时间为早晨 7 时至次晨 7 时。

5. 吸氧时流量为 2L/min,其氧浓度为

- A. 29%
- B. 33%
- C. 37%
- D. 41%
- E. 45%

答案:A【此题考查知识点】氧浓度=21+4×氧流量,将其带入。

6. 属于乙类传染病,但是按照甲类传染病进行管理的是

- A. 疟疾

- B. 高致病性禽流感
- C. 血吸虫病
- D. 肺结核
- E. 百日咳

答案:B【此题考查知识点】传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽、人感染高致病性禽流感和甲型 H1N1 流感这四种传染病虽被纳入乙类,但可直接采取甲类传染病的预防、控制措施。

7. 患者女,30岁,下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状,需采血做抗生素敏感试验,最佳的采血时间应该是在患者

- A. 寒战时
- B. 高热时
- C. 发热间歇期
- D. 静脉滴注抗生素时
- E. 抗生素使用后

答案:A【此题考查知识点】采血一般选择病人寒战或发热初期,抗生素使用之前采血,这样可以避免应用抗生素以后出现的假阴性结果,较易发现致病菌。

8. 临床诊断葡萄胎,所采用的最主要的检查是

- A. 血/尿 HCG 测定
- B. 腹部 CT 检查
- C. 胸部 X 线检查
- D. 多普勒胎心听诊检查
- E. B 超检查

答案:E【此题考查知识点】超声检查是诊断葡萄胎的重要辅助检查方法,采用经阴道彩色多普勒超声效果更好。

9. 肾癌患者血尿的特点是

- A. 间歇无痛肉眼血尿
- B. 终末血尿
- C. 初始血尿伴膀胱出血
- D. 剧烈疼痛伴镜下血尿
- E. 血红蛋白尿

答案:A【此题考查知识点】肾癌患者的血尿特点为间歇无痛性肉眼血尿。

10. 常规治疗焦虑症的药物不包括

- A. 地西洋
- B. 氯硝西洋
- C. 阿普唑仑
- D. 劳拉西
- E. 奋乃静

答案:E【此题考查知识点】考点焦虑症常用苯二氮革类药物。ABCD 都是,故选 E。

11. 下列对烧伤面积的描述,错误的是

- A. 双前臂为 6%
- B. 头、面、颈部各为 3%
- C. 双上臂为 6%
- D. 躯干为 27%
- E. 双臀为 5%

答案:C【此题考查知识点】新九分法评估成人烧伤面积:成人头颈部体表面积为 9% (头、

面、颈部各为 3%); 双上肢为 18% (双前臂为 6%, 双手为 5%, 双上臂为 7%); 躯干 (含会阴 1%) 为 27% (3 个九, 胸腹前侧 13%, 背部 13%); 双下肢 (含臀部) 为 46% (其中双臀为 5%); 共为  $11 \times 9\% + 1\% = 100\%$ 。

12. 患者, 陆某, 女, 32 岁, 右侧胸部外伤, 肋骨骨折, 患者发绀, 极度呼吸困难, 右胸壁反常呼吸, 首要的急救措施是

- A. 气管切开
- B. 加压给氧
- C. 气管插管
- D. 剖胸探查
- E. 固定胸壁

答案: E 【此题考查知识点】患者因外伤致呼吸困难, 发绀, 右胸壁可见反常呼吸运动, 此时应固定胸壁, 抑制反常呼吸。

13. 最易发生腰椎间盘突出的是

- A. 腰 4~5
- B. 胸 12~腰 1
- C. 腰 1~2
- D. 腰 2~3
- E. 腰 3~4

答案: A 【此题考查知识点】腰椎间盘突出最易发生于腰 4~5。

14. 胰头癌最主要的临床表现

- A. 恶心、呕吐
- B. 进行性黄疸
- C. 腹胀
- D. 低血糖
- E. 乏力, 消瘦

答案: B 【此题考查知识点】黄疸因胆总管受浸润或压迫引起, 一般呈进行性加重。

15. 膀胱癌患者行回肠膀胱术, 术后拔除输尿管、引流管和回肠膀胱引流管, 改为佩戴皮肤造口袋的时间为

- A. 术后 5~6 天
- B. 术后 7~9 天
- C. 术后 10~12 天
- D. 术后 11~13 天
- E. 术后 15~21 天

答案: C 【此题考查知识点】回肠膀胱术后 10~12 天拔除输尿管引流管和回肠膀胱引流管, 改为佩戴皮肤造口袋; 可控膀胱术后 8~10 天拔除肾盂输尿管引流管, 12~14 天拔除贮尿囊引流管, 2~3 周拔除输出道引流管, 训练自行排尿。

16. 二尖瓣的解剖位置

- A. 左心房与左心室之间
- B. 右心房与右心室之间
- C. 右心室与肺动脉之间
- D. 左心房与主动脉之间
- E. 左心房与肺静脉之间

答案: A 【此题考查知识点】心脏瓣膜的解剖结构, 左心房与左心室之间是二尖瓣, 右心房与右心室之间是三尖瓣, 右心室与肺动脉之间是肺动脉瓣, 左心室与主动脉之间主动脉瓣。

17. 护士为昏迷患者进行口腔护理时需两次核对的用具是

- A. 手电筒
- B. 血管钳
- C. 开口器
- D. 棉球
- E. 吸水管

答案:D【此题考查知识点】操作前与操作后需清点棉球个数,避免残留于口腔,造成其他影响。

18. 应在4个月的婴儿饮食中添加下列哪种物质

- A. 肉末
- B. 蛋黄
- C. 茄子
- D. 碎面条
- E. 牛奶

答案:B【此题考查知识点】婴幼儿的饮食护理。4~6个月的婴幼儿应添加一些泥状食物,如土豆泥、蛋黄、豆腐等。

19. 小儿病毒性脑膜炎、脑炎最常见的病原体为

- A. 肠道病毒
- B. 腮腺病毒
- C. SAS 炎病毒
- D. 衣原体
- E. 支原体

答案:A【此题考查知识点】小儿病毒性脑膜炎、脑炎最常见的致病菌。

20. 小儿前囟最晚闭合的时间是

- A. 4~6周
- B. 6~8周
- C. 3~4个月
- D. 4~6个月
- E. 1~1.5岁

答案:E【此题考查知识点】前囟闭合的时间是1~1.5岁;后囟最迟6~8周闭合。

21. 右心衰竭的特征性体征是

- 水肿
- 肝大和压痛
- C. 肝颈静脉回流征阳性
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 肺部闻及湿啰音

答案:C【此题考查知识点】右心衰的临床表现:颈静脉怒张,肝大、压痛,肝颈静脉回流征阳性,下肢水肿等,其中肝颈静脉回流征阳性是最有诊断意义的体征。

22. 最能够反应小儿营养情况的重要指标为

- A. 体重
- B. 身高
- C. 上臂围
- D. 囟门关闭情况
- E. 营养状况

答案:A【此题考查知识点】评价小儿营养情况的重要指标是体重。

23. 护理管理中的“PDCA”循环法中的“A”代表的是

- A. 管理
- B. 计划
- C. 实施
- D. 检查
- E. 处理

答案:E【此题考查知识点】PDCA循环是护理管理的基本方法,对护理质量和安全持续改进。P:计划,是第一阶段;D:执行,是第二阶段;C:检查,是第三阶段;A:处理,为第四阶段,巩固成绩。将遗留问题和新发现问题转入下一循环中去解决。

24. 某地医院拒绝为该院的护理人员提供定期健康检查,侵犯了护理人员的

- A. 获得报酬的权利
- B. 培训的权利
- C. 人身安全不受侵犯的权利
- D. 安全执业的权利
- E. 履行职责相关的权利

答案:D【此题考查知识点】护理工作者享有安全执业的权利。医护其实是高危职业,护士执业,有获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务的权利。

25. 护患进行沟通的基本原则为

- A. 尊重性
- B. 保密性
- C. 规范性
- D. 艺术性
- E. 治疗性

答案:A【此题考查知识点】常识类考题。护患沟通的首要原则为尊重性。

26. 在护理阿尔茨海默症患者时,正确的做法是

- A. 多帮助患者生活,避免出错
- B. 让患者减少用脑,防止继续加重病情
- C. 多帮助患者回忆刚发生的事情,帮助其锻炼记忆力
- D. 患者回忆出现错误并坚持己见时,要顺着患者的意思,不能强迫患者正确认知。
- E. 减少休息,多加强运动

答案:D【此题考查知识点】阿尔茨海默症患者的护理措施。应尽量鼓励患者自己照料自己,维持自理能力。多回忆过去的事情,培养记忆力。多锻炼用脑,多休息。

27. 病毒性脑膜炎患儿的脑脊液检查结果中可出现

- A. 外观乳糜色
- B. 压力大幅度升高
- C. 白细胞数减少
- D. 蛋白质减少
- E. 糖和氯化物正常,偶可降低

答案:E【此题考查知识点】病毒性脑膜炎实验室检查。外观无色透明、压力正常或者稍高、白细胞轻至中度增高、糖正常,氯化物偶可降低。

28. 以下关于Cushing综合征的临床表现,不正确的是

- A. 低血糖
- B. 紫纹

- C. 高血压
- D. 多血质面容
- E. 向心性肥胖

答案:A【此题考查知识点】库欣综合征典型临床表现包括:①向心性肥胖,满月脸,多血质。②皮肤变薄,有紫红色条纹。③代谢障碍,由于大量皮质醇促进糖原异生,减少外周组织对葡萄糖的利用,拮抗胰岛素,使血糖升高。同时,大量皮质醇有潴钠排钾的作用,会出现低血钾,导致碱中毒。④肾素~血管紧张素系统被激活,血压升高。凝血功能也会出现异常,导致静脉栓塞。⑤对感染的抵抗力下降。⑥抑制垂体释放促性腺激素,导致性功能障碍。⑦常有不同程度的精神、情绪变化,如情绪不稳定、烦躁、失眠、严重者精神变态,个别可发生偏执狂。

29. 护士患血源性传染病的原因最常见的是

- A. 接触被污染的衣物
- B. 针刺伤
- C. 侵袭性操作
- D. 接触被污染体液
- E. 为污染伤口换药

答案:B【此题考查知识点】略。

30. 护士在给艾滋病患者进行吸痰时,做法错误的是

- A. 用过的吸痰管及纱布装入高危品袋中焚烧
- B. 吸痰前洗手,戴好口罩、护目镜
- C. 吸痰前穿好隔离衣
- D. 不与其他患者共用中心吸引系统
- E. 吸痰后吸痰管误落地上,立即进行地面的清洁处理

答案:E【此题考查知识点】为艾滋病患者吸痰时,若吸痰管误落地上,应立即进行地面的清洁并且消毒处理。

31. 类风湿关节炎患者关节病变的典型特点是

- A. 关节摩擦音
- B. 关节肿胀
- C. 关节疼痛
- D. 关节晨僵
- E. 关节呈对称性改变

答案:E【此题考查知识点】类风湿关节炎受累关节的症状表现对称性、持续性关节肿胀和疼痛,常伴有晨僵。受累关节以近端指间关节、掌指关节、腕、肘和足趾关节最为多见。

32. 患者李某,男,60岁,患有肺心病3年,近2日加重,护士为其吸氧操作错误的是

- A. 插管前检查鼻腔情况
- B. 插管前检查导管是否通畅
- C. 先调节好流量再插管
- D. 用氧期间做好“四防”
- E. 停用氧气时先关流量开关

答案:E【此题考查知识点】操作不当,引起组织损伤。

33. 患者,男,29岁,初步诊断为阿米巴痢疾收入院,医嘱:留取粪便做阿米巴原虫检查。

护士应为患者准备的标本容器是

- A. 无菌容器
- B. 清洁容器

- C. 干燥容器
- D. 装有培养基的容器
- E. 加温的清洁容器

答案:E【此题考查知识点】留取粪便做阿米巴原虫检查,应将清洁的便器加温至接近人的体温,保持阿米巴原虫的活动状态,防止其死亡。

34. 患者,男,65岁,以肺结核入院,近日感觉胸闷,呼吸困难,护士遵医嘱为患者吸痰,操作中做法错误的是

- A. 吸痰前做好解释取得患者的配合
- B. 吸痰前护士应洗手,戴口罩,穿好隔离衣
- C. 吸痰时动作要轻柔,左右旋转,上下提拉
- D. 吸痰用物应专人专用,不得交叉使用
- E. 使用过的一次用物先消毒再分类处理

答案:E【此题考查知识点】肺结核为传染病,该患者用过的用物毫无保留价值应集中焚烧。D选项中应向上提拉,相对而言,E选项为最佳答案。

35. 某患者,女,35岁,被拟诊为亚急性心内膜炎,为了确诊,血培养标本采血量应为

- A. 1~3ml
- B. 4~6ml
- C. 7~9ml
- D. 10~15ml
- E. 16~20ml

答案:D【此题考查知识点】亚急性感染性心内膜炎进行血培养的标本采集是考试的重点,一般是在抗生素在使用前采血,若使用了抗生素,需要在停药2~7天后采血,标本量需要10~15ml。

36. 患者,女,55岁,准备行结肠癌手术,护士遵医嘱在术前行清洁灌肠。在操作过程中,患者感到腹胀或有便意,此时护士应采取的措施是

- A. 快速灌肠
- B. 多多跟患者交流
- C. 告知患者是正常感觉,嘱其张口深慢呼吸
- D. 旋转移动肛管或捏肛管
- E. 立即停止观察并与医生联系

答案:C【此题考查知识点】若液体流入受阻,可前后旋转移动肛管或挤捏肛管;如患者感到腹胀或有便意,可告知患者是正常感觉,嘱患者张口深慢呼吸,放松腹肌并适当降低灌肠筒的高度,减慢流速或夹管。如患者出现面色苍白、出冷汗、剧烈腹痛、心慌气急、脉速,应立即停止灌肠。

37. 患者,女,38岁,面颊紫红、口唇发绀,曾感染过风湿热,确诊二尖瓣狭窄最可靠的辅助检查是

- A. 心电图
- B. CT
- C. 胸部X线片
- D. 超声心动图
- E. 心导管检查

答案:D【此题考查知识点】心脏瓣膜病在临床上最主要的辅助检查是超声心动图,可以通过影像,检查瓣膜的狭窄或关闭不全等器质性病变。

38. 患者,女,35岁,因盆腔炎疼痛需每日红外线照射一次,在照射过程中护士发现皮肤出

现桃红色，此时正确的做法是

- A. 立即停止照射并给予冷敷
- B. 改用小功率灯，继续照射
- C. 让患者休息片刻后继续照射
- D. 立即停止照射，涂抹凡士林保护皮肤
- E. 无需处理属于正常现象

答案:E【此题考查知识点】红外线照射时皮肤出现桃红色为合适量，若出现紫红色则应立即停止照射，并涂抹凡士林保护皮肤。

39. 患者，男，35岁，患肺结核3年。现使用链霉素抗结核治疗期间应注意监测

- A. 胃肠功能
- B. 肝功能
- C. 心功能
- D. 肾功能
- E. 肺功能

答案:D【此题考查知识点】链霉素有肾损害，用药期间应注意监测肾功能。

40. 患者女，51岁。现已绝经4年，近日出现阴道不规则流血入院检查。医生诊断为子宫内膜腺癌。最佳治疗方法是

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 放化疗结合
- E. 中药放疗

答案:C【此题考查知识点】手术治疗是子宫内膜癌病人首选的治疗方法。通过手术切除病灶，同时进行手术病理分期。

41. 某患者，女，27岁，近一月来，白带增多，入院检查。妇产检查：外阴阴道正常，宫颈出现糜烂，且糜烂面积占宫颈面积的50%，该患者宫颈糜烂的程度是

- A. 特重度
- B. 极重度
- C. 重度
- D. 中度
- E. 轻度

答案:D【此题考查知识点】宫颈糜烂根据糜烂面积大小分3度。轻度：糜烂面积小于整个宫颈面积的1/3。中度：糜烂面积占整个宫颈面积的1/3~2/3。重度：糜烂面积占整个宫颈面积的2/3以上。

42. 某患者，女性，28岁，近日来，总在活动后突发腰部剧痛难忍，辗转不安，大汗，伴有恶心呕吐，一般持续时间为10分钟，间歇期无任何症状，症痛放射至下腹及会阴部，可有血尿。患者发生疼痛，最可能的原因是

- A. 膀胱癌
- B. 肾病综合征
- C. 肾癌
- D. 肾和输尿管结石
- E. 膀胱结石

答案:D【此题考查知识点】肾和输尿管结石的主要表现为与活动有关的肾区疼痛与血尿，肾结石可引起肾区疼痛伴肋脊角叩痛。当结石在肾盂输尿管处嵌顿时，可出现肾绞痛，绞痛突



然发生，并向肩部、输尿管、下腹部及会阴部放射。膀胱结石的典型症状为排尿突然中断。肾癌三联症为血尿、腰痛、肿块。膀胱癌症状为血尿和膀胱刺激征。

43. 某患者，男性，42岁，诊断为慢性肾炎，需长期服用糖皮质激素。下列不属于糖皮质激素的不良反是

- A. 血糖升高
- B. 高血压
- C. 出血性膀胱炎
- D. 感染
- E. 肥胖

答案:C【此题考查知识点】糖皮质激素的不良反有感染、糖尿病、高血压、继发感染、肥胖等。出血性膀胱炎是环磷酰胺的不良反。

44. 患者男，65岁。心绞痛入院。给予患者静脉输液，称输液管是条蛇，其症状是

- A. 幻觉
- B. 错觉
- C. 意识障碍
- D. 谵妄
- E. 愤怒

答案:B【此题考查知识点】错觉的定义。错觉就是人们观察物体时，由于物体受到形、光、色的干扰，加上人们的生理、心理原因而误认物象，会产生与实际不符的判断性的视觉误差。

45. 某护士主诉因“怕脏反复洗手，双手变得粗糙皴裂，明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗
- E. 精神分析治疗

答案:A【此题考查知识点】强迫症的治疗。第一步诊断——强迫症，第二步决定最佳治疗方案：药物治疗+心理治疗。

46. 患者，冯某，女，35岁，肋骨骨折合并气胸，急诊行胸腔闭式引流术，下列护理错误的是

- A. 更换引流瓶时应双重夹闭引流管
- B. 嘱患者勿折叠、扭曲、压迫管道
- C. 嘱患者翻身时勿牵拉引流管
- D. 保持水封瓶长管没入水中6~8cm
- E. 指导患者多做深呼吸运动

答案:D【此题考查知识点】水封瓶长管没入水中1~2cm，并保持直立。(人民卫生出版社内科护理学第5版教材为：水封瓶长管没入水中1~2cm，护资为3~4cm，我们华图参考的为教材。)

47. 患者，男，40岁，双手深II度烧伤恢复期。其双手平时正确的放置位置是

- A. 双手互握
- B. 握拳位
- C. 半握拳位
- D. 伸直位
- E. 半伸直位

答案:C【此题考查知识点】双手深Ⅱ度烧伤愈合会留下瘢痕,烧伤区皮肤会皱缩、变形,影响功能。因此,康复期双手应处于功能位即半握拳位。

48. 患者,郭某,女,41岁,腓骨骨折行内固定2周后要求回家休养,对于该患者的出院宣教,错误的是

- A. 主动和被动活动相结合
- B. 锻炼需要有人陪同
- C. 活动范围应有小到大
- D. 活动强度由弱到强
- E. 活动量应固定,始终一致

答案:E【此题考查知识点】腓骨骨折后1~2周开始进行功能锻炼,锻炼需要有人陪同,以防跌倒;主动和被动活动相结合;活动范围由小到大,幅度和力量逐渐增大。

49. 患者女,35岁。近1个月来上腹不适、疼痛、反酸、暖气等症状并逐渐加重,经诊断为胃癌,行胃癌根治术后,下列情况下可进食的是

- A. 患者思食
- B. 腹痛消失
- C. 体温在37.5℃
- D. 肛门排气后
- E. 恶心、呕吐消失后

答案:D【此题考查知识点】胃癌根治术后早期需禁食、胃肠减压,待肛门排气、肠蠕动恢复,拔除胃管后当日可饮少量水或米汤,第2日进半量流质饮食,第3日进全量流质,若进食后无腹痛、腹胀等不适,第4日可进半流质饮食,第10~14日可进软食。因此应选D。

50. 患者男性,40岁。胃大部切除术后4天,体温38.5℃,切口疼痛,应考虑

- A. 外科热
- B. 切口感染
- C. 腹腔感染
- D. 肺部感染
- E. 膈下脓肿

答案:B【此题考查知识点】手术热一般不超过38.5℃,若术后3~6天仍持续发热,提示感染或其他不良反应,由于该患者有切口疼痛,故提示切口感染。

51. 患儿王某,男,5岁,因法洛四联症缺氧发作,此时护士应采取的体位是

- A. 截石位
- B. 头高足低位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 头低足高位

答案:D【此题考查知识点】膝胸卧位适用于肛门、直肠、乙状结肠的检查、治疗;矫正子宫后倾和胎位不正;产后促进子宫复原;缺氧发作。

52. 患者,女,40岁,因急性左心衰卧床多日造成长发缠绕且黏结成团,护士帮其梳发,操作正确的是

- A. 梳发时由发梢到发根
- B. 用清水湿润后再梳顺
- C. 洗发时间越长越好
- D. 脱落的头发交给患者自行处理
- E. 洗发时如发现面色、脉搏、呼吸异常时应立即停止操作。

答案:E【此题考查知识点】床上洗发时应由发根梳至发梢,如遇到头发打结时,可用30%乙醇湿润后再小心梳顺。洗发时间不宜过长,以免引起头部充血、疲劳,造成患者不适。脱落的头发应由护士置于纸袋中统一处理。

53. 某患儿出生后发现患儿存在新生儿窒息,母亲可能出现的心理反应中包括

- A. 焦虑不安
- B. 功能障碍型悲哀
- C. 角色紊乱
- D. 烦躁
- E. 自我责怪

答案:A【此题考查知识点】焦虑(家长):与病情危重及预后不良有关。(人卫第5版儿科护理学)

54. 男性,15岁。在医院突然跌倒,四肢抽搐,牙关紧闭,口吐白沫,两眼睑上翻,首要的急救措施是

- A. 强行将四肢掰直
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 建立静脉通路
- D. 吸痰吸氧
- E. 给予药物注射

答案:B【此题考查知识点】癫痫患者的急救护理措施。为患者进行急救时,首先要保持呼吸道通畅。

55. 某已婚妇女,28岁,近年来工作压力较大,不想要孩子,来院咨询避孕方法,作为护士给患者下列建议中最不恰当的避孕方法是

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 避孕套
- D. 安全期避孕
- E. 输卵管结扎

答案:E【此题考查知识点】输卵管结扎是一种绝育方法,患者只是近期不愿受孕,所以E错误。

56. 孕妇27岁,妊娠26周来院进行产前检查,目前产妇进行产前检查的频率应当是

- A. 每2周一次
- B. 每3周一次
- C. 每4周一次
- D. 每5周一次
- E. 每周一次

答案:C【此题考查知识点】怀孕28周前每4周检查一次,怀孕28~36周每2周检查一次,怀孕36周后每周检查一次。

57. 患者,女,10岁。近日不思饮食,暖腐酸臭,大便多而臭,患者的病变部位在

- A. 肺
- B. 大肠
- C. 胃
- D. 小肠
- E. 胆囊

答案:B【此题考查知识点】大肠的生理功能。大肠接受小肠的糟粕,吸收多余水分,形成大

便。

58. 小王, 25 岁。到当地血站进行献血, 作为血站的工作人员, 应告知小王献血的间隔时间最少为

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 4 个月
- D. 6 个月
- E. 12 个月

答案:D【此题考查知识点】根据《献血法》, 采集间隔期不少于 6 个月。

59. 对于器官捐献者的私人信息, 护理工作者面对接受者的索要, 应采取的态度为

- A. 同患者一起登门道谢
- B. 委婉谢绝患者的打探
- C. 对捐献者进行大肆的宣传
- D. 建议患者电话进行致谢
- E. 建议给予捐献者经济补偿

答案:B【此题考查知识点】护士应当尊重、关心、爱护患者, 保护患者的隐私。对于捐献者的信息, 应该保密。

60. 某患者被诊断为扩张型心肌病, 该病人心脏结构最基本的改变是

- A. 室间隔肥厚
- B. 心室容积减少
- C. 单侧或双侧心腔扩大
- D. 左心室肥厚
- E. 右心室流出道梗阻

答案:C【此题考查知识点】扩张性心脏病最基本的病理改变是单侧或双侧心脏扩大。

61. 患者, 男, 40 岁, 心慌、气短来诊。超声心电图检查后诊断为心包积液。体检时, 最不可能出现的体征是

- A. 颈静脉怒张
- B. 肝大
- C. 奇脉
- D. 动脉血压升高
- E. 脉压减小

答案:D【此题考查知识点】心包积液时, 心肌收缩舒张功能受限, 回心血量减少, 可累及静脉回流, 出现颈静脉怒张、肝大、皮下水肿及腹水等; 心脏扩张受限可使收缩压降低, 而舒张压变化不大, 故脉压变小; 按积液时心脏受压程度, 脉搏可正常、减弱或出现奇脉。

62. 患儿, 男, 6 岁, 不慎溺水, 检查发现该男童面部青紫, 意识丧失, 自主呼吸停止, 颈动脉搏动消失。护士实施抢救时首先应采取的措施是

- A. 准备好给氧装置
- B. 准备开口器撑开口腔
- C. 清除口鼻分泌物和异物
- D. 放清洁纱布于男童口部
- E. 将男童双手放于其躯干两侧

答案:C【此题考查知识点】溺水患者的抢救: 溺水患者往往有水泥、污泥堵塞呼吸道, 抢救时首先应该清除口鼻分泌物和异物, 畅通气道。

63. 患者, 女, 60 岁, 夜间阵发性呼吸困难逐渐加重, 该患者初步诊断为左心衰, 以下哪一

项符合左心衰的体征

- A. 奇脉
- B. 平脉
- C. 水冲脉
- D. 脉搏短绌
- E. 交替脉

答案:E【此题考查知识点】未找到。

64. 患者, 男, 58岁, 慢性左心功能不全, 该患者最早出现的症状是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 心源性哮喘
- C. 水肿
- D. 咳粉红色泡沫样痰
- E. 食欲降低

答案:A【此题考查知识点】左心功能不全的患者由于肺淤血, 所以病人典型的临床表现是呼吸困难, 最早出现的是劳力性的呼吸困难。

65. 患者, 男, 50岁, 主动脉瓣狭窄, 患者突出临床表现是

- A. 胸痛伴晕眩
- B. 乏力、下肢水肿
- C. 呼吸困难、心绞痛和晕厥
- D. 乏力、水肿、黑蒙
- E. 咯血伴声音嘶哑

答案:C【此题考查知识点】主动脉狭窄的三联征表现: 呼吸困难、心绞痛和晕厥; 由于主动脉狭窄, 病人会有左心衰表现, 故表现呼吸困难; 同时泵出血液减少, 脑供血不足病人会有晕厥表现, 心供血不足病人可以有绞痛表现,

66. 患者, 女, 25岁, 因特发性血小板减少性紫癜住院, 应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时, 错误的是

- A. 密切观察皮肤出血点
- B. 坚持饭后服药
- C. 避免到人多聚集的地方
- D. 自我病情监测
- E. 若无新发出血可自行停药

答案:E【此题考查知识点】特发性血小板减少性紫癜患者服用糖皮质激素治疗时, 应告知患者必须按医嘱、按时、按剂量、按疗程用药, 不可自行减量或停药, 以免加重病情。

67. 患者, 女, 40岁, 诊断为缩窄性心包炎, 最常见的病因可能是

- A. 创伤
- B. 肿瘤
- C. 结核菌感染
- D. 化脓性细菌感染
- E. 非特异性感染

答案:C【此题考查知识点】结核性感染是缩窄性心包炎最常见的病因。

68. 患者, 女, 12岁, 患急性淋巴细胞白血病入院。治疗方案中应用环磷酰胺。在化疗期间要特别加强监测的项目是

- A. 体温
- B. 脉搏

- C. 脱发
- D. 血常规
- E. 血压

答案:D【此题考查知识点】骨髓抑制为环磷酰胺最常见的毒性,主要表现为白细胞减少,在化疗期间要特别加强监测血常规。

69. 患者,男,28岁,因皮肤黏膜出血来诊。判断为“再生障碍性贫血”入院。现患者有高热并且时有抽搐。此时最适宜的降温措施是

- A. 温水擦浴
- B. 乙醇擦浴
- C. 冷水灌肠
- D. 口服退热药
- E. 头部及大血管处放置冰袋

答案:E【此题考查知识点】再生障碍性贫血患者高热降温,最佳物理降温方法是头部及大血管处放置冰袋。

70. 女性,20岁。被诊断为急性白血病。实验室检查:白细胞  $43 \times 10^9/L$ ,红细胞  $2.7 \times 10^9/L$ ,血红蛋白  $67g/L$ ,血小板  $15 \times 10^9/L$ 。此时应重点观察患者

- A. 活动耐力
- B. 尿量
- C. 营养状况
- D. 月经周期
- E. 颅内出血征兆

答案:E【此题考查知识点】临床中当血小板低于  $<20 \times 10^9/L$ ,要高度警惕病人颅内出血的危险。

71. 患者女,32岁。因再生障碍性贫血接受丙酸睾酮注射治疗1个月余。护士每次在为患者进行肌肉注射前应首先检查

- A. 注射部位是否存在硬块
- B. 面部有无痤疮
- C. 有无毛发增多
- D. 有无皮肤黏膜出血
- E. 口唇、甲床的苍白程度

答案:A【此题考查知识点】丙酸睾酮为油剂,不易吸收,注射部位常可形成硬块,甚至发生无菌性坏死,故应经常检查局部有无硬结,发现硬结及时理疗,促进吸收,防止感染。

72. 患者,女,58岁,因支气管哮喘发作入院治疗。护士向患者说明服药注意事项时,应采用的沟通距离是

- A. 0~40cm
- B. 50~120cm
- C. 130~250cm
- D. 300~400cm
- E. 400cm以上

答案:B【此题考查知识点】患者哮喘发作,护士向患者说明服药注意事项时,应靠近患者,距离应是私人距离,为0.5~1.2米。

73. 患者,女,48岁,风湿性二尖瓣狭窄,给予患者苄星青霉素的作用是防止

- A. 风湿热
- B. 心力衰竭

- C. 动脉栓塞
- D. 心律失常
- E. 心绞痛

答案:A【此题考查知识点】苜星青霉素主要是预防风湿热,风湿热最主要的感染性细菌是溶血性链球菌,故首选苜星青霉素。

74. 患者,男,24岁,于3天前淋雨后出现寒战、高热、咳嗽、咳痰、胸痛等,初步诊断为肺炎球菌肺炎,该患者的典型痰液特点是

- A. 粉红色泡沫痰
- B. 砖红色胶冻状痰
- C. 铁锈色痰
- D. 大量黄色脓痰
- E. 白色浆液性痰

答案:C【此题考查知识点】肺炎球菌肺炎典型的痰液特点是铁锈色痰;粉红色泡沫痰见于急性肺水肿;砖红色胶冻状痰见于肺炎克雷伯杆菌感染;大量黄色脓痰提示细菌感染。

75. 患者,男,20岁,诊断为支气管哮喘,给该患者使用糖皮质激素的主要作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道炎症反应
- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

答案:B【此题考查知识点】控制支气管哮喘最有效的是糖皮质激素。

76. 患者,男,66岁,COPD的患者,现在患者出现呼吸困难加重,双下肢水肿,初步诊断为肺源性心脏病,肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是

- A. 缺氧性毛细血管收缩
- B. 血容量增加
- C. 血液黏稠度增加
- D. 继发性红细胞增多
- E. 肺部毛细血管微小栓子形成

答案:A【此题考查知识点】肺心病的患者,由于缺氧和高碳酸血症会导致肺毛细血管收缩,尤其是缺氧是最主要的因素,从而形成肺动脉高压。

77. 患儿,女,8个月,因“发热、咳嗽伴气促”就诊,以“肺炎”入院。为防止患儿发生并发症,护士应重点观察

- A. 睡眠状况
- B. 进食量
- C. 大小便次数
- D. 心率、呼吸的变化
- E. 咳嗽频率及轻重

答案:D【此题考查知识点】小儿肺炎只要及时发现和有效的治疗,病儿可很快康复。但重症会出现心力衰竭、呼吸衰竭、脓气胸等并发症,因此,应特别注意观察患儿心率、呼吸的变化。

78. 患者,男,27岁,因上腹部不适、食欲减退等就诊,诊断为慢性胃炎,护士在对其进行宣教时,应告知其与慢性胃炎发病相关的细菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 沙门菌

- C. 幽门螺杆菌
- D. 空肠弯曲菌
- E. 嗜盐杆菌

答案:C【此题考查知识点】慢性胃炎最常见的病因就是感染幽门螺杆菌。

79. 患者, 男, 68岁, 肝硬化肝性脑病患者, 该患者最具有特殊性的体征是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增加
- C. 扑翼样震颤
- D. 踝阵挛
- E. 巴彬斯基征阳性

答案:C【此题考查知识点】肝性脑病最具有诊断意义的体征就是扑翼样震颤。

80. 患者, 男, 54岁, 胆囊结石, 明天即将做胆囊切除术, 护士应首选下列哪个主题与患者交谈

- A. 吸烟的危害
- B. 规律饮食的重要性
- C. 鼓励患者战胜疾病
- D. 术前健康指导
- E. 止痛的方法

答案:D【此题考查知识点】胆囊结石患者, 明天即将做胆囊切除术, 此时最应该与患者交谈术前的健康指导。

81. 患者, 女, 58岁, 肝硬化病史6年。查体: 腹部膨隆, 腹壁皮肤紧张发亮, 脐周可见静脉曲张迂曲。患者腹壁膨隆的最可能原因是

- A. 肝大
- B. 脾大
- C. 大量腹水
- D. 腹腔积气
- E. 腹腔肿瘤

答案:C【此题考查知识点】大量腹水会导致患者出现腹部隆起, 正常人腹部平坦。

82. 患者, 男, 58岁, 反复上腹痛5年, 尤其是进餐后加重, 伴反酸暖气, 为了确诊该患首选的检查是:

- A. 腹部平片
- B. B超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

答案:D【此题考查知识点】消化性溃疡的患者在临床首选的辅助检查就是内镜, 空腔脏器一般通过内镜检查效果比较好。

83. 男性, 48岁。患十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻, 医嘱中出现下列哪种药物时, 护士应提出疑问

- A. 氢氧化铝胶囊
- B. 口服补液盐
- C. 奥美拉唑
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 克拉霉素



答案:B【此题考查知识点】口服补液盐治疗急性腹泻脱水患者。其他几种药物都是消化性溃疡常用的药物。

84. 患者,女,55岁,因贲门癌收治入院。患者近期进食梗阻感加重,体重明显下降。护士对其饮食的指导要点中,错误的是

- A. 少食多餐
- B. 半流质饮食
- C. 低蛋白、低热量饮食
- D. 高热量、高蛋白饮食
- E. 高维生素、易消化饮食

答案:C【此题考查知识点】贲门癌患者适宜饮食:高蛋白、高维生素、高热量、富含微量元素的膳食,注意少食多餐,根据需要每天可进餐5~8顿,进食时要细嚼慢咽。

85. 患者,男,58岁,有消化性溃疡病史3年。1天来胃痛明显,无恶心、呕吐。今晨觉头昏、乏力、黑矇,排尿、排便一次。对于该患者,除腹痛外,护士还应重点询问

- A. 排便习惯
- B. 粪便颜色
- C. 尿液颜色
- D. 尿量
- E. 有无眩晕

答案:B【此题考查知识点】患者有消化性溃疡病史,有头昏、乏力、黑矇表现,有消化道出血的可能。此时应注意观察粪便颜色,警惕消化道出血。

86. 患者,男,48岁,酒精性肝硬化入院。护士对其生活方式和行为的指导中,最重要的是

- A. 避免过度劳累
- B. 适量饮酒
- C. 戒酒
- D. 服用解酒护肝药
- E. 低脂饮食

答案:C【此题考查知识点】酒精性肝硬化患者最重要的措施就是戒酒。

87. 患者,男,65岁,因右下肢静脉曲张行大隐静脉高位结扎剥脱术,术后护士指导其使用弹力绷带的正确方法是

- A. 包扎前应下垂患肢、自上而下包扎
- B. 手术部位的弹力绷带应缠绕的更紧
- C. 两圈弹力绷带之间不能重叠
- D. 由近心端向远心端包扎
- E. 包扎后应能扪及足背动脉搏动

答案:E【此题考查知识点】弹力绷带应自下而上包扎,注意保持合适的松紧度,以能扪及足背动脉搏动和保持足部正常皮肤温度为宜。

88. 患者,男,56岁,房颤的患者,医嘱服用华法林。护士建议该患者日常生活中使用电动剃须刀剃须,主要目的是

- A. 避免出血
- B. 避免损伤皮肤引发感染性心内膜炎
- C. 避免交叉感染
- D. 方便老年人使用
- E. 经济实用

答案:A【此题考查知识点】华法林为抗凝药,有出血倾向,护士建议患者使用电动剃须刀剃

须，主要是为了避免出血。

89. 患儿，5岁，在门诊诊断为“房间隔缺损”，拟择期手术治疗。门诊护士对家属的健康教育要点，错误的是

- A. 本病为一种先天性心脏病
- B. 经过治疗，大多数情况下预后良好
- C. 治疗方案以手术为主
- D. 术前最重要的是防止皮肤破损
- E. 术前注意保暖，避免着凉、感冒

答案:D【此题考查知识点】房间隔缺损患儿可表现出生长发育落后、活动耐力降低、反复呼吸道感染、多汗等表现，并且出现心脏增大、肺循环压力及阻力增高、心力衰竭以及房性心律失常等。术前最重要的是防止呼吸道感染。

90. 患者，男，63岁，心绞痛2年，1天前出现胸腔绞窄性疼痛，舌下含服硝酸甘油不能缓解。查体：心率增快，心尖部可闻及舒张期奔马律。心电图：ST段抬高，该患者的检查结果最可能出现

- A. 低血糖
- B. 白细胞减少
- C. 肌钙蛋白升高
- D. 血沉下降
- E. C反应蛋白降低

答案:C【此题考查知识点】根据表现该患者可能出现了急性心肌梗死，因此可能出现血清心肌酶升高。

91. 患者，男，60岁。患肺结核15年，近年来病情反复，经常咯血，表现为烦躁、焦虑。护士在护理的过程中，应注意的是

- A. 采取严密隔离
- B. 病情观察，防止咯血导致窒息
- C. 采取健侧卧位
- D. 患者咯血时可进温软饮食
- E. 高流量高浓度吸氧

答案:B【此题考查知识点】经常咯血，血液离体后会形成血凝块，血凝块容易导致窒息。

92. 患者，男，56岁，有慢性支气管炎病史，现诊断为慢性肺源性心脏病，最常见的病因是

- A. COPD
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 肺动脉栓塞
- E. 呼吸窘迫综合征

答案:A【此题考查知识点】COPD是慢性肺源性心脏病最常见的原发病，由于COPD有呼吸困难，长期缺氧会导致肺毛细血管收缩，肺动脉高压形成，最终会导致肺心病。

93. 患者，女，65岁。因呼吸衰竭行呼吸机辅助呼吸。提示患者出现了过度通气的体征是

- A. 烦躁不安
- B. 抽搐、昏迷
- C. 皮肤潮红、多汗
- D. 表浅静脉充盈曲张
- E. 大汗淋漓

答案:B【此题考查知识点】过度通气，会导致患者出现碱中毒，而出现抽搐昏迷。

94. 患者，男，5岁，发热、刺激性咳嗽等，来医院后通过胸片及实验室检查，诊断为支原体肺炎，该患者的首选抗生素是

- A. 大环内酯类
- B.  $\beta$ ~内酰胺类
- C. 氨基糖苷类
- D. 喹诺酮类
- E. 磺胺类

答案:A【此题考查知识点】大环内酯类抗生素如罗红霉素，阿奇霉素是支原体感染首选的抗生素。

95. 某急性白血病患者，因“乏力、食欲减退、消瘦1个月余，伴发热1周”收入院。行化疗后出现恶心，但无呕吐。血常规检查：白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括

- A. 潜在的感染
- B. 营养失调：低于机体需要量
- C. 活动无耐力
- D. 发热、恶心
- E. 潜在的颅内出血

答案:E【此题考查知识点】考查血小板的正常值 $100 - 300 \times 10^9/L$ ，低于 $50 \times 10^9/L$ 易内脏出血，低于 $20 \times 10^9/L$ 易脑出血。

96. 患者，女，33岁。血友病15年。胃大部分切除术后2小时出现烦躁不安，术口敷料渗血，值班护士首先应采取的措施是

- A. 监测血糖变化
- B. 监测生命体征
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 查看患者病历
- E. 查看四肢活动情况

答案:B【此题考查知识点】血友病患者凝血因子减少，易出血量大而引起失血性休克，需严密监测生命体征变化。

97. 患儿，女，3岁。皮肤黏膜出现出血点、紫癜，经实验室检查诊断为特发性血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患者的

- A. 中性粒细胞比例
- B. 血小板计数
- C. 红细胞计数
- D. 白细胞计数
- E. 血红蛋白含量

答案:B【此题考查知识点】特发性（急性型）血小板减少性紫癜患者血小板明显减少（ $< 20 \times 10^9/L$ ）、出血严重者应卧床休息，防止创伤。一旦发现血小板计数 $< 10 \times 10^9/L$ 、严重而广泛出血、疑有或已发生颅内出血者，要及时通知医生，配合救治。

98. 护士小刘在重症监护室工作10年，由于工作长期处于紧张状态，劳动强度较大，患有腰肌劳损。近日感觉腰部不适加重，导致其损伤的职业因素属于

- A. 生物性因素
- B. 化学性因素
- C. 放射性因素
- D. 机械性因素

E. 心理因素

答案:D【此题考查知识点】机械损伤包括:跌倒、扭伤、撞伤等。

99. 患者,女,28岁。因子宫内膜异位症入院。护士为其进行晨间护理的内容中不包括

- A. 问候患者并了解睡眠情况
- B. 协助患者排便、漱口、洗脸
- C. 观察病情,给予心理护理
- D. 整理床单位
- E. 进行青霉素皮试

答案:E【此题考查知识点】给药护理应凭借医嘱执行。ABCD选项及酌情开窗通风,都属于晨间护理内容。

100. 患者,男,65岁,全心衰入院,下肢水肿。有关患者诊断正确的陈述是

- A. 下肢水肿由心肌细胞受损引起
- B. 水肿与心功能不全所致的上腔静脉淤血有关
- C. 体液过多下肢水肿与心衰所致的静脉淤血有关
- D. 体液过多下肢水肿由心衰所致引起
- E. 体液过多由心衰所致引起

答案:C【此题考查知识点】本题考查护理诊断的陈述方式,PE公式。

二、以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(101~103 共用题干)

患者,女,慢性细菌性痢疾入院,入院后生命体征平稳,医嘱给予2%黄连素液保留灌肠。

101. 为该患者灌肠时,应协助患者采取的体位是

- A. 仰卧位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 半坐卧位

答案:B【此题考查知识点】慢性细菌性痢疾病变部位多在直肠或乙状结肠,取左侧卧位,抬高臀部,有助于药物的吸收。

102. 药液的保留时间应为

- A. 15~20分钟
- B. 20~25分钟
- C. 30~40分钟
- D. 40~50分钟
- E. 1小时以上

答案:E【此题考查知识点】灌肠后嘱患者卧床休息,尽量忍耐,保留药液在1小时以上。

103. 关于保留灌肠说法错误的是

- A. 以晚间睡眠前进行为宜
- B. 操作前先排便排尿
- C. 插入肛管速度宜慢
- D. 注入药液速度宜快
- E. 液面距肛门不超过30cm

答案:D【此题考查知识点】注入药液的速度宜慢、量少。

(104~105 题共用题干)

患者，女，26岁，阑尾炎手术后一周，主诉腹胀、腹痛，叩诊腹部有鼓音。医嘱给予肛管排气法。

104. 为该患者进行肛管排气，肛管插入的深度为

- A. 4~7cm
- B. 7~10cm
- C. 10~15cm
- D. 15~18cm
- E. 18~20cm

答案:D【此题考查知识点】肛管排气时，肛管插入直肠的深度为15~18cm。

105. 保留肛管的时间是

- A. 不超过5分钟
- B. 不超过10分钟
- C. 不超过15分钟
- D. 不超过20分钟
- E. 不超过25分钟

答案:D【此题考查知识点】保留肛管的时间不超过20分钟，长时间保留肛管，会降低肛门括约肌的反应，甚至导致肛门括约肌永久性松弛。

(106~107 共用题干)

患者，女，38岁，因膀胱炎入院，护士遵医嘱给予0.02%呋喃西林液进行膀胱冲洗

106. 一次冲洗量为

- A. 200~500ml
- B. 500~650ml
- C. 600~800ml
- D. 500~1000ml
- E. 2000ml

答案:D【此题考查知识点】膀胱冲洗每天3~4次，或依医嘱而定，每次500~1000ml。

107. 膀胱冲洗的速度应控制在

- A. 20~40滴/分
- B. 40~60滴/分
- C. 60~80滴/分
- D. 80~90滴/分
- E. 90~100滴/分

答案:C【此题考查知识点】膀胱冲洗的速度一般为60~80滴/分，以免患者尿意强烈。膀胱收缩，迫使冲洗液从导管侧溢出尿道外。

(108~111 共用题干)

患者，男，60岁，因急性蜂窝织炎入院，医嘱给予青霉素药物治疗。患者既往无青霉素过敏史，开出医嘱青霉素皮试。

108. 患者在皮试15分钟后出现脉搏细弱、血压下降、发绀等症状，该患者可能出现了

- A. 呼吸困难
- B. 皮肤过敏反应

- C. 过敏性休克
- D. 血清病反应
- E. 消化道过敏反应

答案:C【此题考查知识点】患者在注射青霉素皮试液后5~20分钟内发生面色苍白、发绀、脉搏弱、血压下降等循环系统症状,该患者为过敏性休克反应。

109. 上述反应后首选的药物治疗是

- A. 去甲肾上腺素
- B. 盐酸肾上腺素
- C. 氨茶碱
- D. 沙丁胺醇
- E. 糖皮质激素

答案:B【此题考查知识点】青霉素过敏性休克一旦发现,立即停药,患者就地平卧,进行抢救。立即皮下注射0.1%盐酸肾上腺素0.5~1ml。此药是抢救过敏性休克的首选药物。

110. 该患者使用药物一周后出现发热、关节肿胀、荨麻疹、淋巴结肿大等,该患者考虑可能出现了

- A. 皮肤过敏反应
- B. 过敏性休克
- C. 血清病反应
- D. 呼吸道过敏
- E. 消化系统过敏

答案:C【此题考查知识点】血清病反应一般于用药后7~12天出现,临床表现与血清病相似,有发热、关节肿痛、皮肤发痒、荨麻疹、腹痛等。

111. 下列关于青霉素的注意事项,叙述不正确的是

- A. 用药前应询问“三史”包括用药史、家族史、过敏史
- B. 皮试液应现用现配
- C. 不宜空腹进行皮内试验
- D. 停药超过3天可继续使用青霉素
- E. 皮试期间严密观察

答案:D【此题考查知识点】凡初次用药、停药3天后再用,以及在应用中更换青霉素批号时,均须按常规做过敏试验。患者空腹时不宜进行皮试,因个别患者于空腹时注射用药,会发生眩晕、恶心等反应,易与过敏反应相混淆。

(112~114 共用题干)

患儿上午出生后,安返病房。下午家人发现该患儿嗜睡,青紫,肌张力减低

112. 测量患儿血糖,低于多少说明该患儿低血糖

- A. 1.1mmol/L
- B. 1.2mmol/L
- C. 2.1mmol/L
- D. 2.2mmol/L
- E. 2.0mmol/L

答案:D【此题考查知识点】新生儿低血糖的诊断。

113. 测得血糖1.1mmol/L,此时应该采取的治疗是

- A. 口服葡萄糖
- B. 注射葡萄糖溶液

- C. 注射胰岛素
- D. 注射胰高血糖素
- E. 口服葡萄糖无效者，注射葡萄糖注射液，并反复检测血糖

答案:E【此题考查知识点】低血糖患者的治疗。若持续性低血糖者，应根据病情需要，增加氢化可的松、胰高血糖素治疗。

114. 在护理患儿过程中，下列哪项措施不正确

- A. 定时检测患儿的血糖，防止再次发生低血糖
- B. 根据血糖结果调整静脉输液顺序和速度，保证血糖浓度稳定
- C. 密切观察病情
- D. 若血糖低于  $1.1\text{mmol/L}$  时，及时报告医生
- E. 为患者家属做好健康教育

答案:D【此题考查知识点】低血糖患儿的护理措施。血糖正常值为  $2.2\text{mmol/L}$ 。

(115~116 题共用题干)

女，38岁。因劳累，发作性头晕，胸闷半个月余，突发晕厥2h，以“梗阻型肥厚性心肌病待查。”急诊收入院。有猝死家族史。

115. 入院当晚，患者情绪较为紧张，迟迟无法入睡，多次呼叫值班护士，诉“头晕、胸闷”，但每次床边检查生命体征，除脉搏稍快外，余均正常。其发生上述表现的最主要原因是

- A. 床铺不舒服
- B. 陌生环境
- C. 担心猝死
- D. 不习惯医院环境
- E. 性格内向

答案:C【此题考查知识点】梗阻型肥厚性心肌病有猝死危险，所以病人情绪紧张，需要护士尤其要加强心理护理。

116. 对其进行健康指导，错误的做法是

- A. 解释保持情绪稳定的重要性，必要时遵医嘱使用镇静剂
- B. 避免用力屏气
- C. 若失眠，可外出散步，以改善睡眠
- D. 入厕、沐浴时，要有人陪同
- E. 保持二便通畅

答案:C【此题考查知识点】梗阻型肥厚性心肌病有猝死危险，不可在没有陪同的情况下独自外出。

(117~118 题共用题干)

患者男，50岁。胃溃疡病史20余年，近1个月出现腹部疼痛不似以前规律，无恶心、呕吐、体重下降现象。入院检查大便隐血实验阳性，考虑胃溃疡伴消化道出血。

117. 为了确诊首选的检查是

- A. 胃镜
- B. X线钡餐
- C. B超
- D. 血常规
- E. 大便培养

答案:A【此题考查知识点】消化性溃疡首选辅助检查是胃镜。

118. 该患者生活指导正确的是

- A. 禁食
- B. 多饮肉汤
- C. 高蛋白高纤维饮食
- D. 温凉、清淡无刺激饮食
- E. 加强体育锻炼

答案:D【此题考查知识点】消化性溃疡的病人饮食护理要低脂、避免浓肉汤,因为容易产酸,一般饮食采取温凉,清淡无刺激的饮食,以面食为主。

(119~120 题共用题干)

患者男,70岁。因慢性阻塞性肺气肿入院治疗。今晨护理查房时发现患者躁动不安,有幻觉,对自己所处的位置、目前的时间无法做出正确判断。

119. 医嘱给予吸氧。最适合该患者的吸氧流量为

- A. 2L/min
- B. 4L/min
- C. 6L/min
- D. 8L/min
- E. 12L/min

答案:A【此题考查知识点】慢性阻塞性肺气肿出现烦躁不安,幻觉往往提示二氧化碳潴留,容易诱发肺性脑病,故采取氧疗是低浓度、低流量,防止发生呼吸抑制。

120. 该患者目前的意识状态属于

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

答案:B【此题考查知识点】意识模糊的患者,定向力,对时间无法做出正确判断。