

2015 年执业中药师 真题

《中药学综合知识与技能》



一、最佳选择题（共 40 题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 中医理论认为“症”、“证”、“病”含义不同，下列表述中属于“证”的是

- A. 感冒
- B. 咳嗽
- C. 风寒犯肺
- D. 鼻痒喷嚏
- E. 恶寒发热

正确答案：C

解析：病，即疾病，是对机体在致病因素的作用下，邪正相争全过程病变特点的概括，症，即单个症状、体征。证，即证候，是对疾病一定阶段病变本质的概括，证候反映了个体在疾病过程中一定阶段的病因、病位、病性、邪正盛衰等本质，是辨证的结果和论治，包括处方用药的依据。“风寒犯肺”属于证候。

2. 根据阴阳相互关系，寒极生热，热极生寒属于阴阳的

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 互根互用
- D. 消长平衡
- E. 相互转化

正确答案：E

解析：阴阳转化指阴阳对立的双方，在一定的条件下，可以各自向其相反的方向转化，即阴可以转化为阳，阳也可以转化为阴。阴阳的转化还必须具备一定的条件。“寒极生热，热极生寒”，寒在“极”的条件下可向热的方面转化，热在“极”的条件下，也可向寒的方面转化。故选 E。

3. 具有调节汗孔作用的气是

- A. 营气
- B. 宗气
- C. 元气
- D. 卫气
- E. 真气

正确答案：D

解析：卫气功能表现在防御、温煦和调节三

医时代——贴身医药考试培训专家

个方面。卫气调节控制肌腠的开合、汗液的排泄，是气的固摄作用的具体体现。故选 D。

4. 称为“阴脉之海”的经脉是

- A. 带脉
- B. 冲脉
- C. 任脉
- D. 督脉
- E. 阴维脉

正确答案：C

解析：十二经脉中的手、足三阴经脉、阴维脉和冲脉均会于任脉，该脉有总调一身阴气的作用，因称阴脉之海。选 C。

5. 某男，20 岁，身体偏热，多动、好兴奋，其体质类型应辨为

- A. 偏阴质
- B. 偏阳质
- C. 淤血质
- D. 痰湿质
- E. 阴阳平和质

正确答案：B

解析：阴阳概念，凡是活动的、上升的、明显的、进行性的、机能亢进的，或属于功能方面的，都属阳；与它相反的一面，凡沉静的、下降的、稳晦的、退行性的、机能衰减的，或属于器质方面的，都属于阴。故选 B。

6. 依据七情内伤致病的理论，悲哀太过常导致

- A. 气上
- B. 气结
- C. 气消
- D. 气下
- E. 气乱

正确答案：C

解析：悲则气消：悲哀太过，耗伤肺气。即所谓的悲伤肺，恐则气下：过于恐惧，则肾气不固，气陷于下。即所谓的恐伤肾。思则气结：思虑太过，气结于中，脾气郁结，中焦气滞，水谷不化。即所谓的思伤脾。故选 C。

7. 中医诊断用以分辨邪正盛衰的纲领是

- A. 阴阳
- B. 表里
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

正确答案: D

解析: 虚实是辨别邪正盛衰的两个纲领。虚指正气不足; 实指邪气盛实。虚证反映人体正气虚弱而邪气也不太盛。实证反映邪气太盛, 而正气尚未虚衰, 邪正相争剧烈。虚实辨证, 可以掌握病者邪正盛衰的情况, 为治疗提供依据, 实证宜攻, 虚证宜补。故选 D。

8. 根据常见病辨论证治的理论, 时行感冒的治法是

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 清热解毒
- D. 益气解表
- E. 清热凉血

正确答案: C

解析: 时行感冒是感受四时不正之气, 发病呈流行性之感冒病证。病情常较一般感冒为重。治宜清热解毒, 疏邪解表。故选 C。

9. 可参考喘证辨证轮治的西医疾病是

- A. 上呼吸道感染
- B. 多种神经症
- C. 慢性肾脏疾病
- D. 肺源性心脏病
- E. 胃食管反流病

正确答案: D

解析: 喘证, 即气喘、喘息, 以呼吸困难, 甚则张口抬肩, 鼻翼煽动, 不能平卧等为主要临床特征的一种病证。严重者可由喘致脱出现喘脱之危重证候。肺源性心脏病发生呼吸困难, 可参照喘证辨证施治。故选 D。

10. 某男, 62 岁, 患胸痹 5 年, 胸痛胸闷, 胸肋胀满, 唇舌紫暗, 脉涩。其证当属于

医时代——贴身医药考试培训专家

- A. 寒凝心脉
- B. 痰瘀痹阻
- C. 气虚血瘀
- D. 心肾阳虚
- E. 气滞血瘀

正确答案: E

解析: 胸痛胸闷, 胸肋胀满为气滞所致, 唇舌紫暗, 脉涩均为瘀血特点, 故选 E。

11. 某女, 35 岁, 胃痛长满, 噯腐恶食, 矢气后痛减, 医生辨为饮食停滞证。治疗宜选用的中成药是

- A. 良附丸
- B. 保和丸
- C. 左金丸
- D. 四神丸
- E. 健脾丸

正确答案: B

解析: 保和丸可消食, 导滞, 和胃。主治食积停滞, 脘腹胀满, 噯腐吞酸, 不欲饮食。

12. 某女, 55 岁。头痛 10 年, 久治不愈, 痛如针刺, 固定不移, 舌紫, 脉细涩, 治疗宜选用的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 川穹茶调散
- C. 通窍活血汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 龙胆泻肝汤

正确答案: C

解析: 痛如针刺, 固定不移, 舌紫, 脉细涩均为瘀血致病特点, 通窍活血汤主治偏头痛, 日久不愈, 头面淤血。

13. 某女, 49 岁, 精神抑郁, 情绪不宁, 胸肋胀痛, 胸闷噯气善太息, 舌苔薄腻, 脉弦, 医生诊断为郁证, 其中医症候是

- A. 气滞血瘀
- B. 肝阳上亢
- C. 心脾两虚
- D. 痰气郁结
- E. 肝气郁结

正确答案: E

解析：患者 49 岁，精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀痛，胸闷暖气善太息，舌苔薄腻，脉弦，均为肝气郁滞，气机不畅表现，故选 E。

14. 某男，28 岁，患痤疮，症见面部粟疹累累，色红，疼痛，时有脓疱，口干渴，大便秘结，小便短赤，舌质红，舌薄黄，脉弦滑，宜选用的方剂是

- A. 二陈汤
- B. 枇杷清肺饮
- C. 茵陈蒿汤
- D. 防风通圣散
- E. 桃红四物汤

正确答案：B

解析：粟疹累累，色红，疼痛，时有脓疱，口干渴，大便秘结，小便短赤，舌质红，舌薄黄，脉弦滑，均为肺热表现，枇杷清肺饮宣肺，清热，化湿，主治痤疮，酒渣鼻等。

15. 某男，6 岁，厌食，面色萎黄，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化的食物，形体偏瘦，肢倦乏力，治疗宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 归脾丸
- C. 四物汤
- D. 清宁丸
- E. 异功散

正确答案：E

解析：患者 6 岁，厌食，面色萎黄，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化的食物，形体偏瘦，肢倦乏力均为小儿脾虚表现，故选异功散益气补中，理气健脾。

16. 某男 26 岁，患鼻渊，症见鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，伴头痛，发热，出汗，胸闷，咳嗽痰多，证属风热蕴肺，治疗宜选用的中成药是

- A. 鼻炎片
- B. 藿胆片
- C. 青果丸
- D. 铁笛丸
- E. 清咽丸

正确答案：A

医时代——贴身医药考试培训专家

解析：鼻炎片为解表剂，清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。用于风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。

17. 具有宁心安神功效的藏药方剂是

- A. 洁白丸
- B. 仁青常觉
- C. 志噶汗散
- D. 八味沉香散
- E. 七十味珍珠丸

正确答案：D

解析：八味沉香散为清热剂，清心热、养心安神、开窍。用于热病攻心，神昏谵语；冠心病心绞痛。

18. 蒙药理论认为：一个独立的药味以两个元素含量为主，其他元素为辅。形成苦味的主要元素是

- A. 水、气
- B. 火、气
- C. 土、水
- D. 火、土
- E. 水、火

正确答案：A

解析：蒙药之六味：药物有不同味道，是五元在药物形成的过程中，经过复杂作用而造就的，概括起来可分为甘、酸、咸、苦、辛、涩六种。甘味，在五元中以土、水含量为主，其他元素为辅。酸味，在五元中以火、土含量为主，其他元素为辅。咸味，在五元中以水、火含量为主，其他元素为辅。苦味，在五元中以水、气含量为主，其他元素为辅。涩味，在五元中以土、报导含量为主，其他元素为辅。

19. 血小板计数正常参考范围是

- A. $(10\sim50)\times 10^9/L$
- B. $(50\sim100)\times 10^9/L$
- C. $(100\sim300)\times 10^9/L$
- D. $(300\sim500)\times 10^9/L$
- E. $(500\sim700)\times 10^9/L$

正确答案：C

解析：血小板计数正常参考范围为 $(100\sim$

300) × 10⁹/L。

20. 引起血清肌酸激酶增高的疾病是

- A. 早期急性心肌梗死
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 急性颅脑损伤
- D. 成人脑膜炎
- E. 癫痫大发作

正确答案: A

解析: 血清肌酸激酶增高主要用于心肌梗死的诊断。故选 A。

21. 由宋代官府颁行的我国第一部成药典是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草纲目》
- C. 《太平圣惠方》
- D. 《千金翼方》
- E. 《太平惠民合剂局方》

正确答案: E

解析: 宋代官府颁行的我国第一部成药典是《太平惠民合剂局方》，识记内容。

22. 处方一般当日有效，特殊情况下有效期可以延长，但是最长不得超过

- A. 2 天
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 7 天
- E. 10 天

正确答案: B

解析: 处方一般当日有效，特殊情况下有效期可以延长，但是最长不得超过 3 天，识记内容。

23. 处方药名枇杷叶，调配应当付的是

- A. 生品
- B. 酒炙品
- C. 蜜炙品
- D. 醋炙品
- E. 姜炙品

正确答案: C

解析: 枇杷叶的功效是清肺止咳，降逆止呕，主要用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕吐，

医时代——贴身医药考试培训专家

哮喘。加入蜂蜜主要是起润的作用，增加润肺止咳的作用。

24. 服用藿香正气丸宜选用的“药引”是

- A. 姜汤
- B. 米汤
- C. 盐水
- D. 黄酒
- E. 芦根煎汤

正确答案: A

解析: 姜汤疏风解表、温中止呕、散寒止痛、开胃消食，对于健脾和胃，散寒止痛，腹痛腹泻类中成药，如藿香正气丸、附子理中丸、荆防败毒散、山楂丸等，可用生姜 3~5 片，水煎取汁送服。

25. 属“十九畏”的组药是

- A. 甘草与瓜蒌
- B. 郁金与丁香
- C. 乌头与半夏
- D. 海藻与京大戟
- E. 人参与细参

正确答案: B

解析: “十九畏”的组药是: 硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

26. 妊娠慎用的中药是

- A. 桂枝
- B. 麻黄
- C. 防风
- D. 连翘
- E. 黄芩

正确答案: A

解析: 桂枝温经通阳，孕妇慎用。故选 A。

27. 表邪未解者忌用的中药是

- A. 固表止汗药
- B. 活血化瘀药
- C. 苦寒清热药
- D. 淡渗利湿药
- E. 涩肠止泻药

正确答案：A

解析：表邪未解者忌收敛。

28. 调配饮片时，每剂中药的重量误差应控制在

- A. $\pm 1\%$ 以内
- B. $\pm 2\%$ 以内
- C. $\pm 3\%$ 以内
- D. $\pm 5\%$ 以内
- E. $\pm 10\%$ 以内

正确答案：D

解析：识记内容。

29. 妊娠慎用的中成药是

- A. 六味地黄丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 香砂养胃丸
- D. 天王补心丸
- E. 玩味羌活丸

正确答案：B

解析：牛黄孕妇慎服。故选 B。

30. 一般中药炮制品的绝对含水量应控制在

- A. 5%~10%
- B. 5%~13%
- C. 7%~10%
- D. 7%~13%
- E. 7%~15%

正确答案：D

解析：识记内容。

31. 因易泛油而需要置阴凉干燥处贮存的饮片是

- A. 山药
- B. 苦参
- C. 半夏
- D. 当归
- E. 黄柏

正确答案：D

解析：当归中含有大量的蔗糖和挥发油，非常容易走油和吸收水分发霉、生虫并变色，贮存当归前一定要先将它晾晒好，然后放在阴凉干燥处，最好温度在 28 摄氏度以下。

医时代——贴身医药考试培训专家

平时还要定期检查，发现吸潮或轻度霉变、虫蛀，要及时晾晒或用 60 摄氏度的温度烘干。

32. 合理用药基本原则中首要考虑的是

- A. 有效
- B. 安全
- C. 经济
- D. 使用方便
- E. 便于贮存

正确答案：B

解析：理用药基本原则中首要考虑的是安全。故选 B。

33. 某男，56 岁。遍体浮肿，腹胀，二便不利，服用峻下逐水的舟车丸，为防伤正气，可连用的中成药是

- A. 二陈丸
- B. 麻仁丸
- C. 四君子丸
- D. 附子理中丸
- E. 六味地黄丸

正确答案：C

解析：四君子丸益气健脾，用之可缓解药物所致脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。

34. 下列配伍应用的药组中，属于不合理连用的是

- A. 附子理中丸与四神丸
- B. 归脾丸与人参养荣丸
- C. 朱砂安神丸与天王补心丸
- D. 六味地黄丸与补中益气丸
- E. 二陈丸与平胃散

正确答案：C

解析：朱砂安神丸与天王补心丸均有安神之效，均含朱砂，故不宜合用。

35. 可抑制胃蠕动及排空，延长某些药物在胃内滞留时间的中药是

- A. 玫瑰花
- B. 旋覆花
- C. 金银花
- D. 合欢花

E. 洋金花

正确答案: E

解析: 一些含生物碱的中药如麻黄、颠茄、洋金花、曼陀罗、莨菪等, 可抑制胃蠕动及排空。故选 E。

36. 因含有马来酸氯苯那敏, 司机及登高作业者感冒时不宜服用的中成药是

- A. 强力感冒片
- B. 金羚感冒片
- C. 抗感灵片
- D. 感冒清热颗粒
- E. 舒肺糖浆

正确答案: B

解析: 金羚感冒片含阿司匹林、马来酸氯苯那敏、维生素 C。

37. 因含有雄黄, 过量服用可致肝肾功能损害的中成药是

- A. 牛黄上清丸
- B. 牛黄降压丸
- C. 牛黄解毒片
- D. 冠心苏合丸
- E. 桂枝茯苓丸

正确答案: C

解析: 牛黄解毒片因含有雄黄, 不宜久服。

38. 具有肝脏毒性的中药是

- A. 使君子
- B. 黄药子
- C. 女贞子
- D. 车前子
- E. 牛蒡子

正确答案: B

解析: 1、致一般性肝损害, 如长期或超量服用姜半夏、蒲黄、桑寄生、山慈姑等可出现肝区不适、疼痛、肝功能异常。

2、致中毒性肝损害, 如超量服用川楝子、黄药子、蓖麻子、雷公藤煎剂, 可致中毒性肝炎。

3、致肝病性黄疸, 如长期服用大黄或静脉滴注四季青注射液, 会干扰胆红素代谢途径, 导致黄疸。

医时代——贴身医药考试培训专家

4、诱发肝脏肿瘤, 如土荆芥、石菖蒲、八角茴香、花椒、蜂头茶、千里光等中草药里含黄樟醚; 青木香、木通、硝石、朱砂等含有硝基化合物, 均可诱发肝癌。

39. 排除药物性肝损害的依据是

- A. 肝肿大
- B. 肝脏压痛
- C. 肝区疼痛
- D. 转氨酶升高
- E. 病毒检测阳性

正确答案: E

解析: 病毒检测阳性是病毒性肝炎的诊断依据。

40. 因服用过量而发生药物不良反应, 可致呼吸麻痹而死亡的中药是

- A. 细辛
- B. 使君子
- C. 胆矾
- D. 雷公藤
- E. 香加皮

正确答案: A

解析: 细辛的毒性反应: 细辛挥发油对蛙、兔、小鼠, 均呈先兴奋、后抑制, 使随意运动和呼吸减慢, 反射消失, 最后呼吸麻痹而死亡。

二、配伍选择题(共 50 题, 每题 1 分。题目分为若干组, 每组题目对应同一组备选项, 备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有 1 个最符合题意)

【41~42】

- A. 肝
- B. 脾
- C. 肺
- D. 心
- E. 肾

根据中医藏象学说

41. 主统血的脏是

正确答案: B

解析: 脾主统血, 识记内容。

42. 主藏血的是

正确答案: A

解析: 肝主藏血, 识记内容。

【43~44】

A. 实寒证

B. 实热证

C. 虚寒证

D. 虚热证

E. 亡阳证

43. 阳偏盛病机表现的临床证候是

正确答案: B

解析: 阳盛则热, 生实热证。

44. 阳偏衰病机表现的临床证候是

正确答案: C

解析: 阳虚则寒, 生虚寒证。

【45~47】

A. 手足抽搐

B. 手足肿胀

C. 手足麻木

D. 手足软弱

E. 手足不遂

45. 痿证可见

正确答案: D

解析: 痿证特点为肢体痿弱无力, 不能随意运动。

46. 痉证可见

正确答案: A

解析: 痉证是以项背强急, 四肢抽搐, 甚则角弓反张为主要特征的急性病。

47. 惊风可见

正确答案: A

解析: 是小儿时期常见的一种急重病证, 以临床出现抽搐、昏迷为主要特征。

【48~49】

A. 痿软舌

B. 瘦薄舌

C. 齿痕舌

医时代——贴身医药考试培训专家

D. 裂纹舌

E. 芒刺舌

48. 热盛津伤可见

正确答案: D

解析: 裂纹舌主热盛津伤证, 识记内容。

49. 脾虚湿盛可见

正确答案: C

解析: 齿痕舌是脾虚湿盛证特点。

【50~52】

A. 呼吸不畅, 胸闷气短

B. 呼吸有力, 声高气粗

C. 呼吸困难, 短促急迫

D. 呼吸困难, 喉中有声

E. 呼多吸少, 气得不续

50. 实热多见

正确答案: B

解析: 呼吸有力, 声高气粗为实证表现, 见于实热证。

51. 虚喘多见

正确答案: E

解析: 虚喘为肾虚不纳气, 特点是呼多吸少, 气得不续。

52. 哮证多见

正确答案: D

解析: 哮证特点是发作性痰鸣, 气喘疾病, 以呼吸急促, 喉间哮鸣为主要特征

【53~55】

A. 通宣理肺丸

B. 二母宁嗽丸

C. 蛇胆川贝液

D. 固本止咳片

E. 小青龙合剂

53. 治疗咳嗽燥邪伤肺证, 宜选用的中成药是

正确答案: B

解析: 二母宁嗽丸为化痰、止咳、平喘剂, 具有清肺润燥, 化痰止咳功效。用于燥热蕴肺所致的咳嗽、痰黄而黏不易咳出、胸闷气

促、久咳不止、声哑喉痛。

54. 治疗咳嗽风寒犯肺证，宜选用的中成药是

正确答案：A

解析：通宣理肺丸为解表剂，具有解表散寒，宣肺止咳之功效。主治感冒咳嗽，发热恶寒，鼻塞流涕，头痛无汗，肢体酸痛。

55. 治疗咳嗽痰热雍肺证，宜选用的中成药是

正确答案：C

解析：蛇胆川贝液可祛风止咳，除痰散结。用于风热咳嗽，痰多，气喘，胸闷，咳痰不爽或久咳不止。

【56~58】

A. 泻下粪便如败卵，伴未消化食物，噤腐吞酸

B. 泻下急迫，泻下不爽，肝门灼热，小便短黄

C. 大便时溇时泻，稍进油腻食物，便次明显增多

D. 黎明之时，脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安

E. 泄泻清稀，甚则如水样，腹痛肠鸣，脘闷食少

56. 泄泻脾肾阳虚的临床症状是

正确答案：D

解析：黎明之时，脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安是五更泻，为脾肾阳虚泄泻。

57. 泄泻湿热内蕴证的临床症状是

正确答案：B

解析：泻下急迫，泻下不爽，肝门灼热，小便短黄，均为湿热表现。

58. 泄泻食伤肠胃证的临床症状是

正确答案：A

解析：泻下粪便如败卵，伴未消化食物，噤腐吞酸，均为饮食所伤的表现。

【59~61】

医时代——贴身医药考试培训专家

A. 桂附地黄丸

B. 四物汤

C. 附子理中丸

D. 四君子汤

E. 沙参麦冬汤

59. 治疗虚劳阴虚证，宜选用的方剂是

正确答案：E

解析：虚劳阴虚证，可用沙参麦冬汤甘寒生津，清养肺胃。

60. 治疗虚劳血虚证，宜选用的方剂是

正确答案：B

解析：四物汤为治疗血虚证基础方。

61. 治疗虚劳气虚证，宜选用的方剂是

正确答案：D

解析：四君子汤为治疗气虚证的基础方。

【62~63】

A. 温经汤

B. 丹栀逍遥散

C. 固阴煎

D. 膈下逐瘀汤

E. 固冲汤

61. 治疗痛经阳虚内寒证，宜选用的方剂是

正确答案：A

解析：温经汤为理血剂，具有温经散寒，养血祛瘀之功效。主治冲任虚寒、瘀血阻滞证。漏下不止，血色暗而有块，淋漓不畅，或月经超前或延后，或逾期不止。

62. 治疗痛经气滞血瘀证，宜选用的方剂是

正确答案：D

解析：膈下逐瘀汤主治膈下瘀阻气滞，形成痞块，痛处不移，卧则腹坠；肾泻久泻。现用于宫外孕、不孕症等属血瘀气滞者。

【64~65】

A. 煅制品

B. 蜜炙品

- C. 醋制品
- D. 盐炙品
- E. 烫制品

63. 处方名益智仁，调剂时应付

正确答案：D

解析：“盐炙缩尿”证明了益智仁“生品入脾，盐炙入肾，生熟有别”，用于温脾止泻，益智仁无需盐炙，生用即可；用于暖肾缩尿，则需要盐炙，以炙品为佳。

64. 处方名延胡索，调剂时应付

正确答案：C

解析：延胡索，醋制后可增强止痛的作用。

【66~67】

- A. 瓜蒌
- B. 白芍
- C. 丹参
- D. 甘草
- E. 乌头

根据中药“十八反”

65. 与海藻相反的中药是

正确答案：D

解析：“十八反”内容：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白芨；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

66. 与半夏相反的中药是

正确答案：E

解析：“十八反”内容：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白芨；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

【68~70】

- A. 薄荷
- B. 阿胶

医时代——贴身医药考试培训专家

- C. 蒲黄
- D. 鹿角霜
- E. 人参

67. 先煎的中药是

正确答案：D

解析：鹿角霜先煎有利药效发挥。

68. 后下的中药是

正确答案：A

解析：薄荷气味芳香，宜后下以免药物煎久宜失去功效。

70. 包煎的中药是

正确答案：C

解析：包煎是将药物包括于原色稀棉布布袋中进行煎煮。具体有：花粉、细小种子及细粉类药物应包煎，因其易漂浮在水面，不利煎煮，如蒲黄、葶苈子、滑石粉等；含淀粉、黏液质较多的药物应包煎，因其易粘锅糊化、焦化，如车前子等；绒毛类药物应包煎，因其难于滤净，混入药液则刺激咽喉，如旋覆花等。

【71~73】

- A. 吴茱萸、蛇床子
- B. 车前子、地肤子
- C. 山豆根、制川乌
- D. 马钱子、天仙子
- E. 枇杷叶、侧柏叶

根据《中国药典》对有毒中药的分类

71. “小毒”中药是

正确答案：A

解析：识记内容。“小毒”中药是：丁公藤、九里香、土鳖虫、大皂角、小叶莲、水蛭、艾叶、地枫皮、两面针、苦木、金铁锁、草乌叶、南鹤虱、鸦胆子、重楼、急性子、蛇床子、猪牙皂、绵马贯众炭、紫萁贯众、蒺藜、槭藤子、鹤虱、翼首草、川楝子、飞扬

草、北豆根、红大戟、吴茱萸、苦杏仁、绵马贯众。

72. “有毒”中药是

正确答案: C

解析: 识记内容。“有毒”中药是: 砒石、砒霜、水银、生马前子、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蝥、青娘虫、红娘虫、生甘遂、生狼毒、生藤黄、生千金子、生天仙子、闹阳花、雪上一枝蒿、红升丹、白降丹、蟾酥、洋金花、红粉、轻粉、雄黄。

73. “大毒”中药是

正确答案: D

解析: 有大毒中草药有川乌、马钱子、天仙子、巴豆、红粉、闹洋花、草乌、斑蝥

【74~75】

- A. 1~3g
- B. 3~6g
- C. 3~9g
- D. 5~9g
- E. 6~9g

74. 水蛭的内服用量是

正确答案: A

解析: 识记内容。

75. 全蝎的内服用量是

正确答案: B

解析: 识记内容。

【76~77】

- A. 不超过 20℃
- B. 避光且不超过 20℃
- C. 2℃~10℃
- D. 10℃~30℃
- E. 2℃~8℃

76. 冷处所指环境条件是

医时代——贴身医药考试培训专家

正确答案: C

解析: 药品的放置环境《中国药典》2010年版二部凡例第 22 条规定: 冷处为 2℃~10℃

77. 阴凉处所指环境条件是

正确答案: A

解析: 《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)药品贮藏温度, 阴凉处指不超过 20℃。

【78~79】

- A. 花椒
- B. 藏红花
- C. 细辛
- D. 泽泻
- E. 牡丹皮

采用对抗贮存法养护中药时

78. 可与冬虫夏草同贮的是

正确答案: B

解析: 二者同属名贵药材, 可同贮。

79. 可与蛤蚧同贮的是

正确答案: A

解析: 蛤蚧极易发生霉变、虫蛀, 储藏时也应用细布包好, 并放入少许花椒密封存于干燥处。

【80~81】

- A. 山楂与磺胺嘧啶
- B. 金银花与青霉素
- C. 山茱萸与林可霉素
- D. 五倍子与多酶片
- E. 石麦汤与氯氮平

80. 具有协同增效作用的中西药联合用药组是

正确答案: B

解析: 金银花与青霉素合用, 能加强青霉素对耐药金黄色葡萄球菌的抗菌作用, 在抑制细菌体内蛋白质合成上有协同的作用。

81. 能降低药物毒副作用的中西药联合用药组是

正确答案: E

解析：治疗精神分裂症，选择氯氮平与中药石麦汤合用，可使氯氮平导致的最常见的不良反应消失。

【82~84】

- A. 乌梅与阿司匹林
- B. 乌贝散与头孢拉定
- C. 石膏与四环素
- D. 麻黄与呋喃唑酮
- E. 大黄与利福平

82. 能减少药物排泄的中西药联合用药是

正确答案：A

解析：酸性较强的药物联用，可酸化体液而使药物排泄减少，增加药物的毒副作用。含有机酸成分的中药，如乌梅、山茱萸、陈皮、木瓜、川芎、青皮、山楂、女贞子等与磺胺类、一大环内酯类药物、利福平、阿司匹林等酸性药物合用时，因尿液酸化，可使磺胺类和大环内酯类药物的溶解性降低，增加磺胺类药物的肾毒性。

83. 能发生酶抑反应的中西药联合用药是

正确答案：D

解析：麻黄与呋喃唑酮、优降糖等单胺氧化酶抑制剂同时服用，会使去甲肾上腺素、神经末梢递质增加释放，导致血压骤升，甚至出现高血压危险。

84. 影响药物透过生物膜吸收的中西药联合用药时

正确答案：E

解析：中药中的某些成分如鞣质、药用炭、生物、果胶及金属离子等易与西药结合或吸附，特别是以固体形式口服的西药，可导致某些药物作用下降。含鞣质较多的中药有大黄、虎杖、五倍子、石榴皮等，因此中成药牛黄解毒片（丸）、麻仁丸、七厘散等不宜与口服的红霉素、士的宁、利福平等同用，因为鞣质具有吸附作用，使这些西药透过生物膜的吸收量减少。蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞子等不宜与生物、酶制剂同服，因为药物炭吸附生物及酶制剂，抑制其生物活性，影响药物的吸收。含有果胶类药物，如六味地

医时代——贴身医药考试培训专家

黄丸、人参归脾丸、山茱萸等不宜与林可霉素（洁霉素）同服，同服后可使林可霉素的透膜吸收减少 90%。

【85~87】

- A. 麝香保心丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参鹿茸丸
- D. 银杏叶制剂
- E. 柴胡舒肝丸

85. 老年人服用地高辛时不宜同时服用的中成药是

正确答案：A

解析：麝香保心丸不宜于地高辛合用，因为蟾酥主要成分、基本结构与强心苷相似，故具有与洋地黄相似的强心作用，合用易引起心动过缓、束支传导阻滞、房室传导阻滞、室性早搏甚至出现室颤。

86. 老年人服用法莫替丁是不宜同时服用的中成药是

正确答案：D

解析：法莫替丁片为抗溃疡抗酸药，与含有多量黄酮类成分的银杏叶制剂同时服用可产生络合效应，形成螯合物，影响疗效。因此，在服用抗酸类西药时应避免与含黄酮类的中药如复方丹参片、复方丹参滴丸、银杏叶片等同时应用，应分时应用，一般来讲，以间隔 1 小时为宜。

87. 老年人服用二甲双胍时不宜同时服用的中成药是

正确答案：C

解析：对患有糖尿病的心脑血管患者用含有甘草、人参、鹿茸等成分的中成药使降糖药的疗效降低。

【88~90】

- A. 口舌、四肢及全身麻木，头痛、头晕、精神恍惚、牙关紧闭
- B. 头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难、伸肌与屈肌同时收缩
- C. 咽喉干痛、灼烧感、口中金属味、流涎、

腹痛腹泻、出现各种出血症状，黄疸
D. 胸闷、心悸、心律不齐、四肢厥冷、血压下降、心电图显示房室传导阻滞
E. 严重脱水、低蛋白血症、水肿、神经错乱、幻觉、癫痫样发作

88. 马钱子中毒的主要临床表现为

正确答案: B

解析: 马钱子临床早期中毒症状体征有: 头昏、头晕、胸闷、恶心、呕吐、全身瘙痒、疼痛、灼热、腹痛、烦躁不安、心搏缓慢、血压上升、呼吸增强、嚼肌及颈部肌肉抽筋感、咽下困难、呼吸加快、瞳孔缩小、全身发紧等, 随之可出现伸肌与屈肌同时作极度收缩(须与破伤风鉴别), 继而出现士的宁中毒的典型症状, 从阵挛性到强直性呈角弓反张姿势, 惊厥症状可有 10 多分钟到数小时, 持续可过几秒到数分钟, 任何刺激都可使惊厥再次发作, 惊厥后肌肉松弛。严重中毒者可发生延髓麻痹, 因呼吸麻痹、窒息或心力衰竭或心室纤颤而死亡。

89. 雄黄中毒的主要临床表现为

正确答案: C

解析: 雄黄急性中毒的症状表现为: 口干咽燥、流涎、剧烈呕吐、头痛、头晕、烦躁不安、腹痛腹泻, 甚者多部位出血、惊厥、意识丧失、紫绀、呼吸困难并成休克状态, 可因出血、肝肾功能衰竭、呼吸中枢麻痹而死亡。

90. 蟾酥中毒的主要临床表现为

正确答案: D

解析: 蟾酥中毒一般有恶心呕吐、腹痛、腹泻、头晕、头痛, 出汗, 口唇及四肢麻木, 心律失常, 血压下降, 体温不升, 四肢厥冷等表现。

三、综合分析选择题(共 20 题, 每题 1 分, 题目分为若干组, 每组题基于同一个临床情景, 病历、实例或病历的信息, 每题只有一个最符合题意的选项。)

【91~92】

某女, 32 岁, 平素性情急躁易怒, 月经不

医时代——贴身医药考试培训专家

调, 因胃痛 1 周就诊, 胃脘灼痛, 痛势急迫, 烧心泛酸, 口苦口干, 舌红苔黄, 脉弦。

91. 该患者舌红提示属于

- A. 虚寒证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 瘀血证
- E. 痰湿证

正确答案: B

解析: 舌红提示热证, 结合临床症状, 苔黄, 辨证为实热证。

92. 该患者弦脉提示病位相关之脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

正确答案: A

解析: 弦脉主肝胆病。

【93~95】

某男, 65 岁。咳喘 10 余年, 气短乏力, 痰多清稀, 食欲减少, 腹胀便溏, 足面浮肿。舌淡苔白, 脉细弱。

93. 中医辨证是

- A. 肾不纳气
- B. 肺肾两虚
- C. 心肾阳虚
- D. 心肺两虚
- E. 肺脾两虚

正确答案: E

解析: 患者 65 岁, 10 余年咳喘史。气短乏力, 痰多清稀, 食欲减少, 腹胀便溏, 足面浮肿。舌淡苔白, 脉细弱均提示气虚证, 此为虚喘。故选 A。

94. 辨证要点是既有咳喘、食少, 又兼见

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 血虚
- D. 阴虚
- E. 阳虚

正确答案: A

解析: 短乏力, 痰多清稀, 食欲减少, 腹胀便溏, 足面浮肿。舌淡苔白, 脉细弱均提示气虚证。

95. 根据八纲辨证, 该证属于

- A. 表证
- B. 寒证
- C. 热证
- D. 虚证
- E. 阳证

正确答案: D

解析: 此为八纲中的虚证。

【96~99】

某女, 43岁, 入睡困难, 且多梦易醒, 心悸健忘, 身疲食少, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌质淡, 苔薄白, 脉细无力, 中医诊断为不寐。

96. 中医辨证为

- A. 心火亢盛
- B. 肝气郁结
- C. 心脾两虚
- D. 滋阴补肾
- E. 温补心脾

97. 应采用的中医治法是

- A. 健脾养心
- B. 疏肝理气
- C. 清心泻火
- D. 滋阴补肾
- E. 温补心肾

98. 治疗宜选用的方剂是

- A. 逍遥散
- B. 归脾汤
- C. 导赤散
- D. 右归丸
- E. 生脉散

99. 治疗宜选用的中成药是

- A. 朱砂安神丸
- B. 养血安神丸

医时代——贴身医药考试培训专家

C. 泻肝安神丸

D. 天王补心丹

E. 柏子养心丸

正确答案: CABE

解析: 入睡困难, 且多梦易醒, 心悸健忘提示心血虚证; 身疲食少, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌质淡, 苔薄白, 脉细无力提示脾气虚证。辨证为心脾两虚证。心脾两虚证, 治宜健脾养心。归脾汤主治心脾两虚证。柏子养心丸主治心脾两虚证。

【100~103】

某女, 56岁, 小便点滴而下, 量极少而短赤灼热, 小腹胀满, 口苦口黏, 渴不欲饮, 大便不畅。舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

100. 中医诊断是

- A. 痹症
- B. 虚劳
- C. 淋证
- D. 癃闭
- E. 郁证

101. 中医辨证是

- A. 肾阳衰惫
- B. 膀胱湿热
- C. 肾阴亏虚
- D. 脾胃气虚
- E. 肝气郁结

102. 治疗宜选用的方剂是

- A. 八正散
- B. 代抵挡丸
- C. 济生肾气丸
- D. 参苓白术散
- E. 逍遥散

103. 治疗宜选用的中成药是

- A. 三金片
- B. 归脾丸
- C. 小药丸
- D. 右归丸
- E. 丹莪片

正确答案: DBAA

解析：小便点滴而下，量极少而短赤灼热为淋证临床表现。膀胱湿热为淋证病机。八正散主治湿热淋证。三金片主治湿热淋证。

【104~106】

某女，45岁。患有类风湿性关节炎，长期服用解热镇痛药，近期咽喉肿痛，牙痛，邻居介绍服用心痹片。患者购药时向药师咨询，希望了解该药的更多信息。药师咨询患者一般情况和用药目的，结合病人既往治疗情况，组织该患者购买新痹片。

104. 因为新痹片含有解热镇痛药，为防止重复用药，药师阻止了患者购药。新痹片所含的化学成分是

- A. 双氯芬酸
- B. 对乙酰基酚
- C. 布洛芬
- D. 吲哚美辛
- E. 安乃近

解析：新痹片成分之一是吲哚美辛。

105. 要是进一步说明，若加用新痹片，造成解热镇痛药重复使用，会加大不良反应发生的可能性。关于该药发生不良反应的说法，错误的是

- A. 有头痛、眩晕等中枢神经系统反应
- B. 发生过敏反应常见为皮疹
- C. 常具有胃肠道反应
- D. 可引起肝肾损害
- E. 可引起粒细胞增高

解析：新痹片含吲哚美辛，个别患者空腹服药会有眩晕、咽干、倦怠、胃部嘈杂不适、轻度腹泻，停药后自行消失。故胃及十二指肠溃疡者、肾功能不全者及孕妇慎用。

106. 接着，药师向患者介绍，服用该药的注意事项，正确的是

- A. 孕妇慎用
- B. 肝功能不全者慎用
- C. 哺乳期妇女慎用
- D. 精神病患者慎用
- E. 溃疡病患者慎用

正确答案：DEB

医时代——贴身医药考试培训专家

解析：新痹片可引起肝肾损害，故肝功能不全者慎用。

【107~108】

某男，70岁，患糖尿病10年，长期服用西药降糖药，血糖稳定，今日听人介绍，又自行加服了中成药消渴丸。2日后，出现低血糖反应，遂去医院就诊。

107. 医师分析出现低血糖反应的原因，与过量服用降糖药有关并告知患者，在其所服的降糖药产生叠加作用，消渴丸中所含的化学成分是

- A. 二甲双胍
- B. 格列本脲
- C. 阿卡波糖
- D. 罗格列酮
- E. 瑞格列奈

108. 进入冬季，患者加服膏方调补，一段时间后，出现血糖波动，时有升高，分析其原因，是与其所服膏方中的某些中药有关，下列中药，能使血糖升高的药组是

- A. 鹿茸、甘草
- B. 麦冬、沙参
- C. 天冬、赤芍
- D. 肉苁蓉、肉桂
- E. 制首乌、熟地黄

正确答案：BA

解析：消渴丸的主要成分为葛根、南五味子、山药、黄芪、地黄、天花粉、格列本脲。补气药物引起血糖升高。

【109~110】

5岁幼儿嗜食坚果，某日该儿童出现眩晕、恶心、呕吐等症状来医院就诊。来院后病情继续恶化，出现甚至改变、惊厥，查体：瞳孔散大，对光反射迟钝，询问家长得知，患儿发病前服用过某种坚果。

109. 结合病情，医师推测患儿可能因误食某种坚果中毒，误食的坚果是

- A. 桃仁
- B. 榛子
- C. 苦杏仁

- D. 松子
- E. 甜杏仁

110. 若医师诊断正确，患儿病情又进一步发展，可能出现的严重后果是

- A. 黏膜出血
- B. 呼吸麻痹
- C. 中毒性肝炎
- D. 急性肾衰竭
- E. 中毒性休克

正确答案：CB

解析：过量服用苦杏仁，可发生中毒，表现为眩晕，突然晕倒、心悸、头疼、恶心呕吐、惊厥、昏迷、紫绀、瞳孔散大、对光反应消失、脉搏弱慢、呼吸急促或缓慢而不规则。若不及时抢救，可因呼吸衰竭而死亡。

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，选错，少选不得分）

111. 依据五行相克规律确定的治法有

- A. 培土抑水法
- B. 滋水涵木法
- C. 泻南补北法
- D. 佐金平木法
- E. 抑木扶土法

正确答案：ACDE

解析：滋水涵木法根据相生规律。

112. 培养正气，提高抗病能力的方法有

- A. 精神调养
- B. 早期诊治
- C. 锻炼身体
- D. 控制传变
- E. 人工免疫

正确答案：ACE

解析：早期诊治、控制传变均为疾病状态下。

113. 根据中医理论，属于反治法的有

- A. 寒因寒用
- B. 寒者热之
- C. 通因通用
- D. 热者寒之

医时代——贴身医药考试培训专家

E. 热因热用

正确答案：ACE

解析：寒者热之、热者寒之均属正治。

114. 治疗阳痿肾阳不足证，可选用的中成药有

- A. 六味地黄丸
- B. 附子理中丸
- C. 济生肾气丸
- D. 人参归脾丸
- E. 桂附地黄丸

正确答案：CE

解析：济生肾气丸、桂附地黄丸均培补肾阳。

115. 执业药师在咨询服务和用药指导过程中，需特别提示的情景有

- A. 首次使用的药品
- B. 多种药物合并应用
- C. 使用含有毒成分的药品
- D. 处方用法与说明书不一致
- E. 使用需特殊贮存的药品

正确答案：ABCDE

解析：识记内容。

116. 关于罂粟壳使用管理要求的规定，下列正确的有，

- A. 处方需有麻醉药专用处方权的执业医师签名
- B. 须使用麻醉药专用处方可调配
- C. 成人一次正常用量为每天 3-6g
- D. 每张处方不得超过 7 日用量
- E. 需与群药一起调配

正确答案：ABCDE

解析：识记内容。

117. 不合理用药的后果

- A. 浪费医药资源
- B. 引发药源性疾病
- C. 延误疾病治疗
- D. 引发药物不良反应
- E. 造成医疗纠纷

正确答案：ABCDE

解析：识记内容。

118. 氨茶碱合用会发生酸碱中和反应而降低或失去药效的中药有

- A. 乌梅
- B. 木瓜
- C. 山楂
- D. 麻黄
- E. 女贞子

正确答案：ABCE

解析：氨茶碱不宜与麻黄碱合用。

119. 临床使用不当可引起肝损伤的动物类中药有

- A. 海螵蛸
- B. 蜈蚣
- C. 鸡内金
- D. 斑蝥
- E. 穿山甲

正确答案：BD

解析：蜈蚣、斑蝥均毒性剧烈，可引起肝损伤。

120. 临床使用双黄连注射剂应特别监护的严重不良反应有

- A. 过敏性休克
- B. 血管神经性水肿
- C. 剥脱性皮炎
- D. 重症多形性红斑
- E. 支气管痉挛

正确答案：ABCDE

解析：双黄连注射剂严重不良反应/事件以全身性损害、呼吸系统损害为主。各系统不良反应/事件表现如下：全身性损害主要表现为过敏性休克、过敏样反应、高热、寒战等，其中过敏性休克占严重病例报告总数的36%，多数患者治愈，少数患者抢救无效死亡；呼吸系统损害主要表现为呼吸困难、呼吸急促、喉水肿、支气管痉挛等；皮肤及其附件损害表现为发疹型药疹、血管神经性水肿、剥脱性皮炎、重症多形性红斑等；其他损害包括肝功能损害、血尿、肾功能损害、过敏性紫癜、血压下降、视觉异常、听觉异常、抽搐、惊厥、昏迷等。