

准考证号

姓名

《护理专业知识》 密卷



扫码领密卷

华图医疗事业单位考试研究院 审定

一、判断题：下列各题对的请在机读答题卡“A”个涂黑，错的请在机读答题卡“B”个涂黑。（每小题 0.5 分，10 题共 5 分）

1. 医学观察期间，密切接触者如果出现急性发热或呼吸道症状，应立即送就进医院进行隔离。
2. 高热惊厥是小儿惊厥最常见的原因，多由上呼吸道感染引起。
3. 由于胆汁中含有脂肪酶，故胆汁促进脂肪的消化和吸收
4. 甲状旁腺分泌的降钙素，有使血钙降低的作用。
5. 炎症时白细胞的渗出与血管通透性增加有关。
6. 变态反应又称过敏反应或超敏反应，其发生与药物的用药剂量无关，不易预知。
7. 药物作用的双重性是指某药物既有局部作用，又有全身作用。
8. 构成 RNA 的基本单位是脱氧腺苷酸。
9. 核酸是具有传递遗传信息功能的生物大分子。
10. 给患者服用洋地黄类药物前，护士应先测量脉搏。

二、单项选择题：下列各题都只有一个正确答案，请从备选答案中选出，并在季度答题卡上涂黑相应字母格。（每小题 1 分，80 题共 80 分）

11. 在胃镜消毒时，宜选择的化学消毒方式是
 - A. 75%乙醇擦拭
 - B. 2%戊二醛浸泡
 - C. 3%氧化氢浸泡
 - D. 0.2%过氧乙酸熏蒸
12. 肝硬化腹水成年病人应低盐饮食，要求每日进食盐不超过
 - A. 1g
 - B. 2g
 - C. 3g
 - D. 4g
13. 不宜淋浴的患者是

- A. 妊娠 7 个月以上的孕妇
 - B. 严重心脏病患者
 - C. 糖尿病患者
 - D. 甲亢待手术患者
14. 充血性心力衰竭和水钠潴留病人灌汤时禁用
- A. 肥皂水
 - B. 生理盐水
 - C. 温开水
 - D. 1. 2. 3 溶液
15. 输液引起肺水肿的典型症状是
- A. 发绀、胸闷
 - B. 心悸、烦躁不安
 - C. 胸痛、咳嗽
 - D. 呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰
16. 脑水肿患者静脉滴注 20% 甘露醇 250ml，要求 25 分钟内滴完，输液速度应为
- A. 100 滴/分
 - B. 120 滴/分
 - C. 150 滴/分
 - D. 180 滴/分
17. 有关尿培养标本采集正确的是.
- A. 留取首段尿送检
 - B. 标本在 1 小时内送检
 - C. 用消毒剂清洗外阴部
 - D. 宜在抗生素应用后收集标本
18. 为了准确观察病人的血压，测量时应该做到四定即
- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
 - B. 定时间、定部位、定体位、定记录格式

- C. 定时间、定体位、定部位、定袖带
D. 定时间、定部位、定血压计、定人员
19. 测量脉搏的首选部位是
- A. 颞动脉
B. 桡动脉
C. 肱动脉
D. 足背动脉
20. 某患者今晨踝关节扭伤，局部青紫，为防止皮下出血与肿胀，早期应选用
- A. 局部按摩
B. 红外线照射
C. 冷湿敷
D. 热湿敷
21. 2005 版心肺复苏指南指出成人心肺复苏术人工呼吸与胸外心脏按压比例为
- A. 2: 30
B. 2: 15
C. 1: 5
D. 1: 10
22. 慢性支气管炎的临床特征是
- A. 咳嗽、咳痰、喘息
B. 咳嗽、咳大量脓臭痰、喘息
C. 咳嗽、咳痰、呼吸困难
D. 咳嗽、咯血、喘息
23. 诊断 II 型呼吸衰竭的血气分析标准为
- A. $PaO_2 < 6.7kPa$, $PaCO_2 > 5.3kPa$ 。
B. $PaO_2 < 8.0kPa$, $PaCO_2 > 6.7kPa$ 。
C. $PaO_2 < 6.7kPa$, $PaCO_2 > 8.0kPa$ 。
D. $PaO_2 < 8.0kPa$, $PaCO_2 > 9.3kPa$ 。
24. 支气管扩张最常见的原因是.
- A. 肺部肿瘤压迫

- B. 肺囊性纤维化
 - C. 继发性肺结核
 - D. 呼吸系统感染
25. 高血压诊断标准为
- A. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
 - B. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$
 - C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
 - D. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$
26. 心绞痛发作时典型的表现
- A. 发作性胸痛
 - B. 胸闷
 - C. 憋气
 - D. 恶心
27. 我国引起肝硬化最常见的原因是
- A. 酒精中毒
 - B. 病毒性肝炎
 - C. 营养失调
 - D. 血吸虫病
28. 胃溃疡患者上腹部疼痛典型节律是
- A. 疼痛-进食-疼痛
 - B. 进食-疼痛-缓解
 - C. 缓解-疼痛-进食
 - D. 进食-缓解-疼痛
29. 注射过量胰岛素常可引起
- A. 胰岛素瘤
 - B. 高血糖
 - C. 低血糖反应
 - D. 酮症酸中毒

30. 类风湿性关节炎的关节症状，具有特征性的是

- A. 肿胀明显
- B. 局部发热
- C. 晨起僵硬
- D. 疼痛明显

31. 系统性红斑狼疮患者面部皮损的典型特点是

- A. 盘状红斑
- B. 网状红斑
- C. 蝶形红斑
- D. 环形红斑

32. 属于甲类传染病的是

- A. 肺结核
- B. 百日咳
- C. 登革热
- D. 霍乱

33. 细胞外液的主要阳离子是

- A. Na^+
- B. K^+
- C. Ca^{2+}
- D. Mg^{2+}

34. 抢救青霉素过敏休克关键措施

- A. 立刻通知医生
- B. 立即皮下注射盐酸肾上腺素 0.5~1ml
- C. 针刺人中、内关等部位
- D. 立即停药，平卧，保暖

35. 全身麻醉患者清醒前最危险的意外及并发症是

- A. 呕吐物窒息
- B. 体温过低
- C. 意外损伤

- D. 引流管脱落
36. 患者女，38岁，突发上腹剧痛2小时。查体：板状腹，全腹压痛，反跳痛，左上腹明显。在患者诊断未明确前，处理错误的是
- A. 禁食，行胃肠减压
 - B. 吗啡类止痛药
 - C. 营养支持
 - D. 静脉补液
37. 引起婴儿腹泻最常见的病原体是
- A. 腺病毒
 - B. 柯萨奇病毒
 - C. 轮状病毒
 - D. 金黄色葡萄球菌
38. 前置胎盘主要症状
- A. 休克
 - B. 无痛性反复出血
 - C. 血压下降
 - D. 血细胞上升
39. 异位妊娠常发生的部位是
- A. 腹腔
 - B. 卵巢
 - C. 直肠子宫凹陷
 - D. 输卵管
40. 胎盘早剥的处理原则是
- A. 减轻腹痛
 - B. 期待疗法，等待自然分娩
 - C. 减少出血
 - D. 纠正休克，及时终止妊娠
41. 平卧用力向下屏气时子宫颈脱出阴道口，但宫体仍在阴道内，应属于

- A. 子宫脱垂 I 度轻型
 - B. 子宫脱垂 I 度重型
 - C. 子宫脱垂 II 度轻型
 - D. 子宫脱垂 II 度重型
42. 右向左分流型先心病早期最突出的症状是
- A. 晕厥
 - B. 青紫
 - C. 蹲踞
 - D. 气促
43. 下列疾病中，属于右向左分流型先心病的是。
- A. 法洛四联症（TOF）
 - B. 房间隔缺损（ASD）
 - C. 室间隔缺损（VSD）
 - D. 动脉导管未闭（PDA）
44. 法洛四联症是由以下哪四个畸形联合组成
- A. 肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨（右移）、右心室肥大
 - B. 主动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨（右移）、左心室肥大
 - C. 肺动脉狭窄、房间隔缺损、主动脉骑跨（右移）、右心室肥大
 - D. 肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨（右移）、左心室肥大
45. 张力性气胸时首要的急救处理措施是
- A. 气管插管辅助呼吸
 - B. 输血、补液
 - C. 立即排气，降低胸腔内压力
 - D. 吸氧
46. 儿童营养性缺铁性贫血的主要原因是
- A. 生长发育快
 - B. 铁摄入量不足
 - C. 铁吸收障碍
 - D. 铁丢失过多

47. 关于女性外生殖器的组成，正确的一项是
- A. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭
 - B. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、尿道口
 - C. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭
 - D. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭、尿道口
48. 对腹部闭合性损伤病人的病情观察，哪项不重要
- A. 血压
 - B. 尿量
 - C. 中心静脉压
 - D. 肢体活动度
49. PICC 置管后第一次换药时间
- A. 第一个 24 小时
 - B. 3 天
 - C. 5 天
 - D. 7 天
50. 婴儿腹泻重度脱水时首选
- A. 11.2% 乳酸钠
 - B. 生理盐水
 - C. 2:1 等渗液
 - D. 1.4% 碳酸氢钠
51. 下列哪项不属于给药原则
- A. 根据医嘱给药
 - B. 严格执行查对制度
 - C. 正确掌握给药的剂量
 - D. 给药后观察病情变化
52. 热疗法的局部生理效应下列哪项不是
- A. 血流加快
 - B. 血管扩张

- C. 需氧量增加
 - D. 肌紧张增强
53. 指导添加辅食和断奶见于
- A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 新生儿期
54. 服用洋地黄类药物后重点观察
- A. 是否中毒
 - B. 过敏反应
 - C. 是否成瘾
 - D. 药物副作用
55. 静脉注射时应在穿刺点上方何处止血
- A. 10cm
 - B. 8cm
 - C. 6cm
 - D. 4cm
56. 下列防治术后肺不张的措施中错误的是
- A. 术前锻炼深呼吸
 - B. 及时用镇咳药
 - C. 控制上呼吸道的急性感染
 - D. 避免包扎过紧限制呼吸运动
57. 某病人在输血后出现皮肤瘙痒、荨麻疹及眼睑、口唇水肿应考虑
- A. 溶血反应
 - B. 发热反应
 - C. 过敏反应
 - D. 枸橼钠中毒反应
58. 骑跨伤常造成泌尿系统的损伤部位是：
- A. 胯部

- B. 尿道膜部
 - C. 尿道球部
 - D. 膀胱颈部
59. 产后血性恶露一般持续:
- A. 1~2 天
 - B. 3~4 天
 - C. 5~6 天
 - D. 7~8 天
60. 异位妊娠最常见的着床部位是:
- A. 卵巢
 - B. 输卵管
 - C. 子宫颈
 - D. 腹腔
61. 下列哪项是第一级预防?
- A. 癌肿普查
 - B. 乳房肿块自我检查
 - C. 骨牵引病人预防褥疮
 - D. 创伤病人注射 TAT
62. 手术人员洗手中错误的做法是:
- A. 从手指顺序洗刷至肘上 10 厘米处
 - B. 3 分钟洗刷为 1 遍
 - C. 刷洗 3 遍
 - D. 冲水时, 使水从肘部流向指尖
63. 对粘膜及会阴部的消毒, 下列哪项是禁用的?
- A. 2.5%碘酊
 - B. 70%乙醇
 - C. 0.1%新洁而灭溶液
 - D. 0.5%洗必泰溶液

64. 对一手术后常规禁食的成年病人无其他体液平衡失调，每日静脉输液总量估计为：

- A. 1500ml
- B. 2500ml
- C. 3500ml
- D. 4000ml

65. 体液总量平均占体重的：

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

66. 患者，女，反复发生皮肤黏膜淤血入院，诊断为特发性血小板减少性紫癜，护士发现患者出现呕吐、呼吸不规则、昏迷，此时考虑患者出现了

- A. 消化道出血
- B. 呼吸抑制
- C. 颅内出血
- D. 大动脉破裂

67. 护士配合医生进行心包穿刺操作时，正确的是

- A. 术前嘱患者禁食 2~3 小时
- B. 术前准备阿托品
- C. 第一次抽液 350ml 以上
- D. 抽液中禁止夹闭胶管

68. 急腹症在未明确诊断时，可对没有休克的患者采取的措施是

- A. 给予流质饮食
- B. 给予镇痛药
- C. 实施胃肠减压
- D. 便秘者行低压灌肠

69. 骨折与脱位共有的特征性表现是

- A. 疼痛
 - B. 肿胀
 - C. 畸形
 - D. 异常活动
70. 敌百虫中毒患者洗胃禁用
- A. 生理盐水
 - B. 清水
 - C. 高锰酸钾
 - D. 碳酸氢钠溶液
71. 护士在给患者做口腔护理，发现其口腔黏膜充血糜烂，有假膜，应给予哪一种溶液漱口
- A. 氯化钠溶液
 - B. 朵贝尔液
 - C. 7.3%硼酸溶液
 - D. 碳酸氢钠
72. 扩张型心肌病的主要体征是
- A. 听诊心脏杂音
 - B. 叩诊心界扩大
 - C. 咳粉红色泡沫痰
 - D. 心率增快
73. 慢性左心功能不全患者最主要的临床表现是
- A. 咳嗽
 - B. 心悸
 - C. 下肢水肿
 - D. 呼吸困难
74. 患者，男，40岁，因脑外伤住院。1天后患者出现脑疝征兆，立即输入20%甘露醇治疗，其目的是
- A. 降低血压

- B. 升高血压
 - C. 降低颅内压
 - D. 升高颅内压
75. 某新生儿出生 6 小时，进行预防接种。接种卡介苗的正确方法是
- A. 前臂掌侧下段 ID
 - B. 三角肌下缘 ID
 - C. 三角肌下缘 H
 - D. 上臂三角肌 H
76. 在护理实践中，护士有权拒绝执行医嘱的情形是
- A. 护理程序太繁琐
 - B. 医嘱中需要监测的生理指标太多
 - C. 需要额外的劳动和支出
 - D. 医嘱有错误
77. 护士在工作中患血源性传染病的最常见的原因是
- A. 针刺伤
 - B. 侵袭性操作
 - C. 接触被污染体液
 - D. 为污染伤口换药
78. 水痘皮肤病变的病理特征是
- A. 仅限黏膜
 - B. 仅限表皮
 - C. 仅限真皮
 - D. 可侵及皮下组织
79. 对于需要静脉输液的成年人，使用头皮针进行静脉穿刺时，优先选择的血管是
- A. 贵要静脉
 - B. 头静脉
 - C. 桡静脉
 - D. 手背静脉网

80. 尿常规检查时，留取尿标本的时间是
- A. 饭前半小时
 - B. 全天尿液
 - C. 早晨第一次尿
 - D. 有时收集尿液
81. 患者，男，38岁，进行乙状结肠镜检查，应采取的体位是
- A. 头低足高位
 - B. 头高足低位
 - C. 俯卧位
 - D. 膝胸卧位
82. 患者，女，32岁，因剖宫产后卧床多日造成长发打结且黏结成团，护士欲帮其湿润疏通头发宜选用
- A. 清水
 - B. 油剂
 - C. 百部酊
 - D. 30%乙醇
83. 患儿，男，2岁，发热1天，体温39℃，伴有轻咳来诊。既往有癫痫病史。门诊就诊过程中突然发生惊厥，即刻给予输氧、镇静，此刻首选药物是
- A. 苯巴比妥肌注
 - B. 地西洋静注
 - C. 水合氯醛灌肠
 - D. 氯丙嗪肌注
84. 患者，女，64岁，患有多种慢性病，同时服用下列几种药物，宜饭前服用的药物是
- A. 红霉素
 - B. 布洛芬
 - C. 健胃消食片
 - D. 氨茶碱

E. 阿司匹林

85. 无菌包打开后，未用完的无菌物品，按原折痕包扎好，注明开包日期及时间，其有效期为

- A. 4h
- B. 8h
- C. 12h
- D. 24h

86. 患儿，2岁，诊断为动脉导管未闭。对该患儿做健康指导时，不妥的是

- A. 建立合理的生活制度
- B. 充分运动，增强体质
- C. 合理营养，促进生长
- D. 预防呼吸道感染

87. 地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是

- A. 扩张冠状动脉
- B. 增强心肌收缩力
- C. 减轻心脏前负荷
- D. 减少心律失常的发生

88. 患者，男，59岁，冠心病，心绞痛5年。3小时前发生心前区剧烈疼痛，服用硝酸甘油3片未缓解，急诊入院。心电图检查发现ST段弓背上抬，随后相应导联出现病理性Q波，血压85/55mmHg，心率108次/分，律齐。入监护室观察治疗，经用药后疼痛缓解。7小时后心电监测示血压70/50mmHg，心率118次/分，患者烦躁不安，皮肤湿冷，此时最可能发生了

- A. 脑出血
- B. 室壁瘤破裂
- C. 心源性休克
- D. 心律失常

89. 肾上腺素用于治疗心脏骤停，其主要的药理作用是

- A. 增加心肌收缩力
- B. 扩张外周血管

- C. 减慢心率
- D. 抗心律失常

90. 长期服用利尿剂（呋塞米）的心衰患者，护士应当关注的不良反应是

- A. 低血压
- B. 低血钾
- C. 低血钠
- D. 脱水

三、多项选择题：下列各题都有两个或两个以上正确答案，请从备选答案中选出，并在季度答题卡上涂黑相应字母格。（每小题 1.5 分，10 题共 15 分）

91. 患有心脏病的孕妇，最危险的时期是

- A. 孕 24~28 周
- B. 孕 32~34 周
- C. 分娩期
- D. 产褥期最初 3 天

92. 大量出血时，血容量已补足的指征有

- A. 肛温与皮温回升
- B. 尿量 $>20\text{ml/h}$
- C. 中心静脉压恢复正常
- D. 脉搏由快、转为正常有力

93. 有机磷农药中毒特效解毒药物是

- A. 肾上腺素
- B. 亚甲蓝
- C. 阿托品
- D. 解磷定

94. 颅内压增高病人，应禁忌

- A. 剧烈咳嗽
- B. 用力排便

- C. 腰椎穿刺
 - D. 高压灌肠
95. 关于静脉补钾下列哪些正确
- A. 见尿补钾，尿量达 10ml/h，方可补钾
 - B. 浓度适宜，应不超过 0.3%
 - C. 控制滴速，每分钟 60 滴以下
 - D. 限制总量，严重缺钾时，一般每日不超过 3~6g
96. 以下病需要限制蛋白饮食的是
- A. 糖尿病
 - B. 尿毒症
 - C. 肾病综合征
 - D. 肝昏迷
 - E. 急性肾盂肾炎
97. 青霉素过敏试验阳性患者应将结果醒目地注明有
- A. 医嘱单
 - B. 注射单
 - C. 床头卡
 - D. 体温单
98. 急性白血病常见致死原因是
- A. 严重贫血
 - B. 感染
 - C. 化疗毒性反应
 - D. 内脏出血
99. 糖尿病人足部护理包括
- A. 不穿太紧的袜子
 - B. 软底宽头鞋
 - C. 每晚温水洗脚趾间干燥
 - D. 处理鸡眼、甲沟炎
100. 类风湿关节炎本身的特点

- A. 慢性进展
- B. 四肢小关节炎
- C. 多发对称复发
- D. 活动受限

※※※全部测试到此结束※※※

下一页是解析

解析

一、判断题：下列各题对的请在机读答题卡“A”个涂黑，错的请在机读答题卡“B”个涂黑。（每小题 0.5 分，10 题共 5 分）

1. 【答案】A

【解析】略

2. 【答案】A

【解析】高热惊厥是小儿惊厥最常见的病因。

3. 【答案】B

【解析】胆汁是一种消化液，有乳化脂肪的作用，但不含消化酶。

4. 【答案】B

【解析】甲状旁腺分泌的是甲状旁腺激素

5. 【答案】B

【解析】炎症时，引起白细胞渗出最重要的因素是炎症介质起作用。

6. 【答案】A

【解析】超敏反应又称过敏反应或变态反应,是指已被致敏的机体对某些药物产生的一种病理性的免疫应答。超敏反应的发生与用药剂量无关,不易预知。

7. 【答案】B

【解析】药物的作用具有两重性,既对患者有利的防治作用,又有对患者不利的不良反应,处理好二者的关系是药物治疗的关键。

8. 【答案】A

【解析】构成 RNA 的基本单位是核糖核苷酸分子。

9. 【答案】A

【解析】核酸由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一.具有非常重要的生物功能,主要是贮存遗传信息和传递遗传信息。

10. 【答案】A

【解析】给患者服用洋地黄类药物前,护士应先测量脉搏。

二、单项选择题：下列各题都只有一个正确答案，请从备选答案中选出，并在季度答题卡上涂黑相应字母格。（每小题 1 分，80 题共 80 分）

11. 【答案】B

【解析】2%戊二醛浸泡用于精密仪器的消毒,如各种内镜。

12. 【答案】B

【解析】有腹水时应给予低盐饮食,限制进水量。进水量限制在 1000ml / d 左右,盐限制在 1~2g/d。

13. 【答案】B

【解析】淋浴适用于有自理能力而且病情较轻的患者。

14. 【答案】B

【解析】充血性心力衰竭和水钠潴留的病人，禁用生理盐水灌肠，以减少钠的吸收。

15. 【答案】D

【解析】急性肺水肿的典型临床表现为：呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰

16. 【答案】C

【解析】点滴系数 15，输液时间=（输液总量×点滴系数）/（每分钟滴数×60）

17. 【答案】B

【解析】尿标本采集宜选取中段尿；标本尽快送检，尿标本放置时间不能超过 1 小时；留取尿标本前 5 天停止使用抗生素；多饮水易导致尿液稀释细菌，引起化验不准。

18. 【答案】A

【解析】测血压四定：定时间、定部位、定体位、定血压计。

19. 【答案】B

【解析】浅表、靠近骨骼的大动脉均可作为测量脉搏的部位，临床上最常选择的诊脉位置是桡动脉。

20. 【答案】C

【解析】软组织损伤早期 12 小时内冷敷（人卫版、第五版）。

21. 【答案】A

【解析】人工呼吸与胸外心脏按压比例为 2: 30

22. 【答案】A

【解析】慢性支气管炎起病缓，以咳嗽、咳痰、喘息为主要症状。在冬春季加剧。痰量以夜间或清晨体位变动时，较多。

23. 【答案】B

【解析】单纯 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ (8kpa) 为 I 型呼吸衰竭； $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 并伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ (6.67kpa)，则为 II 型呼吸衰竭。(1mmHg=0.133kPa)

24. 【答案】D

【解析】支气管扩张症的主要原因是支气管-肺组织感染。反复感染使支气管粘膜充血、水肿，破坏管壁的各层结构，削弱管壁的支撑作用。

25. 【答案】C

【解析】高血压的诊断标准为收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。

26. 【答案】A

【解析】典型的发作性胸痛。

27. 【答案】B

【解析】我国肝硬化的最主要原因是病毒性肝炎，尤其是乙肝。

28. 【答案】B

【解析】胃溃疡疼痛节律为进食-疼痛-缓解；十二指肠溃疡疼痛节律为疼痛-进食-缓解。

29. 【答案】C

【解析】胰岛素注射过量可引起低血糖反应。

30. 【答案】C

【解析】95%以上的类风湿性关节炎的患者都有晨僵。

31. 【答案】C

【解析】系统性红斑狼疮的典型皮损为鼻梁和双颧颊部呈蝶形分部的红斑。

32. 【答案】D

【解析】甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。

33. 【答案】A

【解析】细胞内液主要阳离子为 K^+ 和 Mg^{2+} ，细胞外液的阳离子主要为 Na^+ 。

34. 【答案】B

【解析】青霉素过敏性休克的抢救关键位：立即皮下注射盐酸肾上腺素 0.5 ~ 1ml。

35. 【答案】A

【解析】全麻患者清醒前最危险的并发症为呕吐物窒息。

36. 【答案】B

【解析】急腹症未明确诊断前禁止用吗啡等止痛药，以免掩盖病情。

37. 【答案】C

【解析】寒冷季节的婴幼儿腹泻 80%由病毒感染引起，尤其以轮状病毒感染多见，是婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原体，因此小儿腹泻通常又称为“秋季腹泻”。

38. 【答案】B

【解析】妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血是前置胎盘的主要症状。

39. 【答案】D

【解析】在异位妊娠中，输卵管妊娠最为常见，以壶腹部妊娠多见，其次是峡部。

40. 【答案】D

【解析】纠正休克、及时终止妊娠是处理胎盘早剥的处理原则。

41. 【答案】C

【解析】

I 度

轻型：宫颈外口距离处女膜 $<4\text{cm}$ ，但未达处女膜缘；

重型：宫颈外口已达处女膜缘，检查时在阴道口可见到宫颈。

II 度

轻型：宫颈已脱出阴道外口，但宫体仍在阴道内；

重型：宫颈及部分宫体已脱出阴道口外。

III 度：宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

42. 【答案】B

【解析】由于畸形的存在，致右心压力增高并超过左心而血液从右向左分流；或大动脉起源异常时，导致大量回心静脉血进入体循环，引起全身持续性青紫。

43. 【答案】A

【解析】动脉导管未闭时主动脉血液分流至压力较低的肺动脉内，及左向右分流，当肺动脉压力等于或超过主动脉时左向右分流消失，甚至逆转为右向左分流，病人出现发绀。房间隔缺损时左心房压力高于右心房左向右分流，右心负荷增加，肺动脉压力上升导致肺动脉高压，右心房压力增高发生右向左逆流，室间

隔缺损原理同上。法洛四联症肺动脉狭窄右心压力上升超过左心血液经室间隔缺损发生右向左分流。

44. 【答案】A

【解析】法洛四联症是一种常见的先天性心脏畸形。其基本病理为室间隔缺损、肺动脉狭窄、主动脉骑跨和右心室肥厚。

45. 【答案】C

【解析】张力性气胸的处理要迅速排气减压,在患侧锁骨中线与第二肋间连线处,用粗针头穿刺胸膜腔排气减压,并外接单向活瓣装置。紧急状态下可在针柄部外接柔软小口塑料瓶、气球等,使胸腔内气体易于排出,外界气体不能进入胸腔。

46. 【答案】B

【解析】铁的摄入不足是导致患儿缺铁性贫血最主要的原因。

47. 【答案】A

【解析】女性外生殖器组成:阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭

48. 【答案】D

【解析】血压、尿量和中心静脉压都是观察腹部闭合性损伤病人病情观察的重点项目。

49. 【答案】A

【解析】PICC 置管后第一次换药时间为置管后第一个 24 小时。

50. 【答案】C

【解析】重度脱水补液 150~180ml/kg。溶液选择原则为先盐后糖、先浓后

淡。扩容阶段：对重度脱水伴低血容量休克的患儿，用 2:1 等张含钠液(2 份生理盐水加 1 份 1.4% 碳酸氢钠)20ml/kg，总量不超过 3000ml，于 30~60 分钟内静脉推注或快速静滴，以迅速增加血容量，改善循环和肾脏功能。以补充累积损失为主的阶段：取总量的 1/2(相当于累积损失量)，扣除扩容液量，于 8~12 小时内静滴，一般为每小时 8~10ml/kg。中度或中度以上脱水无低血容量休克者，可直接从本阶段开始补液。维持补液阶段：脱水已基本纠正，主要补充继续丢失量与生理需要量。剩余液即总量的另 1/2，根据情况继续于 12~16 小时滴完，一般约每小时 5ml/kg。

51. 【答案】C

【解析】根据最新版《护理学基础》给药原则，包括根据医嘱准确给药、严格执行查对制度、安全正确用药、密切观察用药反应。根据题干所给出的四个选项，只有 C 选项表达不够严谨。

52. 【答案】D

【解析】热疗法的生理效应可使局部血管扩张，血流速度加快，局部需氧量增加，但不会使肌紧张增强。

53. 【答案】A

【解析】出生后到 1 周岁为婴儿期，此期为儿童生长发育最迅速的时期。

54. 【答案】A

【解析】洋地黄治疗剂量和中毒剂量很接近，所以要密切观察有无出现中毒反应，尤其是各种室性心律失常。

55. 【答案】C

【解析】静脉注射在穿刺部位上方(近心端)约 6cm 处扎紧止血带。

56. 【答案】B

【解析】使用镇咳药会抑制咳嗽，患者痰液不宜咳出，易导致肺不张。

57. 【答案】C

【解析】过敏反应大多发生在输血后期或即将结束输血时，其程度轻重不一，通常与症状出现的早晚有关。症状出现越早，反应越严重。轻度反应：输血后出现皮肤瘙痒，局部或全身出现荨麻疹。中毒反应：出现血管神经性水肿，多见于颜面部，表现为眼睑、口唇高度水肿也可发生喉头水肿，表现为呼吸困难，两肺可闻及哮鸣音。重度反应：发生过敏性休克。

58. 【答案】C

【解析】前尿道即海绵体尿道，尤以球部损伤较多，主要为骑跨伤所致。

59. 【答案】B

【解析】血性恶露约持续 3~4 天。

60. 【答案】B

【解析】异位妊娠最常见的着床部位是输卵管。

61. 【答案】C

【解析】一级预防亦称为病因预防，是在疾病（或伤害）尚未发生时针对病因或危险因素采取措施，降低有害暴露的水平，增强个体对抗有害暴露的能力预防疾病（或伤害）的发生或至少推迟疾病的发生。第一级预防应该是消灭或消除疾病（或伤害）的根本措施。

62. 【答案】D

【解析】手术人员洗手冲水时，使水从指尖流向肘部。

63. 【答案】A

【解析】粘膜及会阴部的消毒禁用 2.5%碘酊。

64. 【答案】B

【解析】每日静脉输液总量估计为 2500ml。

65. 【答案】C

【解析】体液总量平均占体重 60%。

66. 【答案】C

【解析】特发性血小板减少性紫癜有出血倾向，该患者出现呕吐、呼吸不规则、昏迷，应警惕颅内出血的发生。

67. 【答案】B

【解析】术前备静脉用阿托品，以备术中发生迷走反射时使用；一般第 1 次抽液量不宜超过 100ml；抽液过程中随时夹闭胶管；间断每天心包抽液量 < 25ml 时拔除导管。

68. 【答案】C

【解析】急腹症在未明确诊断时应做到“四禁”，即禁饮食、禁灌肠、禁用泻剂、禁用强效镇痛剂，对没有休克的患者可按需要实施胃肠减压。

69. 【答案】C

【解析】骨折的专有体征是畸形、异常活动、骨擦音或骨擦感；关节脱位的专有体征是畸形、弹性固定、关节盂空虚。两者共有的特征表现是畸形。

70. 【答案】D

【解析】敌百虫中毒患者禁用碳酸氢钠溶液洗胃，因为敌百虫属于有机磷制剂，如果与碱性药物或碱性物质相遇，会增强毒性。

71. 【答案】D

【解析】根据患者口腔黏膜表现，应为真菌感染，应选择1%~4%碳酸氢钠溶液漱口。

72. 【答案】B

【解析】叩诊心界扩大是扩张型心肌病的主要体征。

73. 【答案】D

【解析】慢性左心功能不全主要表现为肺循环淤血和心排血量降低，最主要的症状是程度不同的呼吸困难。

74. 【答案】C

【解析】患者有脑疝先兆，遵医嘱输入20%甘露醇，应在15~30分钟内滴完，可降低颅内压。

75. 【答案】B

【解析】出生3个月以内的婴儿及用5IU PPD或5IU稀释旧结核菌素试验阴性的儿童(PPD或结核菌素试验阴性后48~72小时，局部硬结在5mm以下者为阴性)，三角肌下缘皮内注射接种以预防结核病。

76. 【答案】D

【解析】医嘱有错误时，护士有权拒绝执行医嘱。

77. 【答案】A

【解析】导致护士职业暴露的主要原因是污染的针头刺伤或其他锐器伤。

78. 【答案】B

【解析】水痘水疱是由于皮肤棘细胞肿胀变性所致，仅限表皮，同时还有核

内嗜酸性包涵体的多核巨细胞形成，肿胀细胞或多核巨细胞裂解及组织液渗入后，即形成疱疹。

79. 【答案】D

【解析】成人静脉输液首选手背静脉网，小儿首选头皮静脉穿刺。

80. 【答案】C

【解析】尿常规检查时，留取尿标本的时间是早晨第一次尿。

81. 【答案】D

【解析】乙状结肠镜检查应采取膝胸卧位，此卧位视线清楚，便于操作及检查。

82. 【答案】D

【解析】乙醇是一种很好的溶剂，能溶解油脂，临床上使用 30% 乙醇湿润疏通打结处。

83. 【答案】B

【解析】高热惊厥患儿控制症状，首选地西洋静注。

84. 【答案】C

【解析】健胃消食片可健胃消食，用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食、暖腐酸臭、脘腹胀满、消化不良见上述证候者。该药应饭前服用。

85. 【答案】D

【解析】无菌包打开后，未用完的无菌物品，按原折痕包扎好，注明开包日期及时间，其有效期为 24 小时。

86. 【答案】B

【解析】动脉导管未闭患儿的健康指导：应为患儿安排合理的生活制度，既要增强锻炼、提高机体的抵抗力，又要适当休息，避免劳累过度。

87. 【答案】B

【解析】地高辛具有正性肌力作用：该品选择性地与心肌细胞膜 $\text{Na}^+ \text{K}^+$ ATP酶结合而抑制该酶活性，使心肌细胞膜内外 $\text{Na}^+ \text{K}^+$ 主动耦联转运受损，心肌细胞内 Na^+ 浓度升高，从而使肌膜上 $\text{Na}^+ \text{Ca}^{2+}$ 交换趋于活跃，使细胞浆内 Ca^{2+} 增多，肌浆网内 Ca^{2+} 储量亦增多，心肌兴奋时，有较多的 Ca^{2+} 释放；心肌细胞内 Ca^{2+} 浓度增高，激动心肌收缩蛋白从而增加心肌收缩力，是治疗心力衰竭的主要药理作用机制。

88. 【答案】C

【解析】根据患者心电图表现应是出现了急性心肌梗死。7小时后心电监测示血压 70/50mmHg，心率 118 次/分，患者烦躁不安，皮肤湿冷，考虑是由于心脏功能极度减退，导致心输出量显著减少并引起严重的急性周围循环衰竭，导致心源性休克。

89. 【答案】A

【解析】肾上腺素具有正性肌力作用，作用于心脏 β_1 受体，使心肌收缩力增强，心脏每搏输出量增加。同时对心脏还有正性频率和正性传导作用，使心输出量增加。可用于溺水、麻醉和手术意外、药物中毒、传染病和心脏传到阻滞等所致的心脏骤停。

90. 【答案】B

【解析】呋塞米作用于髓祥的升支，在排钠的同时也排钾，低血钾是其主要的副作用。

三、多项选择题：下列各题都有两个或两个以上正确答案，请从备选答案中选

出，并在季度答题卡上涂黑相应字母格。（每小题 1.5 分，10 题共 15 分）

91. 【答案】BCD

【解析】妊娠 32~34 周. 分娩期及产后的最初 3 天内，是患有心脏病的孕妇最危险的时期。

92. 【答案】ACD

【解析】血容量已补足的指征：四肢末端由湿冷、青紫转为温暖、红润；脉搏由快、弱转为正常、有力；收缩压接近正常，脉压差大于 4kPA. (30mmHg) 肛温与皮温差从大于 3℃ 转为小于 1℃；尿量大于 30mL/h；；中心静脉压恢复正常 (5cmH₂O ~13cmH₂O)。

93. 【答案】CD

【解析】有机磷中毒的特效解毒药是阿托品和解磷定。

94. 【答案】ABCD

【解析】颅内压增高病人应避免剧烈咳嗽、便秘、提重物等，防止颅内压骤然升高而诱发脑疝；润肠、保持大便通畅，避免用力排便及高位灌肠以防颅内压骤然增高；慎重做腰穿，以免引起脑疝。

95. 【答案】BC

【解析】静脉补钾的注意事项：不宜过快，过浓，过多，见尿补钾（尿量达 40ml/h 或者 500ml 每天）。不可静推。每日补钾 40~80mmol，合氯化钾 3~6g。

96. 【答案】BD

【解析】糖尿病患者应注意在饮食中摄入适当的蛋白质，维持正常的血糖水平。尿毒症患者和肝昏迷患者因为肝肾功能障碍，应限制蛋白质摄入，以免加重肾和肝的负担。

97. 【答案】ABCD

【解析】青霉素皮试结果为阳性者，需在体温单、病历、医嘱单、床头卡醒目注明，同时将结果告知患者及其家属。

98. 【答案】ABCD

【解析】急性白血病常见的死因有严重的贫血、出血，尤其是内脏出血，患者由于血液中的成熟粒细胞缺乏导致感染，严重可致败血症。化疗时患者可因为化疗毒性反应或是中枢神经系统白血病死亡。

99. 【答案】ABCD

【解析】糖尿病患者容易出现血管病变，并引发皮肤的感染等，导致下肢出现坏疽发生，此时应注意使下肢血液循环正常，所以应穿宽松袜子和鞋子，用温水洗脚，保持足部干燥清洁，及时处理足部疾病，同时因为吸烟可刺激血管，所以应该禁烟。

100. 【答案】ABCD

【解析】类风湿性关节炎是以对称性关节炎为主要临床表现的慢性疾病局，多发生在腕、掌指关节等小关节，患者晚期出现关节畸形，活动受限。